

(Convulsions) উৎপাদন করে। মস্তিষ্কের উক্ত প্রকারের অবস্থা ক্রমে মস্তিষ্কের কোমলতা বা কঠিনতায় পরিণত হইয়া শরীরের স্পর্শ জ্ঞান রহিত (Anæsthesia), পক্ষাঘাত, পেশীকম্প, শারীরিক এবং মানসিক শক্তির ক্ষয় বা হ্রাস হওয়া হেতু মায়ুশূল, মূগীরোগ, অথবা উক্ত প্রকারের লক্ষণাক্রান্ত দ্বায়বিক অস্বস্থ প্রকাশ পায়। মূত্রকোষের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ মূত্রকোষের দানাবৃক্ক অপকৃষ্টতা (Granular degeneration of the kidneys) হয় এবং তদরুণই আলবুমিনুরিয়া বা মূত্রকোষের ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ (Bright's disease) নামক রোগ এবং অত্যন্ত প্রকারের মৌজিক রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বিবাক্ত হইলে সীসা জনিত শূল বেদনা বা চিত্র করের শূল বেদনা (Lead Colic or Painter's Colic) উৎপন্ন হয়, যাহার দরুণ অন্ত্রের কোলন (Colon) নামক অংশের সংকোচনের উদ্বেক হইয়া উদরের মধ্যে ভরানক কষ্টদায়ক এবং আক্কেপিক্ত বেদনা অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য কোষ্ঠবদ্ধ বর্তমান থাকে।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। কোন বিষয় সহজে বুদ্ধিতে অশক্তি; সকল বিষয়েই বৈরাগ্য (কস্, ফস্-আস্); স্মরণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ (আনাকার্ড, নেট্রাম্-মিউট, নাক্স-মফ্, মার্ক্, ফস্-আস্); কথ্য বলিবার সময় ধ্বাধোণ্য শব্দ স্মরণ হয় না (ডাক্); সর্বদা নিস্তরক এবং বিষম ভাব; উগ্র বা এলো মেলো প্রলাপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখাকৃতি বিকৃত হওয়া; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং অশান্তি; কথ্য বলিতে এবং কোন কার্য করিতে অত্যন্ত প্রান্তিবোধ এবং অনিচ্ছা; বাচিকে অনিচ্ছা,—জীবন যেন একটা বোঝাই জায় বোধ হয়।

মস্তক। মাথাধোরা; যথায়, প্রধানতঃ মাথার পশ্চাৎভাগে ভারিবোধ; মাথা ধরা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন গলার মধ্য হইতে মস্তিকে একটা গোলায় জায় পদার্থ ঠেলিয়া উঠিতেছে; মাথার চুল উঠিয়া যাওয়া; চক্ষুর জ্ব এবং গঁপ (মোছ) পড়িয়া যাওয়া।

**চক্ষু ।** চক্ষুর যেতাংশ হরিত্রাবর্ণ (চারনা, কষ্ট্, চেলিডন্) ; চক্ষু দিয়া পৃথি পড়া ; এক বস্তু দ্বিগুণ বা ভবল দেখায় ; দৃষ্টির বিনাশ ; আভাবিক অপেক্ষা বড় হইলে য়েকুণ হয়, চক্ষুর গোলকে সেরূপ বেঘনা বা বাতনা (কস্-আস্, স্পাইজেল্) ; চক্ষুর উপরের পাতার পক্ষাঘাত (কষ্ট্, জেল্‌স্, নাইটি-ক্-আস্, ওপিয়াম্) ; চক্ষু তাহা বিস্তৃত ; কুয়া-লার মধ্য দিয়া তাকাইলে য়েকুণ হয়, চক্ষে সেরূপ আঙ্গা দেখা ; দূরের বস্তু দেখিতে অশক্তি ।

**মুখমণ্ডল ।** মুখমণ্ডল মৃত দেহের জাঘ শিটা, মলিন হরিত্রাবর্ণ ধা ফিকা (কার্কো-বেজ্) ; মুখপানে তাকাইলে ম্রস্ক উবেগ বা ঘাতনার চিহ্ন লক্ষিত হয় (আস্, ক্যাম্‌ফার, বিরেট্-আর্) ; দাঁতলাগা (সিকুটা, ইয়েস্, হায়োস্, লরোস্) ; ইয়াত্বির নিম্নস্থিত গ্রন্থির ক্ষীতি ।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য ।** ম্রাডির ধার দিয়া আগা গোড়া স্পষ্ট নীলের রেখা পড়ে ; জিহ্বা শুষ্ক এবং সাদা ; জিহ্বার পক্ষাঘাত, বাহার দরুণ জিহ্বা মুখের বাহির করা যায় না (কষ্ট্, ডাক্, জেল্‌স্, ল্যাক্, হায়োস্) ; জিহ্বার ধার লাল বর্ণ এবং উহার মধ্য ভাগ কটা বর্ণের ফার-বুক (Furred-tongue) (ব্যাণ্ট্, কস্) ; মুখের মধ্য শুষ্ক (এগিস্, আস্, আই, নাক্স-বক্, পাল্‌স্) ; মুখে মিষ্ট স্বাদ (ইকুলাস্, আই, মার্-কর, লাল্‌ক্) ; ভালরূপে মুখ সঞ্চালনে অশক্তি ; মুখে প্রচুর পরিমাণ মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট লালের সঞ্চার, অগচ গলার মধ্যে শুকায়াতব ; মুখে পচা ভ্রগন্ধযুক্ত বা ; জিহ্বা ক্ষীত এবং উহাতে ভারি বোধ ; জিহ্বা হরিত্রা বা সবুজের আভাবুক্ত লেপ বিশিষ্ট ; কথা বলিতে অশক্তি ; কোন দ্রব্য গিলিবার সময় গলার মধ্যের সঙ্কোচন (বেল্, হায়োস্, ট্রামন্) ; টন্‌সিল ক্ষীত, প্রদাহযুক্ত এবং কঠিন (বারাইট-কার্ক্) ; গলার মধ্যের পক্ষাঘাত এবং তদরুণ কোন দ্রব্য গিলিতে অশক্তি (বেল্, ওপিয়াম্, নাক্স-বক্) ; গলার মধ্য দিয়া উপরের দিকে যেন একটা গোলার জায় কোন পদার্থ টেলিয়া উঠিতেছে এরূপ অস্বভূত হয় ; একটা পোকা যেন হায়া দিয়া গাটতেছে আচার বহাগলনালীতে এরূপ অস্বভূত হয় ।

**পাকস্থলী এবং উদর ।** দুধা শুভ্রতা (আলাম, আস্, চারনা,

কন্স); অত্যন্ত প্রবল সিগাসা (একন্স, আস্, ব্রাই, মার্ক্, কন্স-আন্স); মিষ্ট বা টক উদ্ভাবের উঠা (কার্বো-বেজ্, নাক্স-বন্স কন্স, গাল্ফ); হৃৎকম্পক উদ্ভাবের উঠা (ক্যাম্, সিগিয়া, ক্রিয়াজ্, বিরেট্-অগবন্স, কন্স); উদ্ভাবের আহাৰ জ্ববা, বলসংযুক্ত পদার্থ, অথবা কটার আভাযুক্ত বা কাল্চে পদার্থ বমন (আস্, কন্স); পাকস্থলী প্রদেশে চাপা এবং আঁটা বোধ; হিক্কা; পাকস্থলীতে ভারিবোধ এবং কন্কনানি; পাকস্থলীতে বাটিয়া ধরার জায় খিল ধরা। উদরে শূল বেদনার জায় বেদনা; উদর পৃষ্ঠদেশপানে আকুটে (চেলিডন্স, পডোফ্, টেবেকাম্); অস্ত্রে অত্যন্ত বাটিয়া ধরার জায় যাতনা; নাতি যেন উচু হয়; উদরের উপরস্থিত পেশীগুলি কঠিন এবং উহার স্থানে স্থানে গোলার জায় ক্ষীণ; নাতি প্রদেশে অসহ্য বেদনা বা যাতনা যাহা উদরের এক পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়া অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; চাপ দিলে বেদনাদির কতক উপশম হয়; উদরে কর্ণনবৎ বা চিন্টিনে বেদনা; উদরে গড়্-গড়্, কল কল শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুল্ফ দ্বারা দিয়া অত্যন্ত হৃৎকম্পক এবং আলাউৎপাদক বায়ু নিঃসরণ।

মল এবং মলদ্বার। কোষ্ঠবদ্ধ; মল পরিমাণে অল্প, হয় নেড়, নতুবা ভেড়ার মলের জায় গোলার জায় গুট্‌লি গুট্‌লী (আলান্স, ক্যালী-কার্ক্, ওপিয়াম্, ম্যাগনেস্-মিউর), কাল বা সবুজ রঙ্গের; মল অতি কঠে নির্গত হয়; অনেক কাল ধরিয়া উদরাময় এবং মল হরিদ্রাবর্ণ; মলভ্যাগের সময় গুল্ফ দ্বারের কষ্টদায়ক সঙ্কোচন এবং উহাতে বাটিয়া বা কসিধা ধরার জায় অহুত হওয়া।

মূত্রযন্ত্র। প্রস্রাব কালীন অত্যন্ত কষ্টানুভব; মূত্র ফোঁটার ফোঁটার নির্গত হয় (একন্স, বেল্, ক্যাঙ্ক্); বারম্বার মূত্র ভ্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে মূত্র নির্গত হয় না; মূত্রাবরোধ বা মূত্র নালীর গোড়ায় আক্কেপ (মার্ক্-কর); মূত্র কাল্চে এবং পরিমাণে অল্প (অস্মিয়াম্); মূত্র আলবুমেনযুক্ত (মার্ক্-কর, অস্মিয়াম্, কন্স, ফাইটোল্); মূত্রনালী দিয়া রক্ত নির্গমন।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা থাকে না (আগ্‌নাশ্, আর্জেন্ট্-নাইট্‌ক্, ক্যাঙ্কার), অথবা স্ত্রীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা এবং উহার

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গ বারবার খাড়া হওয়া (আগারিকান্স; ক্যান্স, গ্রাফ, মাই-ট্রিক-আস্); পুরুষাঙ্গ এবং অণ্ডকোষাধারের প্রদাহ এবং ক্ষীতি; অণ্ডকোষের সঙ্কোচন, উহাতে বাটগা ধরার জ্বার অহুত হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুক্র নিঃসারক সূত্রে (Spermatic Cord) চিড়িক মারা। জীলোকের যোনিদ্বারের আক্ষেপ (হামোমেলিস); শ্বেত প্রদর; শুনে ছুৎ না থাকা।

শ্বাস যন্ত্র। অন্নকাল স্থায়ী, শুষ্ক, আক্ষেপিক কাশি এবং গলা দিয়া পূঁথ সংযুক্ত বা রক্ত মিশ্রিত স্লেমা নির্গমন (চারনা, ডাল্‌ক্, ক্যালী-কার্ক্, লাইকোপ্, ফস্, সিপিরা, সাইলিসি); দুশ্বাসে, পুঁথের সঞ্চার (ফস্); বুক চাপা বোধ (সোরিনাম্); শ্বরভঙ্গ এবং গলার মধ্যে বশ্‌বশে বোধ; শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর বা হাঁপানির জ্বার; আক্ষেপিক হাঁপানি কাশি; বুক এবং পার্শ্বে খোঁচাবিধাব জ্বার বেদনা বা বাতনা, যাহার দরুণ অনেক সময় শ্বাসপ্রশ্বাসেব ব্যাঘাত ঘটে।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অত্যন্ত বেদনা বা বাতনা,—উরুদেশেব পেশীতেই এই বেদনা অধিক অহুত হয় এবং সঞ্চার সময় ও রাত্রিতে যাহার বৃদ্ধি হয়; কটিবাত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত স্থানের পেশীক্ষয় এবং তদরুপ চলিতে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্পন্দন এবং ঝাকনি; হাত পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাতের জ্বার অবশবোধ; মনিবন্ধের পক্ষাঘাত; হাত কাঁপে; নিদ্রাঙ্গে দায়ুশূলের জ্বার প্রবল বেদনা, যাহা কুচকি হইতে হাঁটু পর্যন্তই অধিক অহুত হয় এবং যাহা ক্রমাগত বর্ধমান না থাকিয়া রোগীকে থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ করে; উরুদেশ এবং পায়ের পাতার পক্ষাঘাত।

চক্ষু। চক্ষু শুষ্ক, হরিজা বর্ণ (ব্রাই, চারনা), অপবা নীলের আভাগুক্ত (ল্যাক)।

নিদ্রা। দিনের বেলা নিদ্রাবেশ এবং রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা।

বাসহারা। কেঠিবদ্ধ; শূল বেদনা; দায়ুশূল; কটিবাত; পক্ষাঘাত; আক্ষেপ (Convulsions); মৃগীরোগ; বক্ষাকাশ; কামলরোগ; মূত্রকোষের ট্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ বা আল্‌বুমিনুরিয়া; যোনিদ্বারের আক্ষেপ; হিষ্টেরিয়া;



মস্তিষ্কের আবরক ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহ ; পেশীকম্ব বিশিষ্ট পক্ষাঘাত এবং তদক্ষণ আক্রান্ত স্থানের পেশীর স্পন্দন ও উহাতে স্পর্শজ্ঞান না থাকা ; মণিবন্ধের পক্ষাঘাত ; মস্তিষ্ক এবং কসেরিকা মজ্জার পুরাতন প্রদাহ ; স্থানিক আক্ষেপ বা খিলখরা ; মলত্যাগের সময় গুহ এবং গুহ দ্বারের আক্ষেপ ; আল্‌বুমিউরিয়া জনিত অক্ষতা ; ধর্মোন্মত্ততা (Religious Melancholia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ ; ক্রীলোকের মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) ; ডাক্তার বেয়ারের মতে পুরাতন আকারের মাথা ধরার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ এবং মানসিক অবসন্নতা থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত শীর্ণ হওয়া (আস্‌, ফস্‌, নেট্রাস্‌-মিউর) ; পেশীকম্ব, বিশেষতঃ পক্ষাঘাতাক্রান্ত অঙ্গের পেশী কম্ব, রক্তাক্ততা ; স্পর্শজ্ঞান রহিততা ; স্পর্শজ্ঞানের অতিরিক্ত চেতনা ; আক্ষেপ ; সার্বাঙ্গিক বলক্ষয় ; গা মাটি মাটি করা বা অলসবোধ ; মূচ্ছার ভাব ; সমুদয় শরীরে সন্ধিঘাত বা হাড়শুল্কের ভ্রায় বেদনা ; ঘর্ম্ম একবারেই হয় না ; পক্ষাঘাত হওয়ার পূর্বে মনোবিকার, শরীর কম্পন, আক্ষেপ বা বৃহৎ হাড় প্রদেশে খোঁচা বা ছুরী বিধানের ভ্রায় বেদনা বা ব্যতনা ; পুরাতন আকারের মৃগী-রোগ, বাহার আক্রমণের পূর্বে পায় ভারি ও অবলবোধ এবং জিহ্বা ক্ষীত হয় ; আক্রমণের পর রোগী অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথার গোলমাল এবং অবসন্নতা অহুতব করে ; রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে, জলাদি পান করিলে অহুতের বৃদ্ধি ; এবং আক্রান্ত স্থান ঘর্ষণ করিলে অহুতের উপশম ইত্যাদি প্রাণায়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । প্রাণায়ামের কার্য্যের সঙ্গে আলুমিনা, ওপিয়াম্‌, প্রাটিনা এবং জিক্কামের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহাও কার্য্যের সঙ্গে বেলাডোনা, ক্যাকেরিয়া কার্বোনিকা, লাইকোপডিয়াম্‌, মার্কিউরিয়াম্‌, কফরাস্‌, রাস্‌টক্স্‌ এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আলুমেন্‌, আলুমিনা, বেলাডোনা, ককি-উলাস্‌, হায়োসায়াম্‌, নাক্স-বমিকা, ওপিয়াম্‌, প্রাটিনা, ট্র্যামোনিয়াম্‌, জিক্কাম্‌ ইত্যাদি প্রাণায়ামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ৬ষ্ঠ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ১২ ক্রমও ব্যবহৃত হয় । পুরাতন আকারের মুগী-রোগে এই ঔষধের ৩য় দশমিক ক্রমের ঙ্গাড়া, ১ গ্রেইণ্ মাত্রায়, প্রতিদিন ২ মাত্রা করিয়া ব্যবহার করিয়া ২০ টী রোগীর চিকিৎসার বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে ।

### পাল্‌সেটিল্লা,—পাল্‌স্ ।

( PULSATILLA,—PULS. )

জার্মানী, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইডেন, রুশিয়া, তুরস্ক দেশের বালুকাময় স্থানে এবং ইংলণ্ডের দক্ষিণাংশের কোন কোন স্থানে এই গাছ জন্মে । ফল হওয়ার সময় এই গাছ সংগ্রহ করিয়া ইহার ছাল, বাকল, পাতা মূল বা শিকড় ইত্যাদি গাছের সমুদয় অংশ একত্র মিশ্রিত করিয়া যথা-নিয়মে প্লেস্ট্রিটে ইহার মূল আরোক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । সমুদয় শৈথিল্য বিপ্লী এবং সাইনোবিয়াল বিপ্লী ( Synovial Membranes ), শিবা, চক্ষু, কণ এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়, প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ার উপর এই ঔষধের কার্য্য অতি প্রবল । শৈথিল্য বিপ্লীর নিঃসরণের অতিরিক্ত সঞ্চার বা বৃদ্ধি হইয়া নিঃসরণের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, বা কখন কখন উহার সঞ্চারের বাধাও জন্মে । শৈথিল্য বিপ্লীর নিঃসরণের অতিরিক্ত সঞ্চার হয়, শ্লেষ্মা নিঃসারক যন্ত্রের কার্য্যের বাধাও জন্মে, দ্রাব্যিক মণ্ডলী উত্তেজিত এবং অবসন্ন হয়, এবং তদ্বশত অজীর্ণ, শ্বাসযন্ত্রের অসুখ, জননেন্দ্রিয় এবং মূত্র যন্ত্রের অসুখ, চক্ষু এবং কণের শ্লেষ্মা জনিত অসুখের অনেকানেক লক্ষণ প্রকাশ পায় । শ্লেষ্মা জনিত অসুখ উৎপন্ন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রকৃতি বা শক্তি বিশেষ । মস্তিষ্ক এবং কসেমরকা মজ্জার উপর কার্য্য করার শক্তি থাকার দরুন, শ্লেষ্মা উৎপাদন করার ক্ষমতা ব্যতীতও জননেন্দ্রিয়ার উপর ইহার অল্পপ্রকার কার্য্য করার শক্তি আছে । সাইনোবিয়াল বিপ্লীতে (Synovial Membranes) ইহা পেপ্তী এবং সন্ধি-

বাতের জ্বর প্রদাহ এবং শিরার প্রদাহযুক্ত ক্ষীতি ও বিস্তৃতি উৎপাদন করে । জ্বীলোকের জননেজিরের উপর প্রবল কার্য, জ্বীলোকের শান্ত প্রকৃতি বা স্বভাব, সহজেই সকল বিষয়ে সম্মত হওয়ার স্বভাব, এবং সামান্য কৌরণেই কঁাদা বা দুঃখ প্রকাশ করার স্বভাব এই ঔষধের কতকগুলি বিশেষ প্রকৃতি মধ্যে পরিগণিত ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । শাস্ত, ভদ্র, ভীতু এবং সমুদয় কার্যেই সহজে সম্মতি দেওয়ার এবং সামান্য কারণেই কান্দাব্যর স্বভাব (এপিস, নেট্রাম-মিউব, নাক্স-মফ্, ইয়েস্, লিনিয়াম্ টাইগ্রিনাম্) ; মূত্ৰা নিকটবর্তী একপ ভাবিলে ঘেরূপ হয়, মনের সেরূপ উদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কাঁপনি (একন্, আস্) ; রাত্রি এবং সন্ধ্যার সময় মনে ভূতের ভয় (একন্, আস্) ; সন্ধ্যার সময় হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত যাতনা, যাহাব দরূণ রোগী আত্মহত্যা করিতেও প্রস্তুত হয় ; গরমে ঘে রূপ হয়, রাত্রিতে মনের সেরূপ উদ্বেগ ; বিরক্ত না হইলেও সর্বদা বিড়্-বিড়্ এবং আকার করার স্বভাব ; নিজের অবস্থার বিষয় ভাবিয়া মনের মালিন্ত এবং কোন বিষয়ই ভাল না লাগা (নাক্স-বম্) ; সর্বদা চটা, অসন্তুষ্ট এবং খিট্-খিট্ করার স্বভাব (ব্রাই, ক্যাম্) ।

মস্তক । মাথায় গোলমেলে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন মাথার মধ্যে কিছু নাই ; নেসা করিলে ঘেরূপ হয় সেরূপ মাথাঘোরা (ককিউলাস্, চায়না, নাক্স-বম্, রাস-টজ্) ; মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে মাথাঘোরা (বেল্) ; প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিলেই মাথা-ঘোরা (ব্রাই), যাহার দরূণ বোণী পুনরায় শয়ন করিতে বাধ্য হয় ; বসিয়া থাকিলে মাথাঘোরা ; মাথায় চিন্মবোধ এবং মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁৎলিয়া গেলে ঘেরূপ হয়, কপালে সেরূপ অতৃপ্ত হয় (চায়না, পালস্, সাজুনেবিয়া) ; শিরঃশীড়, যাহার দরূণ মনে ভয় যেন মাথা ফাটাইয়া যাইবে (ব্রাই, ক্যাম্প্, নেট্রাম-মিউব) এবং মস্তক পৰে হইয়া পড়ে (একন্, আস্) ; পরিমাণে বাৎসরিক মাথা ঘোরা (ব্রাই, হাপাশাক্, প্যাসিস্, নাক্স-ম্) ; তৎকাল যুক্ত দ্রব্য খাইয়া মাথাঘোরা ; মাথার পশ্চাৎভাগে, এক পার্শ্বে কঁটা ঘাঘরা

মাথার জ্বাৰ ঔষল বেদনা বা যাতনা ; মাথা ধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্কাৰ সময় চক্ষে কন্‌কনানি, মাথায় চাপিয়া ধরার জ্বাৰ দপ্‌দপিয়া বেদনা, চাপিয়া ধরিলে বাহার উপশম হয় (এপিস্, আর্জেন্ট্-নাইট্‌ক্) ; কপালে,— চক্ষুর উপরিভাগে চাপিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা বা যাতনা, চক্ষু উপরের দিকে উল্টাইলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; কপালের দুই পার্শ্বে এবং কর্ণের পশ্চাৎভাগে ও সমুদয় মাথার মধ্যে স্‌টীবিধানের জ্বাৰ বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বেদনা বা যাতনা ; স্কাৰ সময় মাথায় দপ্‌দাপিয়া বেদনা বা যাতনা (নাক্স-মক্) ; কপালের দুই পার্শ্বে এবং কর্ণের পশ্চাৎভাগে চাপিয়া বা বাটিয়া ধরাব জ্বাৰ বেদনা ; আহাৰের পর মাথা ঘোরা ; মাথার মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া ; মাথা ধবা, স্কাৰ সময়, শয়ন করিলে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং বহির্-কীৰ্ম্ম এবং প্রচাপনে বাহার উপশম হয়।

চক্ষু । চক্ষু এবং চক্ষুর পাতায় শুষ্কাত্ব এবং কেতুব হইলে যেক্রপ হয়, উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে সেক্রপ ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখার দরুণ ব্যৱস্থার চক্ষু মুছিয়া ফেলার ইচ্ছা (আলাম্, ক্রোকাশ্) ; বালি প্রবেশ করিলে যেক্রপ হয়, পুস্তকাদি পড়িবার সময় চক্ষে সেক্রপ চাপাবোধ (আর্স্, কষ্ট্, ইম্‌প্‌স্, নেট্‌স্-মিউর, সাল্‌ফ্) ; চক্ষুর যোজক ঝিল্লীর প্রদাহ এবং চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণের ক্রৈদ নিঃসরণ ; চক্ষে জ্বালা এবং চুলকানি, বাহার দরুণ ব্যৱস্থার চক্ষু চুলকাইতে বা রগ্‌ড়াইতে ইচ্ছা হয় ; চক্ষু এবং চক্ষুর পাতার প্রদাহ এবং তদরুণ চক্ষু দিয়া জল পড়া এবং ত্রাক্রিতে চক্ষুর পাতার পাতায় লাগিয়া থাকা (আলাম্, এথ্‌জা, ক্যাক্-কার্ক্, লাইকোপ্, গ্রাক্, মার্ক্, সাল্‌ফ্) ; চক্ষুর পাতায় ত্রণ (Styes), বিশেষতঃ চক্ষুর উপরের পাতায় (লাইকোপ্, গ্রাক্) ; স্কাৰ সময় চক্ষুর পাতা এবং উহার কোণে চুলকানি, কামড়ান এবং জ্বালা ; বাতাস লাগিলে বা ঘরের বাহির হইলে চক্ষু দিয়া জল পড়া (সাল্‌ফ্) ; কুরাসা বা সন্ধ বা মিহি কাপড়ের মধ্য দিয়া তাকাইলে যেক্রপ হয়, চক্ষে সেক্রপ ঝাপ্‌সা দেখা (কষ্ট্, হায়োস্, লরোস্, কস্, মার্ক্, পিটোল্, রানান্‌কুলাস্, সাল্‌ফ্) ; প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার দেখা (ডাল্‌ফ্) ; উক ঘরে গেলে চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার দেখা।

**কর্ণ।** কর্ণের বহির্দেশ লালবর্ণ এবং ক্ষীত (একন্, বেল্, এপিস্); কানের মধ্যে বেদনা, যাচা ছুবিধিধান বা ছিঁড়িবা ফেলার আয় অন্ততৃত হয় (বেল্, সাইলিনি) এবং বাহিরে কানের মধ্যে দপ্পদিয়া বা চিড়িক মারার আয় বেদনা বা যাতনা (মার্ক্), কানে অত্যন্ত প্রথর বেদনা, বাহার দরুণ মনে হয় যেন কান দিয়া কোন পদার্থ জোবে তেলিয়া বাহির হইতেছে; কোন পদার্থ কানের মধ্যে দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে যেকূপ হয়, কানে সেকূপ কম শুনা; কান বন্ধ হওয়ার আয় অন্ততৃত হয় এবং কানের মধ্যে অনেক দূরবত্তী শব্দের আয় সৌ সৌ শব্দ হয় (ক্যাক্-কার্ক্, গ্রাক্, ক্যালী-কার্ক্); কান দিয়া গন্ধহীন শ্লেষ্মা এবং পূর্ব নিঃসরণ; কানের মধ্যে হলকুটানের আয় অন্ততৃত হয়; হানের পর কান দিয়া পূর্বাদি নিঃসরণ; ঠাণ্ডা লাগিয়া কান পাকিয়া পূর্বাদি নিঃসরণ।

**নাসিকা।** তবল বা শুকনা সন্ধি; বাবদার হাঁচি; স্বাদ বা ঘ্রাণশক্তি থাকে না (আণ্ট-জিট্); নাসারন্ধ্র টাটার বা চড়্, চড়্, কবে; নাকের পাতায় ছাগ উঠিয়া যাওয়ার আয় জালা (লাইকোপ্); নাক দিয়া সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন (গ্রাক্, মার্ক্); নাক দিয়া হরিদ্রার আভা-যুক্ত গাঢ় বা তরল শ্লেষ্মা নির্গমন; ঘরের মধ্যে থাকিলে অস্থির বৃদ্ধি (সিপা, নাজ্-বন্); শীতবোধ; মুখমণ্ডল ফিকা বা শিটা; মাথায় গোলনেলে বোধ; হারবিক শিরঃপাড়া (একন্, সিপা, মাস্‌নোরিয়া); সন্ধ্যার সময় এবং উষ্ণ ববে নানারন্ধ্র যেন কক্ হইয়া থাকে; প্রাতঃকালে হরিদ্রা-বর্ণের, অম্লদির স্বাদ বিশিষ্ট, দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ (নাইট্রিক্-মাস্); পুরাতন সন্ধিতে যেকূপ হয়, নাকের মধ্যে সেকূপ দুর্গন্ধ (মাল্ফ্); নাক দিয়া রক্ত পড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি ও রক্তরোধ (ব্রাই, হামামেলিস্, সিপিয়া); নাকেব গোড়া চাপাবোধ (একন্, ক্যালী-বাই); নাকের হাড়ে বেদনা, বাহার দরুণ মনে হয় যেন হাড় ভিন্নাভন্ন হইবে।

**মুখমণ্ডল।** মুখমণ্ডল ফিকা, শিটা বা হরিদ্রাবর্ণ; মুখমণ্ডল পর্যায়ক্রমে লালবর্ণ এবং শিটা বা ফিকা হয়; নিম্ন ওষ্ঠ ক্ষীত এবং উহার ঠিক মধ্যাংশ ফাটানুত।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য।** বায়ুশুণি একবার কদিয়া ধরিয়া

চর্চাৎ ছাড়িয়া দিলে যেরূপ হয়, দাঁতের গোড়ায় সেরূপ খোঁচা বিঁধার জ্বাশ্রম প্রবল বেদনা বা যাতনা ; সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে, বিছানার উচ্চতাতে, দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (কাম্) ; কোন প্রকার গবম দ্রব্য মুখে গইলে দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (কাম্) ; খাওয়ার সময় এবং দাঁত খোঁচাইলে দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি ; দন্তশূণ্য এবং উদার সঙ্গে সঙ্গে কানে বেদনা, একপেশে মাথা ধরা (ম্যধ্ কপালিয়া মাথা বেদনা) এবং শীতবোধ ; ঠাণ্ডা জলে দাঁতের বেদনার ক্ষণিক উপশম হয় ; বহির্বাযুতে এবং দাঁত অনাচ্ছাদিত রাখিলে দাঁতের বেদনা বা যাতনার উপশম । জিহ্বা শুষ্ক এবং চট্‌চটিয়া শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত ; জিহ্বা গাঢ়, দাশা বা তরিত্রাণ লেপযুক্ত (ব্রাই, মার্ক্, নাক্স-বম্, পডোফ্) ; লিহ্বার মধ্য ভাগে আস্তে আস্তে পোড়ার জ্বাশ্রম জ্বালা (মাইরিস্, প্লাটিনা, সাল্ফুনেরিয়া, সাল্ফ-আস্, বিরেট্-বিবাইট্) ; ভিজা অবস্থানও জিহ্বায় স্পর্শ জ্ঞান থাকে না ; রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে জিহ্বায় স্পর্শ জ্ঞান থাকে না ; মুখে অত্যন্ত চর্গক্ (অরাম্, অগিকা, হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্, নাক্স-বম্) ; মুখের মধ্য এবং অগ্রাধ বহা গলনালীর উপরিভাগ শুষ্ক এবং প্রাতঃকালে স্বাদ বা গন্ধ শূন্য শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত ; মুখে মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট লালের সঞ্চার (কাম্, ফস্) ; প্রাতঃকালে মুখে পচা মাংসের জ্বাশ্রম স্বাদ, বাহার দক্ষণ বমনের উল্লেখ হয় (অগিকা, মার্ক্) ; মুখে চট্‌চটিয়া পচা এবং তিক্তস্বাদ, আচারের পরই যত্নে অধিক অনুভূত হয় (লাই, কলোস্, নাক্স-বম্) ; প্রাতঃকালে মুখে বাস্বাদ ; অগার দ্রব্যাঙ্গ, প্রধানতঃ কটী, তিক্ত লাগে (ব্রাই, চারনা, কলোস্, নাক্স-বম্, সাল্ফ্) ; প্রাতঃকালে মুখে শুষ্কগুভব, কিছু পিপাসা থাকে না । ছাল উঠিয়া গেলে বা চাড়িয়া কেলেলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ অগ্রভূত হয় (আমন্-কার্ণ, কার্কো-বেজ্, কষ্ট, ফস্) ; প্রাতঃকালে গলার মধ্যে অত্যন্ত তক বোধ (এপিস্, নাক্স-মক্) ; প্রাতঃকালে গলার মধ্যদেশে চট্‌চটিয়া অগা শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত ; গিলবার সময় গলার মধ্যে কসিয়া ধরার জ্বাশ্রম যাতনা বা চাপাবোধ ; কোন পোকা উপর দিকে হানী দিয়া উঠিতেছে গলার মধ্যে এরূপ অগ্রভূত হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । রোগী পাইতে চাহে, কিন্তু কি প্রকারের জ্বা তখন আশ্রমে রোগী তাহা বলিতে পারে না ; তৈলজাত বা চর্কিবৃক্ষ

আহার দ্রব্যে অরুচি (পিট্টোল্, তিপ্‌সাল্‌ফ্); মাংসে অরুচি, (গ্রাফ্, পিট্টোল্); কটীতে অরুচি (নেট্রাম্‌-মিউর); মাখনে অরুচি (পিট্টোল্); হৃৎ এবং তামাকে অরুচি (ইথের্); মদ্যপানের ইচ্ছা; সকল প্রকার অস্থুখেই পিপাসা থাকে না (আন্টি-টার্ট্, এপিস্); আহারের পর উদরস্থ আহার দ্রব্যে বন্ধ এবং স্বাদ বিশিষ্ট ঢেঁকুব বা উদগাব উঠা (আন্টি ক্রুড্, ফস্, চায়না, গ্রাফ্, ক্যাক্‌ কার্ল্); উদগাবে গলাদিয়া তিক্ত, টক, পিত্তযুক্ত উগ্র স্বাদ বিশিষ্ট জল উঠে (ব্রাই, নাক্স-বম্, ফস্); উদগাবে গলাদিয়া পচা মাংসের স্বাদবিশিষ্ট জল উঠা; বমনোদগ; মুখে জল উঠা (লেডাম্, নাক্স-বম্), আহার এবং পানের পর উদগাবে বিষী স্বাদ বিশিষ্ট জল উঠা (আস্); প্রাতঃকালে, বজঃসন্ধ্যার সময়, রক্তবোধ হইলে অথবা গর্ভাবস্থায় বমনোদগ (গ্রাফ্, ক্যাক্স-কার্ল্, নাক্স-মফ্, সিপিয়া), পিত্তযুক্ত পদার্থ বমন (আস্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পডোফ্); অথবা অনেকক্ষণ পূর্বে যে সকল দ্রব্য খাওয়া গিয়াছে, সেইসকল উদবস্থ দ্রব্য বমন, অথবা আহারের পর বমন; চক্ষিযুক্ত দ্রব্য খাইয়া পাকস্থলীর অস্থু (সাইক্লেনেন্, টারেজোকাম্; শাকাদি খাইয়া পেটের অস্থু (টোপকাক্, নাক্স-বম্); ফল বা বরফের কুলী খাইয়া পেটের অস্থু; আহারের প্রায় এক ঘণ্টা পর পাকস্থলীতে বেদনা বা যাতনা (নাক্স-বম্); একখানি পাথর চাপিয়া রাখিলে যেরূপ হব, পাকস্থলীতে সেরূপ ভারবোধ (একন্, ইক্স্লাস্, আস্-ব্রাই, নাক্স-বম্); প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙি লেই উক্ত প্রকারের আবি বোধ অধিক হয়; প্রাতঃকালে এবং আহারের পর পাকস্থলীতে খিল ধবান্‌ জ্বাণ বেদনা বা যাতনা; ক্ষুধা হইলে যেরূপ হব, পাকস্থলীতে সেরূপ মোচড়াটীয়া ধবান্‌ জ্বাণ যাতনা (এবিস্ ক্যানেডেসিন্); আহারের পর পাকস্থলীতে চাপিয়া ধবান্‌ জ্বাণ বা চিন্‌চনে বেদনা; টাটিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ যাতনা অস্থুত হয় (নাক্স-বম্), গুরু জ্বাণ হইলে যেরূপ হব, আহারের গলনালীতে সেরূপ জ্বালাহ-ব; পাকস্থলীর মধ্যে স্পষ্ট দন্দপানি (আন্টি-টার্ট্, আসাফিটিডা)। উদরে দ্বিভ বায়ু সঞ্চার জনিত শূল বেদনা; উদরে প্রবল গড়্‌গড়্‌, কল কল শব্দ হওয়া (লাইকোপ্); উদরের মধ্যে দ্বিভ বায়ু যেন চলিয়া বেড়ায় (আলোজ্, ক্যামো-বেজ্), সঞ্চার সময়ই যাহা

অধিক অহুত হয় ; উদরের নানা স্থানে দূষিত বায়ু রুদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে যেন চাপিয়া ধবে, গৃহস্থার দিবা বায়ু নিঃসরণেও যাহা দূরীভূত হয় না (চাশনা) ; রাজি হই প্রহারের পরই উক্ত প্রকারে দূষিত বায়ু অধিক সঞ্চিত হয় : শূল বেদনা এবং পেট কামড়ানী যাহা উদরেক্ষ প্রদেশেই অধিক অহুত হয় ; পাকস্থলী এবং উদর পূর্ণ, ক্ষীত এবং বিস্তৃত, সামান্য চাপ দিলেই যাহা অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় ; একখানি পাথর চাপিয়া রাখিলে যেক্রপ হয়, উদবে (বার্বেরিস্) এবং কোমরের পশ্চাৎভাগে সেক্রপ চাপাবোধ ; বসিয়া থাকিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ এবং অসাড় হয় ; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না ; প্রসব বেদনায় যেক্রপ হয়, নিম্নদিকে তৈলিয়া নামার স্থায় উদবে সেক্রপ প্রবল বেদনা ; আহারের পূর্বে পেট ফাঁপে ; অন্ত্রপ্রদাহ (Enteritis) এবং উহার দক্ষণ উদর প্রাচীরে অত্যন্ত বেদনাত্ত্বভব ; শূল বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীত বোধ এবং উদরে গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হওয়া, — এই প্রকার শূল বেদনা সন্ধ্যার সময়ই অধিক হয় ।

মল এবং মলদ্বার । অন্ধদর্শ বোগ (Blind-Piles) এবং গৃহস্থার বেদনা বা যাতনা ; গৃহস্থার অশেষ বলী বাহির হইয়া পড়ে (আলোম্, কাক্স-কার্ক, লাক্, মিউব-অস, সাইলিসি) এবং অশের বলীতে চিড়িক মারি, টাটানি এবং চুনকানি (গাল্ফ্) ; মলত্যাগের পর গৃহস্থার চাপাবোধ, বারম্বার বাহ্যের বেগ, বাহ্যের দক্ষণ মনে হয় যেন তবল ভেদ হইবে ; রাত্রিতে পিষ্টের স্থায় সবুজ, জরাজ হরল ভেদ এবং দাস্তের পূর্বে উদরে গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হয় ; সবুজ শ্বেতা ভেদ (এপিস্, আর্জেন্ট-নাইটিক্, আর্স্, বেল্, ইপিকাক্, মার্ক্, সাল্ফ্) ; চট্-চট্ তরল, সরস শ্বেতা মিশ্রিত পদার্থ ভেদ, অথবা কেবল শ্বেতা ভেদ ; বারম্বার ভেদ (মার্ক্-কর) ; রক্ত মিশ্রিত শ্বেতা ভেদ হয় বটে, কিন্তু পেট বেদনা বা যাতনা থাকে না ; উদরাময়ের দক্ষণ রোগী বিশেষ ভদ্র হয় না (কস্-আস্) ; কোষ্ঠবদ্ধ ; মলত্যাগে অত্যন্ত কষ্টবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠদেশে কষ্টদারক চাপ এবং বেদনাত্ত্বভব ; কলাদি খাটয়া উদরাময় ; তৈলাক বা চর্কিবৃক জ্বা পাটয়া পেটের অত্যন্ত বা উদরাময় ; রক্ত এবং শ্বেতা মিশ্রিত উদরাময় এবং দাস্তের সময় শীত বোধ ।



মূত্রযন্ত্র । বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা (ক্যাছ, ক্যাম্প, মার্ক-কর); স্পর্শ করিলে মূত্র কোষ প্রদেশ বেদনায়ুক্ত হয় ; মূত্রাধারে অত্যন্ত চাপা বোধ, কিন্তু মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা থাকে না ; মূত্র ত্যাগের সময় এবং উহার পর মূত্র নালীতে আলামুভব (ক্যানাবিস-স্যাট্, ক্যাছ) ; বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে মূত্র নির্গত হয় না এবং মূত্র নালীতে কর্তন-বৎ যাতনা অল্পভূত হয় ; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্র ত্যাগ (আস্, বেগ্, হারোস্) ; রাত্রিতে স্বপ্নে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্রত্যাগ (বিছানায় প্রস্রাব করা) (আপিকা, কুপ্রাম, গ্রাফ), প্রধানতঃ ছোট বালিকাগণের কাশিবার এবং বায়ু নিঃসরণের সময় (কষ্ট্, নেট্রাম্-মিউর) ; বারম্বার মূত্র ত্যাগ ; প্রচুর পরিমাণে মূত্র ত্যাগ (এপিস্, আপোসাইনাম্, আজেন্ট্, সিপ', বার্বেরিস্) ; মূত্র জলের ত্রায় বর্ণহীন বা কটাবর্ণ, রক্তমিশ্রিত ; রক্তমূত্র (Haematuria) এবং মূত্রের সঙ্গে পূঁষ নিঃসরণ ও মূত্রকোষে বেদনা (আস্, ক্যানাবিস্, ক্যাছ, ফন্) ; প্রমেহ রোগে ধাতুর ত্রায় ক্রৈদ নিঃসরণ (ফাইটোল্) ।

জননেন্দ্রিয় । উদর হইতে শুক্র নিঃসারক স্ত্রের (Spermatic Cord) মধ্য দিয়া অণ্ডকোষে কসিয়া বা ঘাটিয়া ধরার ত্রায় বেদনা বা যাতনা (বার্বেরিস্, হামামেলিস্, মার্ক্) ; অণ্ডকোষের ক্ষীতি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে টাটানি এবং ছিঁড়িয়া ফেলার ত্রায় বেদনা ; অণ্ডকোষাধারের ডাইন অংশের ক্ষীতি (ক্রিমেটিন্) ; পুরুষাঙ্গের গোড়ায় প্রষ্টেট্ গ্রন্থির (Prostrate gland) বিবৃদ্ধি ; রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে বা স্বপ্নে ধাতু নিঃসরণ (চায়না, ফন্) ; প্রমেহ রোগে মূত্রনালী দিয়া গাড় হরিদ্রা বা সবুজের আভায়ুক্ত হরিদ্রাবর্ণের ক্রৈদ নিঃসরণ (আগ্-নাশ্, হাইড্রাট্) । জীলোকের রক্তঃস্রাবের সময় (জরায়ুর অস্থব থাকিলে), একখানি পাথর চাপিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, উদরে এবং কোমরের পশ্চাত্ভাগে সেরূপ চাপিয়া ধরার ত্রায় বেদনা বা যাতনা (আলাম্, সিমিসিক্, কলোফিলাম্) ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহজে ঝিঁ ঝিঁ ধরিবার স্বভাব ; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না ; জরায়ুর দিকে কসিয়া বা চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃকালে

বমনোদ্বেষণ ; রক্তঃস্রাবের সময় পায়ের পাতা জলে ভিজার দ্রবণ হঠাৎ রক্তঃরোধ ; জরায়ুর বামপার্শ্বে প্রসব বেদনায় ন্যায় সঙ্কোচক বেদনা, বাহ্যিক দ্রবণ রোগী হাঁটু ওটাউয়া জড়নড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; নিয়মিত সময়ের অনেক পর, অল্পকাল স্থায়ী, স্বল্প রক্তঃস্রাব (সিমিসিক্, সাল্ফ্) ; হয় একবারে রক্তঃরোধ, নতুবা সবিরাম রক্তঃস্রাব (সিমিসিক্) ; রক্ত গাঢ় এবং কাল্চে (ইয়েস্), দিনের বেলা চলিয়া বেড়ানোর সময়ই রক্তঃস্রাব অধিক হইয়া থাকে (কেবল রাত্রিতে রক্তঃস্রাব হইলে ম্যাগ্নেস্-কার্ক্) ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে, অল্পকাল স্থায়ী স্বল্প রক্তঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তলপেটে খিল ধরা ; ঠাণ্ডা লাগিয়া রক্তঃরোধ ; বালিকাগণের গোণে এবং কষ্টকর প্রথম রক্তঃস্রাব (গ্রাফ্) এবং রক্ত কাল্চে থানা থানা এবং পচা দুর্গন্ধযুক্ত, অথবা রক্ত সাদাটিয়া শ্লেষ্মার ত্রায পদার্থ মিশ্রিত ; তলপেটে রক্তঃস্রাবজনিত বেদনা এত প্রবল হয় যে উহার দ্রবণ রোগী বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছটফট করে এবং চীংকার করিয়া কীড়ে ; রক্ত কাল্চে এবং গাঢ় বা মাছ মাংস ধোরা জলের ত্রায অত্যন্ত ফিকা লালবর্ণ তরল রক্তঃস্রাব ; উষ্ণ বা লনির ন্যায় গাঢ় শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ (ক্যাক্-কার্ক্, কোনায়াম্, সিপিয়া, সাল্ফ্-অ্যাস্) এবং উহাও সঙ্গে সঙ্গে ঘোনির ক্ষোতি ; কোন প্রকারের ঘটনা দৃষ্ট হইত শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ; উগ্র, জ্বালা উৎপাদক এবং ক্ষতকারক শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ (আলাম্, কোনায়াম্, ক্রিয়াজ্, মার্ক্, কস্) ; অনিয়মিত প্রসব বেদনা ; জরায়ুর মধ্যে ক্রমের অস্বাভাবিক অবস্থান (বেল্, কলোফিলাম্, নাস্-বম্) ; সস্থান প্রসবের পর স্তনের দুধের হ্রাস বা উহার সঞ্চার একভাবে বদ্ধ হওয়া (আগ্রাশ্, হারোস্) ; সস্থান প্রসবের পর ঘোনিহার দিয়া দুধের ত্রায সাদা ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ ; সস্থান প্রসবের পর তলপেটে অত্যন্ত বেদনা (ভাদলির কামড়, —আদ্যার ব্যাথা, —After pains) ; যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে বালিকাগণের স্তন ডেলার ন্যায় কঠিন হইয়া থাকে এবং উহা দিয়া কখন কখন পাতলা দুধের ন্যায় তরল পদার্থ নির্গত হয় ।

ঔষ্যসম্বন্ধ । কণ্ঠনালীতে হাড়-হুড়ী এবং উহাতে টাচিয়া ফেলার ত্রায অল্পকাল হওয়ার দ্রবণ চক্ষু দিয়া জল পড়ে এবং শুষ্ক কাশির উদ্রেক হয় ;

কঠিনালীতে সঙ্কোচন, রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিলেই বাহ্য অধিক অম্লভূত হয়; স্বরভঙ্গ এবং গলার মধ্যে খণ্ড খণ্ডে বোধ, বাহ্যার দরুণ রোগী জোরে একটি কথাও বলিতে পারে না (কষ্ট, হিপ্পোসাল্ফ, ফস্); সন্ধ্যার সময় বা স্নাত্তিতে শয়ন করিয়া থাকিলে শুষ্ক কাশি (কোনায়াস্, মেজি-রিয়াম্, নাক্স-বম্, ক্রমেজ্, সাল্ফ্); বিছানার উঠিয়া বসিলে কাশি থাকে না, কিন্তু শয়ন করিলেই আবার কাশির উদ্রেক হয় (হায়োস্); কাশির দরুণ গলার মধ্যে শুষ্কাম্লভূত হয়, ঘুমের ব্যাঘাত জন্মে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং বমনোদ্বেষ্ট হয়; গলা দিয়া অতি কষ্টে শ্লেষ্মা নির্গত হয়; গলা দিয়া হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন (ক্যাক্স-কার্ক্); গলা দিয়া তিক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন; গলা দিয়া চাপ্ চাপ্ থানা থানা রক্ত নির্গমন (নাক্স-বম্); বুকের নিম্নাংশে আঁটা বোধ, বাহ্যার দরুণ মনে হয় যেন উক্ত অংশ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। প্রাতঃকালেই এই প্রকারেব যাতনা অধিক অম্লভূত হইয়া থাকে (বেল্ফস্); বৃক্ক আঁটা বোধ; বৃক্ক খিল ধরার জ্বর সঙ্কোচন হেতু অত্যন্ত কষ্টানুভব; বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং তদরুপ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং হৃৎস্পন্দন হয়; বুকের মধ্যে চাচিয়া ফেলার জ্বর জ্বালা এবং টাটানি, বাহ্যার দরুণ কাশির উদ্রেক হয় (ক্যাম্); বুকের মধ্যে ক্ষত হওয়ার জ্বর যাতনা (সোরিনান্); শয়ন করিয়া থাকিলে, রাত্রিতে, শ্বাস টানিলে, অথবা কাশিলে বৃক্ক এবং পার্শ্বে সূচী-বিধানের জ্বর বেধনা বা যাতনা (একন্, ব্রাই, ক্যালৌ-কার্ক্); কাশি, এবং গলা দিয়া সহজেই হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন, প্রধানতঃ প্রাতঃকালে (ক্যাক্স-কার্ক্, ফস্, আস্, ষ্টানাম্, সাল্ফ্); কাশি এবং তদরুপ গলা দিয়া কাল জমাট রক্ত পড়ে (কলিন্সন্, নাইট্-ক্-আস্); চীৎ হইয়া শয়ন করিলেই শ্বাস কষ্ট।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপ্রদেশে আঁকড়াইয়া ধরার জ্বর বেধনা বা যাতনা, হাত দিয়া চাপিয়া রাখিলে কতক্ষণের জন্ত বাহ্যার উপশম হয়; মধ্যাহ্নে আহারের পর হৃৎস্পন্দন এবং মনের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন; বৃক্কঃস্রাবের বৈলক্ষণ্য এবং মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগের সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন। নাড়ীর প্রত্যেক বার স্পন্দনই পাকস্থলীর মধ্যে অম্লভব করা যায়।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। বাতরোগে ঘেরুপ হয়, ঘাড় কদিয়া ধরার

জ্বর সেরূপ বেদনা এবং গ্রীবা শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (কল্চ্);  
 ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশে ঘাটিয়া ধরার জ্বর বেদনা বা যাতনা; অনেকক্ষণ মাথা  
 হেট্ করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে যেৰূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎভাগে সেরূপ  
 বেদনা বা যাতনা (আনিকা, চায়না); মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁংলিয়া গেলে  
 যেৰূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎভাগে সেরূপ বেদনা (সাল্ফ); নড়িলে চড়িলে  
 কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা বা যাতনা; বসার পর কোমরের পশ্চাৎভাগে  
 উক্ত প্রকারের বেদনা বা যাতনা; প্রসব বেদনার সময় যেৰূপ হয়, কোমরের  
 পশ্চাৎভাগে সেরূপ বেদনা বা যাতনা (কলোফিলাম্, সিমিসিফ্, ক্রিয়াঙ্),  
 যাহার দরুণ মনে হয় যেন কোমর এক গাছি ফিড়া দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া  
 রাখা হইয়াছে; কোমবে কসিয়া বা ঘাটিয়া ধরার জ্বর বেদনা বা যাতনা;  
 ক্রান্ত হইলে যেৰূপ হয়, গুহ্বারের উপরিভাগে, সন্ধ্যার সময় সেরূপ বেদনা  
 বা যাতনা।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সন্ধি ক্ষীত এবং  
 লালবর্ণ (ব্রাই) এবং উহাতে ছল ফুটানের জ্বর বেদনা, বা যাতনা (এপিস);  
 অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা বা যাতনা (একন)  
 বাহ্য এক স্থান হইতে অভ্যন্তর হঠাৎ সরিয়া পড়ে এবং স্নাত্তিতে ও উষ্ণ-  
 তাতে যাহার বৃদ্ধি হয় (মার্ক্) এবং গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলে যাহার  
 উপশম হয়; যে পার্শ্বে শয়ন করা যায়, সে পার্শ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিংকি ধরিয়া  
 একবারে অসাড় হয় এবং উহাতে স্ফুড় স্ফুড় ও কুট্ কুট্ করে। পিটিলে  
 যেৰূপ হয়, বাহ্যে সেরূপ অবশ্য এবং ভারিবোধ; স্বস্তির সন্ধি বাহ্য, হাত  
 এবং আঙ্গুলে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা (ব্রাই, লেডাম্,  
 রাস্-টল্ল); কনুইয়ের সন্ধির ক্ষীতি এবং উহাতে মোচড়াইয়া পড়া বা মচ্কা-  
 ইয়া যাওয়ার জ্বর বেদনা বা যাতনা। কুচ্কির সন্ধিতে মচ্কাইয়া  
 বাওয়া বা সরিয়া পড়ার জ্বর বেদনা; কুচ্কির সন্ধি হইতে হাঁটুর সন্ধি  
 পর্যন্ত কসিয়া ধরা, চিড়িক্ মায়া বা হঠাৎ ধাক্কা লাগার জ্বর বেদনা বা  
 যাতনা; কটিদেশ বা পাছা এবং উরুদেশের পেশী ও অস্থিতে মোচড়াইয়া  
 পড়ার জ্বর বেদনা; উরুদেশ এবং শাখ কসিয়া বা ঘাটিয়া ধরার জ্বর  
 বেদনা এবং তদরূপ অত্যন্ত অস্থিরতা, নিদ্রাশূন্যতা এবং শীতবোধ; হাঁটুর

সন্ধির ক্ষীতি, কিন্তু উহাতে বেদনা থাকে না; হাঁটুর সন্ধি অত্যন্ত ক্ষীত এবং উহাতে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ভয় বেদনা; পা এবং পায়ের পাতার কসিয়া ধরা, ভারি এবং শ্রান্তিবোধ; সন্ধ্যার সময় শরন করিলে পায়ের খিলধরা (সাল্ফ); পায়ের পাতা প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ, উষ্ণ এবং ক্ষীত (ব্রাই) এবং উহাতে ঘাটিয়া ধরার ভয় বা জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যাতনা; পায়ের পাতার তলায়ও উক্ত প্রকারের বেদনা বা যাতনা অমূল্য হইয়াছে; পায়ের শিরার প্রদাহযুক্ত ক্ষীতি বা বিস্তৃতি (চামামেলিস্, জিক্); শেষ বেলায়, সন্ধ্যার কিছু পূর্বে, পায়ের গোড়ালী (গোড়মুড়াতে) ছিদ্র করার ভয় বেদনা (জিক্); পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ভয় ক্ষত এবং উহাতে জ্বালা, চড়্‌চড়ানী এবং চুলকানি।

চর্ম্ম। শরীরের স্থানে স্থানে জ্বালা, কামড়ানী, চুলকানি,—বিছানার উষ্ণতা, সন্ধ্যার সময়, রাত্রি দুই প্রহরের পূর্বে, চুলকাইলে এবং চলিবার সময়, শরীর উত্তপ্ত হইলে যাহার বৃদ্ধি হয় (ক্রিমিটস্, মার্ক্, মেজি-রিয়াম্, সাল্ফ); গার হামের ন্যায় ফুসুড়ী (আণ্টি-কুড্, ব্যাপ্ট, ককিয়া, রাস্-টন্স্); গার আমবাতের ন্যায় ফুসুড়ী (এপিস্); শুকরের মাংস বা চর্ষিযুক্ত দ্রব্য পাইয়া গায়ে জল বসন্তের ভয় ফুসুড়ী বাহির হওয়া; বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) এবং তদ্রূপ আক্রান্ত স্থানের ক্ষীতি ও কঠিনতা এবং স্পর্শ করিলে, নাড়িলে উহাতে অত্যন্ত জ্বালা ও হল ফুটানের ভয় বেদনা বা যাতনার উদ্রেক হওয়া (বেল্)।

নিদ্রা। অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যার প্রারম্ভে অনিবার্য ঘুমের ইচ্ছা; সন্ধ্যার সময় ঘুম হয় না; প্রথম রাত্রে ঘুম হয় না; শেষ রাত্রে ঘুম হয়; অস্থির নিদ্রা বা বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত গরমবোধ; ভয় খাইলে স্নেহরূপ হয়, ঘুমেরঘোরে স্নেহরূপ বারম্বার জাগিয়া উঠা; এলোমেলো, ভয় উৎপাদক স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা (আণিকা, অরাম্, রাস্-টন্স্, সাল্ফ); বারম্বার হাইতোলা; দিনের বেলা নিদ্রাবেশ (মার্ক্, নাক্স-বন্, ফস্); মনের মধ্যে নানা প্রকারের ভাব আসিয়া ঘুমের ব্যাধাত জন্মায়।

জ্বর। উষ্ণ বয়েও অনবরত আত্যন্তিক শীতবোধ; সন্ধ্যার সময়

শীতের বৃদ্ধি (আস্, বেল্, ফস্, রাস্-টঙ্ক্) ; গরম জল ছিটাইয়া দিলে  
যেৰূপ হয়, গায় সেৰূপ উষ্ণাহুতব এবং তদৰূপ অত্যন্ত উষ্ণেণ ; সম্ভার সময়  
এবং রাত্রিতে শুক এবং অত্যন্ত জ্বালাবৃত্ত উষ্ণাহুতব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে  
শিরার স্বীতি এবং বিস্তৃতি (চাঘনা) ও হাতের তাবুতে অত্যন্ত জ্বালাহুতব,  
যাহার দৰূণ হাত কোন একটা ঠাণ্ডা বস্তব উপর বা ঠাণ্ডা স্থানে রাখিতে টঙ্কা  
হয়; পিপাসা থাকে না (ইয়েস্, ফস্) ; প্রাতঃকালে প্রচুর ঘৰ্ম্ম (ক্যাক্-কার্ব্,  
নাইট্রিক্-আস্, রাস্-টঙ্ক্) ; শরীরের এক পার্শ্বে ঘৰ্ম্ম ; সবিরাম বা পালা-  
জব, যাহাতে শীতলাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং উষ্ণাবস্থা অল্পকাল স্থায়ী হয় ও  
পিপাসা একবারেই থাকে না ; কখন কখন শীতলাবস্থা বা ঘৰ্ম্মাবস্থার পূৰ্বে  
পিপাসা থাকে, কিন্তু উষ্ণাবস্থায় কদাচিত পিপাসা থাকে । সবিরাম বা  
পালা-জরের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পেটের অস্থখ থাকে (আণ্টি-কুড্, ইপিকাক্,  
নাস্-বম্) ।

ব্যবহার । শ্লেষ্মাজনিত অস্থখ, প্রধানতঃ যে সকল অস্থখে শ্লেষ্মা  
গাঢ়, গন্ধহীন, হরিত্রাণ আভাযুক্ত, সবুজবর্ণ হয় ; রহৎ এবং ক্ষুদ্র সন্ধিবাত-  
জনিত অস্থখ ; স্ত্রীলোকের রজঃরোধ ; কঠকর রজঃশ্রাব এবং বাধকের বেদনা  
(Painful Menstruation) ; মূত্রিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) ; শ্বেতপ্রদর ;  
সন্তান প্রসবের পর প্রসূতীর তলপেটাदिতে বেদনা (After-pains) ;  
সন্তান প্রসবের পর ক্লেন (Lochia) নিঃসরণ কষ্ট হওয়া ; পায়ের শিরার  
সাদা স্বীতি (Phlegmasia Alba Dolens) ; স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া যাওয়া ;  
স্তন স্বীত এবং উহাতে টাটানি ; জরায়ুর সকল প্রকাৰের অস্থখ ; রজঃ-  
রোধ এবং অনিয়মিত রজঃশ্রাব হেতু অস্থখ ; হিষ্টিরিয়া ; একশিরার ব্যাধাম  
(Orchitis) ; মেলঞ্চলিয়া (Melancholia) ; স্বাণ্ণশূল ; চক্ষুপ্রদাহ ; কান দিয়া  
পূঁচ পড়া ; কর্ণশূল ; অতিরিক্ত দ্রুত মদলা দ্বারা বীণা বা তৈলাক বা চৰ্কিবৃক্ক  
জবা বা শুকরের মাংস খাইয়া অস্থখ ; হাম ; আমবাত ; রাত্রিতে স্বপ্নে বা  
অনিচ্ছাপূৰ্ব্বক ব্রহ্মভাগ (বিচানায় প্রস্থাব করা) ; শিরার স্বীতি এবং  
বিস্তৃতি ; পেটের অস্থখ সম্বলিত ক্ষর ; ঠাণ্ডা লাগিয়া কানে কন শুনা ;  
নাক দিয়া রক্ত পড়া ; উদরানয় ; আমাশয় ; বমন সম্বলিত অজীর্ণ রোগ ;  
পাকস্থলীতে বেদনা ; মেদ্রা বা পিত্তসংযুক্ত উদরাময় ; মূত্রাশয়ের শ্লেষ্মাজনিত

অস্থখ; প্রমেহ রোগ; অণ্ডকোষের প্রদাহজনিত ক্ষতি; কৃত্রিম প্রসব বেদনা (False Labour-pains); সন্তান প্রসবের পর জরায়ু হইতে ফুল (Placenta) নির্গত না হওয়া; প্রসব বেদনা আরম্ভ হইতে না হইতেই একবারে কমিয়া বা চলিয়া যাওয়া; আক্ষেপিক প্রসব বেদনা; রক্তোৎকাশ; হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক অস্থখ; হাত পায়ে পাতার প্রদাহজনিত শোথের দ্বারা ক্ষতি; হাঁপানি জনিত অস্থখ; বৃক্‌ জ্বালা এবং মুখে বিশ্রী এবং টক স্বাদ বিশিষ্ট জল উঠা; সর্দি; কাশি; চক্ষুর পাতায় ব্রণ বা আঞ্জনী (Stye on the Eyelids); চক্ষুর পাতার স্পন্দন এবং চক্ষে আলোক সহ্য না হওয়া; জ্বীলোকের স্তনদ্বন্ধ শুকনাইয়া যাওয়া; তরুণ এবং পুরাতন আকারের সঘিরাম বা পালা-জর ইত্যাদি অস্থখে পাল্‌সেটিল। ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় শরীরে দপ্পদপানি; শাস্ত প্রকৃতির জ্বীলোক বাহারা সর্বদা কঁাদে, কঁাদ কঁাদ হব, বা সামান্য কারণেই দ্রুত প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী; সকলপ্রকার যাতনা বা অস্থখের সঙ্গে সঙ্গেই শীতবোধ; বেদনাদি একস্থান হইতে অল্প স্থানে অনবরত সরিয়া পড়া; জ্বালাবুল, হল কুটানের দ্বারা বেদনা বা যাতনা; গা ভাঙ্গার ইচ্ছা; বিড়ক বায়ু সেবনের ইচ্ছা; প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই সমুদয় শরীরে অস্থখ বোধ, চলিয়া বেড়াইলে যাতা থাকে না; সন্ধ্যার সময়, ঘোর সন্ধ্যার সময়, একদিন পব একদিন সন্ধ্যার সময়, রাত্রিতে, বিহানার উচ্চতাতে, শয়ন করিয়া থাকিলে (প্রধানতঃ বামপাশে), উষ্ণ ঘরে, আহারের পর (প্রধানতঃ তৈলাক্ত, চর্বিযুক্ত দ্রব্য, শুকরের মাংস, বরফের কুন্ডা, ফল বা শাকাদি খাইলে) অস্থখের বৃদ্ধি; এবং বহির্কায়ুতে, ঠাণ্ডা স্থানে বাত এবং চীত হইয়া শয়ন করিলে অস্থখের হ্রাস হয় ইত্যাদি পাল্‌সেটিলার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। পাল্‌সেটিলার সমগুণ বিশিষ্ট অল্প কোন ঔষধ আছে কি না সন্দেহ। তবে কোন বিষয়ে পাল্‌সেটিলার কার্যের সঙ্গে সিমিসকিউগা, আন্টিমোনিয়াম্‌ ক্রুডাম্‌, কলোফিলাম্‌, কোনায়াম্‌, সাইক্রেমেন্‌, হামামেলিস্‌, সিপিয়া, আর্সিনিক্‌, বেগাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ক্‌, ক্যামোমিলা, চায়না, ককিউলাস্‌, কলো-

সিহ, ফেরাম, ইগ্নেসিয়া, ক্যালী-বাইক্রমিকাম্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিট-  
রিয়াস, নাক্স-বমিকা, নাক্স-মফেটা, প্লাটিনা, ফফরাস, রাস্টর্ক, শাইলি-  
সিয়া, সালফার এবং জিঙ্কামের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

**প্রতিষেধক ঔষধ।** ককিয়া, ক্যামোমিলা, ইগ্নেসিয়া, নাক্স-  
বমিকা ইত্যাদি পালসেটিলার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

**ডাইলুশন বিচার।** ৩, ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যব-  
হৃত হইয়া থাকে। পেটেব অস্থে ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন আমরা  
সচরাচর ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকি। অণ্ডকোষের প্রদাহ-  
দিতেও ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন উপকারী। স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ  
প্রদাহেও (Ovaritis) ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন উপকারী। চক্ষু এবং  
কর্ণের অস্থ এবং বাত রোগে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম ব্যবহার্য। ক্ষুদ্র শঙ্কিবাত  
(Gout) ৬ এবং ১২ ডাইলুশন উপকারী। জ্বরায়ু এবং ডিম্বকোষের অস্থে  
৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার্য। কাশি এবং সন্দিগ্ধ ৬ষ্ঠ ডাঃ ব্যবহার্য।  
শিরার অস্থেও ৬ষ্ঠ ডাঃ ব্যবহার্য। কৃত্রিম প্রসব বেদনা এবং সন্তান প্রস-  
বের পর পেটে বেদনা (ভাদলির কামড়,—আদলার ব্যাথা,—After-  
pains) ইত্যাদিতে ৩০ ডাঃ বিশেষ উপকারী। কখন কখন কৃত্রিম  
প্রসব বেদনায় ২০০ ডাঃ দ্বারা অন্ত্যন্ত ডাঃ অপেক্ষা অধিক উপকার  
দর্শিতে দেখা যায়। শ্বেত প্রদর এবং রক্তঃস্রাব সম্বন্ধীয় অস্থে  
৩০ ডাঃ ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। রক্তঃস্রাব সম্বন্ধীয়  
অস্থে কোন কোন চিকিৎসক ১ম দশমিক এবং মূল আরোক এক কোঁটা  
মাত্রার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন  
যে, কষ্টকর রক্তঃস্রাব এবং বাধকের বেদনায় (Painful Menstruation)  
১ম দশমিক ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় তিনি  
বিশেষ ফল পাইয়াছেন।



## রাস্ টক্সিকোডেণ্ড্রন,—রাস্ টক্স ।

(RHUS TOXICODENDRON,—RHUS TOX.)

তিন প্রকার রাস্ আছে । যথা:—(১) রাস্ টক্সিকোডেণ্ড্রন, (২) রাস্ রাডিকান্স এবং (৩) রাস্ বিনিনেটা । এখানে কেবল রাস্ টক্সিকোডেণ্ড্রনের বিষয়ই উল্লেখ করা হইবে । উত্তর আমেরিকাতে এই গাছের জন্ম হয় । যে এবং জুন মাসে ফুল হওয়ার পূর্বে এই গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়া ৪০° ডিগ্রী ওয়ার্ম প্রুফ্ (40° Over-proof) স্পিরিটে যথা নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । লিম্ফটিক গ্রন্থি (Lymphatic glands), চর্ম, পেশী এবং সন্ধির উপর এই ঔষধের কার্য অতি প্রবল । প্রথমতঃ আক্রান্ত স্থানের উত্তেজনা হয় এবং তৎপর উক্ত উত্তেজনা প্রদাহে পরিণত হইতে পারে । অথবা প্রদাহ না হইলে উহাতে সিরাম (Serum) নামক ফেন বা জলের স্তায় পদার্থ সঞ্চিত হইয়া শোথ হয় বা কাটিয়া বাইরা উঠা হইতে জলের স্তায় কলতানি পড়ে । এই প্রকার উত্তেজনার অবস্থা চর্মেরই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় । এই গাছের পাতা গায় লাগিলে অথবা উহার নিকট থাকিলেও অনেক সময় চর্ম লালবর্ণ এবং উহাতে ভয়ানক আকারের জলপূর্ণ ফোড়ার স্তায় ফুসুড়ী বিশিষ্ট বিদর্প বা ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) প্রকাশ পাইতে পারে । চর্মের উপর কার্যের স্তায় লিম্ফটিক গ্রন্থির উপরও ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, বাহার দকণ উহাতে বিকচ (Eczema) এবং ফোড়ার স্তায় ফুসুড়ী প্রকাশ হইয়া পাকে । চক্ষুর বোজক ঝিল্লীর (Conjunctivæ) উপর ইহার কার্য অতি প্রবল । এতদ্ভিন্ন শরীরের অন্যান্য বস্তুর লিম্ফটিক ঝিল্লীর উপরও ইহার কার্য অধিক বা কম পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় । শরীরের যে সকল আঁশাল অংশে মাস্কি ঝিল্লী আছে (Sero-fibrous tissues), ঐ সকল অংশ আক্রান্ত হইয়া উহার পেশী এবং সন্ধিতে বাতের স্তায় প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া পেশীর আবরক কঠিন পর্দা (Fascia), পেশীর কঠিন অগ্রভাগ

(Tendons) স্নায়ুর আবরক পর্দা (Sheaths of nerves), সন্ধির লিগামেন্ট্‌স্ (Ligaments) এবং অংশাল অংশ পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়া থাকে। শরীরের সমুদয় অংশের লিম্ফেটিক্ গ্রন্থি গুলিই বর্ধিত এবং প্রদাহযুক্ত হয়। কোষিক কিল্লোতে (Cellular Tissues) ফেনবৎ পদার্থ বা সিরাম (Serum) সঞ্চিত হইয়া উহার পরিপোষণ কার্যের অবসরতা, হ্রাস বা বিকৃতি হইয়া থাকে, বা উহার ব্যাঘাত জন্মে। প্রকারান্তবে ইহা হেল্লিয়ারদির কাথোর জড়তা এবং মস্তিষ্কের এমন অবস্থা উৎপাদন করে যাহা বিকারের লক্ষণাক্রান্ত জ্বর বা মোহ-জ্বর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্রাম কালীন লক্ষণাদির বৃদ্ধি এবং নড়াচড়াতে উহার উপশম, রাস্-টক্সের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সর্বদাই চিন্তা এবং ভয়ের ভাব যাহা স্ফূর্তির সময় এবং রাগিতেই অধিক হইয়া থাকে (আর্স্, ক্যাক্-কার্ণ, মার্ক্); উক্ত প্রকার চিন্তাদির সঙ্গে সঙ্গে নিচ্ছিনে থাকার ইচ্ছা (কার্কো-বেজ্, ইথ্রেস্) এবং কাঁদিবার ইচ্ছা (লাউকোপ্, নেট্‌ম্-মিউর, পাল্‌স্), ঘরে বসিয়া থাকিলে বাহ্যিক বৃদ্ধি হয় এবং বহির্বায়ুতে বেড়াইলে বাহ্যিক উপশম হয়; মনের উদ্বিগ্ন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতা, বাহ্যিক দরুণ রোগী বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না (এক্‌ন্, এথুজ্, আর্স্, ক্যাম্‌ফার্); মুহূর্ত্তম; (আর্স্, ব্রাই, নাক্স-বন্, সিকেল্); সর্বদা খিট্-খিট্ করা, অবৈর্য্য হওয়া, চিড়্-চিড়্ করা এবং সহজেই বিবক্ হওয়া (ব্রাই); সহজে সকল বিষয় ভুলিয়া যাওয়া; কোন বিষয় সহজে বুদ্ধিতে অশক্তি; অল্প দিনের খটনাও স্মরণ রাখিতে অশক্তি (কন্-আস্); চুপে চুপে, বিড়্-বিড়্ করিয়া প্রাণাপ বলা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অবসরতা এবং জ্ঞান রহিত হওয়া; আত্ম হত্যার ইচ্ছা।

মস্তক । মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় গোলমেলে এবং চিনা বোধ; নেসা করিলে যেক্রপ হয়, সেক্রপ মাথা ঘোরা এবং চলিতে টলিয়া পড়া (চায়না, ককিউলাস্, নাক্স-বন্, পাল্‌স্); বিছানা হইতে উঠি

কার সময় মাথা ঘোরা (ব্রাই, ফন্স) ; মাথার পূর্ণ এবং ভারিবোধ ও কপালে একটা ভারি বস্তু চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মাথার সেরূপ নিম্ন দিকে ঠেলিয়া নামার ভাষি অনুভূত হয় ; চলিবার সময় বা সিঁড়িদিয়া নামিতে বা মাথা ঝাকিলে মনে হয় যেন মস্তিষ্ক ঢল্ ঢলে হইয়াছে এবং মাথার হাড়ের মধ্যে যেন বারম্বার আঘাত করিতেছে (চায়না, নাক্স-মক্স, হায়োস্, সাল্-ফ্-আস্) ; মাথার পশ্চাৎভাগে কন্কনানি, ঘাড় পশ্চাৎ দিকে ঝাঁকা করিলে যাহা থাকে না ; স্পর্শ করিলে মাথায় লাগে (চায়না, মার্ক্, মেজিরিয়াম্) ; মাথার কল্-তানি এবং পূঁষ বিশিষ্ট কুসুড়ী এবং উহাতে গুরু চুমটী (থোসা) পড়ে ও উহার দরুণ বস্ত্রাদির বৃদ্ধি হয় (গ্রাক্, লাইকোপ্, মার্ক্, ষ্টাকিস্, সাল্-ক্) ।

চক্ষু । চক্ষু এবং চক্ষুর পাতা প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ ও ক্ষীত হওয়া এবং রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা (আন্টি-ক্রুড্, কষ্ট্, গ্রাক্, লাইকোপ্, মার্ক্, আল্-স্, ফন্স্, সাল্-ফ্, জিক্) ; সমুদয় চক্ষু এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানের ক্ষীতি (আন্) ; চক্ষুর পাতার শোথ এবং উহার স্থানে স্থানে বিসর্পে যেরূপ হয় (Frysipelatous) সেরূপ ফোঁসার ন্যায়, জলপূর্ণ কুসুড়ী ; চক্ষুর যোজক ঝিল্লী এবং চক্ষুর পাতার উপস্থিতির মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থির (Meibomian glands) বিবৃদ্ধি এবং চক্ষুর পাতার পক্ষ (Lashes) পড়িয়া যাওয়া ; চক্ষু এবং চক্ষুর পাতায় জ্বালা এবং চুলকানি (সাল্-ফ্) ; বালি প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষুর মধ্যে সেরূপ চাপা বোধ এবং কন্কনানি (আন্, কষ্ট্, হিপ্-সাল্-ফ্, পাল্-স্, সিপিয়া, সাল্-ফ্) ; চক্ষুর পাতার পক্ষাঘাতের ভাষি জড়তা বা কঠিনতা (কাল্মিয়া) ; চক্ষু ঘুবাণের সময় বা চাপ দিলে চক্ষুর গোলক টাটার (স্পাইঞ্জেল্) ; চক্ষুর সম্মুখে একখানি পাতলা বা মিহি কাপড় রাখিলে যেরূপ হয়, চক্ষে যেরূপ ঝাপসা দেখা (কষ্ট্, পিটোল্, ফন্স্, পাল্-স্, সাল্-ফ্) ।

কর্ণ । কর্ণশূল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাম কর্ণের মধ্যাংশ ক্ষীত হওয়া ; কর্ণমূলস্থ গ্রন্থির প্রদাহ, ক্ষীতি এবং উহাতে পূঁষ হওয়া ; রাত্রিতে কানের মধ্যে চিড়িক মাঝা এবং দপ্-দপিয়া বেদনা ; কান দিয়া রক্ত সংযুক্ত পূঁষ নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে কম শুনা ।

নাসিকা । বায়ুদ্বার অবল ইন্টি ; রাত্রিতে বা প্রাতঃকালে নাক দিয়া রক্ত পড়া ; অরবিকারে, এবং মাথা-হেট করিয়া উণ্ড হইলেই নাক দিয়া রক্ত পড়া ; নাক শোথের দ্বার ক্ষীত (এপিস্) ; নাসিকার অগ্রভাগ লালবর্ণ (বেল্) এবং স্পর্শনে বেদনামুক্ত হয় ; নাকের মধ্য টাটায় ; বায়ু নাসারন্ধ্রের নীচে টাটানি ; নাক দিয়া সবুজ বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত ক্রেন্দ নিঃসরণ ।

মুখমণ্ডল । মুখাকৃতি রুগ, বসিরা যায় এবং ঢক্ষ নীলের আভাযুক্ত রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় (ফস্, সাল্ফ্) ; মুখ মণ্ডলের সিসপের দ্বার প্রলাহ এবং ক্ষীতি (গ্রাফ্) এবং উহাতে জ্বালা, চিড়িক দ্বারা এবং হৃদ্ হুড়ী ; মুখ মণ্ডলের আক্রান্ত স্থানে ফোকার দ্বার জল পূর্ণ কুহুড়ী (সিষ্টাস্) ; নিম্নমুখ সঞ্চালনে কানের নিকট খিল ধরার দ্বার বেদনা বা যাতনা ; নিম্নমুখের কোণের নীচের গ্রন্থিগুলিতে খাল ধরা বা চাপিয়া ধরার দ্বার বেদনা বা যাতনা ; গুষ্ঠের কোণে ক্ষত এবং উহাতে জ্বালা এবং চড়্ চড়ানি (আন্টি-ক্রুড্, গ্রাফ্, লাইকোপ্, সাইলিস) ; মুখমণ্ডলে কলন্তানি বিশিষ্ট কুহুড়ী এবং উহাতে পুরু চুমটি (খোসা) পড়া (লাইকোপ্, মার্ক্, ষ্টাকিস্) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁতের গোড়ার দপ্ দপ্ করা বা হৃদ্ হৃদ্ করার দ্বার বেদনা বা যাতনা, বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগে বাহার উপ-দ্রব হয় ; দাঁত যেন আভাবিক অপেক্ষা লম্বা হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (আস্, মার্ক্, সাইলিস) ; জিহ্বার ফোকা পড়া ; জিহ্বা লালবর্ণ, শুষ্ক, এবং কাটাযুক্ত (ব্যাপ্ট্, বেল্) এবং কাটাবর্ণ স্নেহা দ্বারা আবৃত ; জিহ্বার জ্বালা এবং চড়্ চড়ানি এবং উহার অগ্রভাগ লালবর্ণ (আস্, আর্জেন্ট-মেট্) ; মুখগহ্বর শুষ্ক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা (একন্, আস্, ব্রাই) ; নিজাববাহার মুখ দিয়া লাল বহিরা পড়া ; মুখে দুর্গন্ধ (আর্গিকা, অরাম্, হিপ্-সাল্ফ্, আরোড্, ক্রিগাজ্, মার্ক্, নাইট্-ক্-আস্, নাক্স-বম্) ; মুখে পচা স্বাদ (মার্ক্) ; মুখে তিক্ত স্বাদ (নাক্স-বম্) ; মুখে উদরস্থ অজীর্ণ আহার ভ্রষের স্বাদ (ব্রাই, কলোস্, চায়না, পাল্-স্, সাল্ফ্) বিশেষতঃ রুটীর (নেটাম্-মিউর) ; গলার মধ্যে শুষ্কানুব (এপিস্, নাক্স-বম্) ; গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি ; গলার মধ্যে হুটী বিধানের দ্বার

বেদনা, বাহার দরুণ গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয়; গলার বহির্দেশ ক্ষীত; সঙ্কোচনের দরুণ যেরূপ হয়, কোন কঠিন দ্রব্য গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেরূপ কষ্টানুভব; পক্ষাঘাত হইলে যেরূপ হয়, কোন তরল দ্রব্য গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেরূপ কষ্টানুভব (বেল, হায়োস, নাক্স-মফ, প্লাবাম); কর্ণমূলস্থিত এবং হর্রাথির নিম্নস্থিত গ্রন্থি (Parotid and Submaxillary glands) ক্ষীতি এবং কঠিনতা (ব্যারাইটা-কার্ক, ক্যাক-কার্ক, আয়োড)।

- **পাকস্থলী এবং উদর।** গলার মধ্যের শুষ্কতার দরুণ অত্যন্ত পিপাসা এবং শীতল জল পানের ইচ্ছা (একন্, অ্যাস্, ব্রাই); ঠাণ্ডা হ্রদ খাওয়ার ইচ্ছা; পেটে খালি বোধ এবং ক্ষুধা, কিন্তু কোন দ্রব্যে রুচি থাকে না বা খাইতে ইচ্ছা যায় না; আহারে সম্পূর্ণ অরুচি (আলান্ অ্যাস্, চারনা, হিপ-নাল্ফ, মার্ক, ফস, সাল্ফ); উদগার ভারূপ উঠে না; আহার বা পানের পর বমনোদ্যোগ; একখানি প্যথর চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, আহারের পর পাকস্থলীতে সেরূপ ভারি এবং পূর্ণবোধ (অ্যাস্, ব্রাই, মার্ক, নাক্স-বম, পাল্গ); আহারের পর পাকস্থলীর মধ্যে এবং উহার উপরে চাপাবোধ; আহার দ্রব্যে, বিশেষতঃ রুচীতে, তিক্ত স্বাদ (মার্ক); খাইতে খাইতে হঠাৎ বমন; পাকস্থলীতে প্রবল দগ্ধপানি (নাক্স-বম, পাল্গ)। উদরের বাম পার্শ্বের নিম্নভাগে কসিয়া ধরার স্তায় বেদনা বা যাতনা যাহা নিম্নদিক হইতে উপরের দিকে বিস্তৃত হয় এবং তদরূপ মনের অত্যন্ত উদ্যোগ এবং বমনোদ্যোগ; উদরে এবং উহার পার্শ্বে টাটানি, যে পার্শ্বে বেদনা সে পার্শ্বে শয়ন করিলে, পাশ ফিরিলে, নড়িতে স্মরণ করার সময় বাহার বৃদ্ধি হয়; উদরের অত্যন্ত ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি, আহারের পর যাহা অধিক হয় (চারনা, লাইকোপ, নাক্স-মফ, নাক্স-বম); পেটকামড়ানী এবং উদরে কঠনবৎ বা হঠাৎ ধাক্কা লাগার স্তায় বেদনা যাহা আহারের পূর্বে অধিক অনুভূত হয় এবং মূলত্যাগের পর বাহার উপশম হয় (কলোস্); উদরে শূল বেদনা বা উদর আকড়াইয়া ধরার দরুণ রোগী মাথা হেট করিয়া জড়নড় বা বাঁকা হইয়া চলিতে বাধ্য হয় (আলোজ, কষ্ট, কলোস্, আইরিস, নাক্স-বম, কুম); কুচকির গ্রন্থির ক্ষীতি (বাগী) (ক্যাক-কার্ক, ক্রিমেটিস্, আয়োড); নাক্তি প্রদেশে কসিয়া ধরার স্তায় আক্ষেপিক বেদনা।

মল এবং মলদ্বার। শুষ্কের সঙ্গে সঙ্ঘটন; মল পাঁচলা, রক্তের ছিটখুক; মল তরল কালচে, কটাবর্ণ (অ্যাস্); রক্তমিশ্রিত প্রেক্ষা ভেদ; চট্‌চটিয়া আঠা (কল্‌চ, হেলিবোরাস্), তরল, লাল এবং হরিদ্রাবর্ণ; রাত্রিতে উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে বেদনা বা পেট কামড়ানী, শিরঃপীড়া এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা; মল ভিজা গর্দের জ্বায়; দান্তের পূর্বে পেটে শূল বেদনার জ্বায় বেদনা এবং কৌণপাড়া; দান্তের সময় উদরে কর্জন-বৎ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষণ ও মলত্যাগের পর বেদনা-ধির বিরাম বা উপশম; বেদনা হীন, ক্লেণায়ুক্ত মলভেদ।

মূত্রযন্ত্র। দিবারাত্রি অনবরত বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা এবং প্রচুর পরিমাণে মূত্র ত্যাগ; অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্বক মূত্রত্যাগ, বা ঘূষের ঘোরে স্বপ্নে মূত্র ত্যাগ (আর্গিকা, কষ্ট্, পাল্‌স্); মূত্র লালবর্ণ, উষ্ণ এবং পরিমাণে অল্প (একন্‌ এপিস্) এবং অত্যন্ত জ্বালা উৎপাদক ও কাল্‌চে বাহ্য নির্গত হওয়ার অনতিকাল বিলম্বেই ঘোলাটিয়া হয় (সিনা, ডিজিট্, গ্রাফ্); মূত্রাবরোধ বা ফোঁটার ফোঁটার রক্তমিশ্রিত মূত্র নির্গমন (ক্যানাবিস্-স্যাট্-নাক্স-বম্); মূত্রে নীহারের জ্বায় সাদা তলানি পড়ে (ক্যান্‌জ্, কল্‌চ)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষজের মাথা এবং উহার আবরক চর্মের ক্ষীতি এবং উহা কাল্‌চে লালবর্ণ, বিসর্পের জ্বায় (Erysipelatous); অণ্ডকোষাধার (পোতা) কঠিন এবং পুরু হয় এবং অত্যন্ত চুলকার; পুরুষজের মাথার আবরক চর্ম প্রসারিত এবং তদ্রূপ সমুচিত হইয়া পুরুষজের মাথা অনাচ্ছাদিত থাকে (Paraphimosis); মূত্র কোষাধারের শোথ (পোতা কুলা); পুরুষজ, অণ্ডকোষাধার (পোতা) এবং উরুর মধ্যবর্তী স্থানে কল্‌তানি বিশিষ্ট কবুড়ী (হিপ্-সাল্‌ক্, গ্রাফ্); কিকা রক্তের উগ্র রক্তঃস্রাব, বাহার দ্রবণ বোনিতে কামড়ানীর জ্বায় ঘাতনো অগ্রভূত হয়; যোনিদ্বাবে বেদনা এবং টাটানি বা চড়্‌চড়ানি; যোনিব বহির্দেশে বিসর্পের জ্বায় (Erysipelatous) প্রসার; বৃষ্টিতে ভিজিয়া জরায়ুর কার্যের বৈলক্ষণ্য; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia), রক্ত চাপ চাপ, থানা থানা এবং জরায়ুতে প্রসব বেদনান জ্বায় বেদনা (বেল্, ক্যাম্, সিনিসিফ্); সন্তান প্রসবের পর স্তনে হৃৎ থাকে না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সার্বাঙ্গিক উচ্ছ্বাস

(একন্, হায়োস্, পাল্‌স্); গর্ভাবস্থায় কৌণপাড়া বা অভিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম বা নিশ্বাস বদ্ধ করিয়া বা কোন প্রকারের ভারি বস্তু উঠান হেতু গর্ভশ্রাবের উপক্রম হওয়া; সন্তান প্রসবের পর জরায়ু হইতে দূষিত ক্রেন্দ (Vitiated Lochia) নিঃসরণ বা উক্ত নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়া যাওয়া, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যোনিদ্বারে খোঁচা বিধার জ্বায় বেদনা ও মাথার বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা কাটিয়া যাইবে (ব্রাই); সন্তান প্রসবের পর অনেক কাল ধরিয়া জরায়ু হইতে ক্রেন্দ নিঃসরণ, অথবা ক্রেন্দ নিঃসরণ একবার বদ্ধ হইয়া পুনরায় আরম্ভ হয়; কোন ভারিজন্য নিশ্বাস বদ্ধ করিয়া উঠাইবার দরুণ জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হইয়া নিম্নদিকে সরিয়া পড়ে (Prolapsus uteri); সন্তান প্রসবের পর পায়ের শিরার সাদা ক্ষীতি (Milk-Leg); বিকারের লক্ষণ বিশিষ্ট জরায়ু প্রদাহ ।

শ্বাসযন্ত্র । স্বর ভঙ্গ এবং কণ্ঠনালীতে চাঁচিয়া ফেলার জ্বায় জ্বালা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে খুঁখুসে বোধ এবং টাটানি (অস্-মিয়াম্); শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন; কাপড়ের নীচ হইতে হাত বাহির করিলেও কাশির উদ্রেক হয় (হিপ্-সাল্‌ফ্); বায়ুনের মধ্যে হৃৎস্রুড়ীর দরুণ শুষ্ক খুঁখুসে কাশি (নাল্‌-বম্, ক্রমেক্স), সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রি দুই প্রহরের পূর্বে যাহার বৃদ্ধি হয়; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিবার অব্যবহিত পরই কাশি; আক্ষেপিক কাশি, যাহার দরুণ মাথা কাঁপে; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে ছিড়িয়া ফেলা বা স্থচীবিধানের জ্বায় বেদনা বা যাতনা (একন্, ব্রাই, ক্যালী-কার্ক্, পাল্‌স্); বুকে অত্যন্ত আঁটবোধ এবং তদরুণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন; বুকে এবং উহার পার্শ্বে স্থচীবিধানের জ্বায় বেদনা বা যাতনা, বিশ্রাম্, কাণীন বা হাঁচি এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে যাহার বৃদ্ধি হয়; বিকারের লক্ষণাক্রান্ত ফুফুসপ্রদাহ, পূর্ব শরীরে শোথিয়া যাহা উৎপন্ন হয়; অতিরিক্ত কথা বলা, বস্তুতা কথা বা গান করার দরুণ স্বরভঙ্গ; ভয়ানক কাশি, যাহার দরুণ মনে হয় যেন বুক কাটিয়া যাইবে; সন্ধ্যার সময় কাশি এবং কাশিতে কাশিতে উদরস্থ আহার জল্যাতি বমন (কার্কো-বেজ্, ডুসিরা, ফেরাম্) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । স্থির এবং নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিলে হৃৎস্পন্দন; হৃৎপিণ্ডে হ্রস্বল বোধ এবং উহার কাঁপনি; হৃৎপিণ্ডের বাহ্যিক

অস্থুৎ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বামবাহতে বেদনা এবং অবশ বোধ (একন্, ক্যাল্মিয়া) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবা বাত রোগের জ্বর শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (বাডায়াগা, চেলিডন্) এবং সঞ্চালনের সময় উহাতে কসিয়া বা যাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (একন্, কাক্-কন্); মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁতলিবা গেলে যেরূপ হয়, ক্ষদ্র এবং পৃষ্ঠদেশে সেক্রপ বেদনা বা যাতনা (একন্); অবশ হইলে বা অনেকরূপ অস্থিবিধাতে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলে যেরূপ হয়, গ্রীবাব পেশীতে সেক্রপ বেদনাত্তব, যাচা শেষ বেলা বা সন্ধ্যার সময়ই অধিক অন্ততৃত হয়; পৃষ্ঠদেশে স্থচাবিধানের জ্বর বেদনা বা যাতনা, চলিয়া বেড়াইলে বা মাথা হেঁট করিয়া উপুড় হইলে যাহার বৃদ্ধি হয়; মাথা হেঁট করিয়া উপুড় হওয়ার পর সোজা হইয়া দাঁড়াইলে উক্ত বেদনা বা যাতনা আরো অধিক অন্ততৃত হয়; কোমরের পশ্চাৎ ভাগে শক্ত বোধ এবং উহাতে কন্কনানি (একন্); স্থিতিভাবে বসিলে বা শয়ন করিয়া থাকিলে কোমরের পশ্চাৎভাগে মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁতলিয়া 'যাওয়ার জ্বর বেদনা (বার্কেরিস্), নড়া চড়াতে বা কোন প্রকারের কঠিন তোষকাদিতে শয়ন করিলে বাহার উপশম হয় (নেট্রাম-মিউর, রোডডেগুন্, কট্টা); গিলিবার সময় দুই স্বকের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা; যেন কোন ঠাণ্ডা পদার্থ হুড়্ হুড়্ করিয়া বা হামা দিয়া যাইতেছে, পৃষ্ঠদেশে একরূপ ঠাণ্ডা বোধ ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । মোচড়াইয়া পড়িলে, কোন ছারি জ্বা উঠাইলে বা জোরে টানিয়া বিস্তৃত করিলে যেরূপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেক্রপ যাতনা বোধ এবং উদার কীতি, কঠিনতা এবং উহাতে পক্ষাঘাতের জ্বর অবশবোধ; বিশ্রামের পর প্রথম সঞ্চালনে বা প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবশবোধ এবং উদার কঠিনতা, আক্রান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বীরস্বার সঞ্চালনে বাহার উপশম হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাঁপনি অথবা কাঁপনির জ্বর অন্ততৃত হয়; যে অঙ্গ ভর করিয়া শয়ন করা যায়, প্রধানতঃ বাহ, সে অঙ্গ অবশ বা অসাড় হয়; স্থির ভাবে থাকিলে বা বিশ্রাম কালীন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের জ্বর কসিয়া বা যাটিয়া ধরার জ্বর বেদনা বা যাতনা ।



স্বস্ত্যের সন্ধিতে বাতের বেদনার জায় ছিড়িয়া ফেলা বা স্ফীতি বিধানের জায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাহুতে অবশ বা অসাড়বোধ; বাহুর পক্ষাঘাত, উহাতে ঠাণ্ডা বোধ এবং উহাতে স্পর্শজ্ঞান থাকে না; স্বস্ত্যের সন্ধি, বাহু, কনুই, মণিবন্ধ, হাত এবং আঙ্গুলের সন্ধিতে বাতের জায় স্ফীতি বিধান বা ছিড়িয়া ফেলার জায় বেদনা বা বাতনা (একন্, ব্রাই, লেডাম), ঠাণ্ডা এবং আর্দ্র বাতাসে, বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে বা বিশ্রাম কালীন যাহার বৃদ্ধি হয় (বেডোডেগ্রন্); বোগলের গ্রন্থি স্বাভাবিক (ব্যারাইটা-কার্ক, লাইকোপ্, সাইনিসি); হাত এবং হাতের আঙ্গুলের স্বাভাবিক। পা এবং পায়ের পাতার পক্ষাঘাতের জায় স্ফীতি বোধ এবং উহার দুর্বলতা বা যাহার দক্ষণ চলিবাব শক্তি প্রায় রহিত হয়; বসিয়া থাকিলে পায়ের ক্লান্তি বোধ, চলিয়া বেড়াইলে বাহা থাকে না (আস্); পায়ের কনুইয়া বেদনা বা বাতনা, যাহার দক্ষণ রোগী থাকিলে তাহা বারম্বার পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়; বসিয়া থাকিলে, বুনা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে এবং অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে পর কুচ্চিক এবং হাঁটুর সন্ধিতে বাতের ধরার জায় বেদনা বা বাতনা; পা এবং পায়ের পাতায় খিল ধরা, বাহুর দক্ষণ রোগী চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়; অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে পায়ের পাতার সন্ধি স্ফীত হয়; সন্ধার সময় পায়ের পাতা স্ফীত হয়; ভিজিয়া কোমরে বাতের বেদনা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশী স্পন্দন; পুরাতন বাতরোগ এবং আক্রান্ত স্থান কোমল না হইয়া বরং কঠিন বা শক্ত হয়; বাম বাহু এবং বাম পায়ে হামা দিয়া বাওয়ার জায় অবশবোধ বা স্ফু স্ফু (স্ফি স্ফি ধরা)।

চর্ম্ম। সমুদয় শরীরে চুলকানি (গ্রাফ, সাল্ফ); চুলকানি চুল বা লোমসংযুক্ত অংশেই অধিক অহুত হয়; সমুদয় শরীরে হামের জায় লাল কুচ্চিক (আর্টি-কুচ্চ, ব্যাপ্ট, কফিয়া, পাল্ফ); গায় ফোঁকা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভণের জায় জলপূর্ণ কুচ্চিক এবং উহাতে জ্বালা ও চুলকানি (গ্রাফ, মার্ক, সাল্ফ); বিকচ (Eczema) বাহুর উপরের অংশের ছাল উদ্ভিগা যায় এবং ক্ষত হয়, উহাতে পুরু থোসা বা চুনটী পড়ে ও উহা হইতে হর্গন্ধযুক্ত কলতানি নির্গত হয় (গ্রাফ, হিপ-সাল্ফ, লাইকোপ্, সাল্ফ); বিসর্পের জায় প্রদাহ এবং স্ফীতি (অপিস, বেল্) এবং উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁকার

নাগ কুস্কুড়ী বাতির হয় ; আমবাতি এবং তদ্রূপ চুলকানি এবং জালা ; প্রত্যেক বৎসর শীত কালে গায় কুস্কুড়ী হয় ; কুস্কুড়ী চুলকাইলে জালা করে ; প্রত্যেক বৎসরই মাগার দানের স্থায় এক প্রকার কুস্কুড়ী প্রকাশ পায় ; মাগায় এক প্রকারের ক্ষক ফুস্কুড়ী, যাহার দক্ষণ মাগার ছাল উঠিয়া যায়, কুস্কুড়ীগুলি রাত্রিতে চুলকায় এবং উগাতে পুঁষ হয় ও চুমটি পড়ে ; ওঠের চতুষ্পার্শ্বে গোলাপী রঙের কুস্কুড়ী এবং উহা হঠাৎ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুমিশ্রিত ছেকড়া ছেকড়া পুঁষ পড়ে ; গায় আঁচিল হয় ; শরীরের স্থানে স্থানে লাল হয় এবং আবেয় (Tumour) স্থায় ক্ষীত হয় ; গায় ভাসান বিস্তৃত রকমের শোড়া ঘা ; আরক্ত জরের পর কর্ণ-মূলস্থ গ্রন্থির প্রদাহ ; গ্রন্থিব প্রদাহ, ক্ষীতি, কঠিনতা এবং পাকিয়া উহাতে পুঁষ হওয়া ।

নিদ্রা । রাত্রি দুই প্রহরের পূর্বে নিদ্রাশূন্যতা এবং তদ্রূপ বিহীন বারম্বার এশাশ ওপাশ কবিতা ছট্‌ফট্‌ করা (একন্‌ব্রাই, গ্রাক্‌ ফস্‌) ; বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া এবং ভয় উৎপাদক স্বপ্ন দেখা (আর্নিকা, অরাম্‌, পাল্‌স্‌) ; নিদ্রা শূন্যতা এবং প্রবল বেগে বারম্বার হাইতোলা ।

জ্বর । বাৎসরিক শীতবোধ, প্রধানতঃ সন্ধ্যার সময় (ফস্‌) ; শরীরের পশ্চাত্তাঙ্গে শীত বোধ এবং সমুখ ভাগে উষ্ণতাবোধ ; হাত এবং পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ; সন্ধ্যার সময় জ্বরের আক্রমণ এবং সমুদয় শরীরে শীত এবং কম্প, গা ভাঙ্গা, মাথা ধরা, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা ; সন্ধ্যায় বা স্বল্প বিরাম জ্বর (একাত্তিক, দ্বিত্বিক এবং ত্র্যত্বিক আক্রমণের জ্বর) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নৃশংস আক্রমণ হওয়ার লক্ষণ ; প্রাতঃকালে প্রচুর ঘণ্টা (ক্যাক্‌ কার্ক্‌, নাইট্‌ক্‌-আস্‌, পাল্‌স্‌) ; উষ্ণ জলদি পান করিলে ঘণ্ট ; নাড়া হুহ এবং অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট, (ডিজিট্‌, মার্ক্‌, নিউক্‌-আস্‌) ; শীত কম্প এবং অস্তিত্ত প্রকারের যাতনা বা লক্ষণাদি সন্ধ্যায় অধিক হইয়া থাকে (আর্স্‌, বেল্‌, পাল্‌স্‌) ; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার (Typhoid Fever) ; জিহ্বা শুষ্ক এবং কটাবর্ণ ; দাঁত কাল্‌চে ময়লা (Sordes) দ্বারা আবৃত ; তরল ভেষ্য ; অত্যন্ত তরলতা ; নিম্নাঙ্গের শক্তির অনেক হ্রাস, যাহার দক্ষণ উক্ত অঙ্গ সঞ্চালন করা কঠিন হইয়া পড়ে ; রাত্রি দুই প্রহরের পর অত্যন্ত অস্থি-

স্বস্তা, বাহার দক্ষণ উপশমের আশায় রোগী বিছানায় বারবার এগাশ ওপাশ করিয়া ছটফট করে; অপরাহ্ন ৭টার সময় সবিরাম জ্বরের আক্রমণ; গায় শীতল জল ঢালিয়া দিলে যেরূপ হয়, সেদ্রুপ শীতবোধ এবং তৎপর শরীর গরম হইয়া বারবার গা ভাঙ্গার উচ্ছ্বাস; শেষ রাত্রিতে বা প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম ।

ব্যবহার । শবীর উত্তপ্ত হওয়ার পর জল বুটিতে ভিজিয়া অম্লথ; থেঁতলিয়া যাওয়া, মোচড়াইয়া পড়া বা অন্যান্য প্রকারের আঘাত জনিত অম্লথ; বাতরোগ এবং বাতরোগ জনিত অম্লথ; কটি এবং কুচকিবাতি; গ্রন্থির ক্ষীণতা, কঠিনতা এবং উহাতে পুঁথ হওয়া; বিসর্প বা ইরিসিপেলাস (Erysipelas); পুঁথ এবং জল পূর্ণ ক্ষুদ্র ব্রণ এবং ফোকার স্তায় ক্ষুদ্রতী; শোথ; পক্ষাঘাত; সবিরাম-জ্বর; শ্রবণবিরাম-জ্বর, আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার, বাত জ্বর; স্ফোটক-জ্বর; হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক অম্লথ; সামান্য রক্তের শৈথিল্য রোগ; চক্ষু প্রদাহ; বিকচ (Eczema); আভ্যন্তরিক যন্ত্রের প্রদাহ জনিত স্রাবিক অম্লথ ইত্যাদিতে রাস্টক্স ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । চাঁচলে যেরূপ হয়, হাড়ে সেদ্রুপ বেদনা বা যাতনা (ফর্ম-আস্); রাত্রিতে, প্রধানতঃ রাত্রি দুই প্রহরের পর, যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি (আস্, বেল্, ক্যাক্স-কার্ক্, সাল্ফ্); স্থিরভাবে থাকিলে বা বিশ্রামে বা চলিতে আবস্থ্য করার সময় বেদনাদির বৃদ্ধি (কোনায়াস্, লাইকোপ্, সিপিয়া, সাল্ফ্); বড় বৃষ্টির পূর্বে, বসন্ত বা শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে, জল বুটিতে ভিজিলে, আর্দ্র বাতাসে, উত্তর পূর্ব দিকের বাতাসে, বহির্বায়ুর পরিবর্তনে, ঠাণ্ডাতে অম্লথের বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত চলিলে, আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালন করিলে, উষ্ণ, শুষ্ক বাতাস বা উষ্ণ প্রয়োগে, আক্রান্ত অঙ্গ বিস্তৃত করিলে, অম্লথের উপশম ইত্যাদি রাস্টক্সের কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । ডাক্তার ডান্‌হাম্ (Dr. Dunham) বলেন যে, স্থিরভাবে বা বিশ্রামে থাকিলে বেদনাদির বৃদ্ধি এবং নড়াচড়াতে অম্লথের উপশম রাস্টক্সের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ । তিনি আরো বলেন যে, পেঙ্গী এবং সন্ধিগত স্থিরভাবে থাকিলে বেদনা বা যাতনার বৃদ্ধি হওয়া এবং আক্রান্ত অঙ্গ প্রথম সঞ্চালন করার সময় উহাতে অত্যন্ত বেদনা বা যাতনার উদ্রেক হওয়া, এবং আক্রান্ত অঙ্গ ক্রমাগত সঞ্চালনে বেদনাদির হ্রাস

হওয়া রাস্ট্রের প্রধান প্রাকৃতিক লক্ষণ । কিন্তু উক্ত উপশম অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় না ; কারণ, আক্রান্ত অঙ্গ অনেকক্ষণ ক্রমাগত সঞ্চালন করার দক্ষণ পক্ষাঘাতের লক্ষণাদি প্রকাশ পায় এবং ক্রান্ত হইয়া রোগী বিশ্রাম করিতে বাধ্য হয় । বিশ্রাম কাগীন প্রথমতঃ রোগী আরাম অহুভব করে ; কিন্তু কতকক্ষণ পরই আবার বেদনাদি আরম্ভ হয় এবং তদক্ষণ রোগী তাহার আক্রান্ত অঙ্গ পুনরায় সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয় ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । রাস্ট্রের কার্যের সঙ্গে ক্রোটন, রানান্-কিউলাস্, লেডাম্, রডোডেণ্ড্রন, ব্রাইওনিয়ার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে রাস্ট্রের কার্যের সঙ্গে এপিঙ্গ, আর্গিকা, আসিনিঙ্ক, কষ্টিকাম্, ক্রিমেটিস্, ডাণ্কেমেরা, নাক্স-বমিক', ফক্ষ-রাস্, ফক্ষরিক্-অসিড, পাল্‌সেটলা, কটী, মিসিয়া, সাইলিসিয়া, সাল্‌ফার ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যান্‌ফার, কাফিয়া ক্রোটন, সাল্‌ফার ইত্যাদি রাস্ট্রের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাওয়া যায় । তরুণ চর্ম্মবোগে এবং উদরানয়, আমাশয়ে ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন এবং পুরাতন আকারের চর্ম্ম রোগে ১ এবং ৩য় দশমিক ডাইলুশন ব্যবহার্য্য । পুরাতন আকারের বাত বোগে ১২ এবং ৩০ ডাঃ বিশেষ উপকারী । পক্ষাঘাত এবং গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহে ১ম দশমিক ক্রম বিশেষ উপকারী । হোনিওপ্যাথির আবির্ভাব মহাত্মা সানুয়েল হানিমান বলিয়া গিয়াছেন যে, রাস্ টক্স অত্যন্ত আন্তে আন্তে কার্য্য করে এবং ঔষধ প্রয়োগের পর অন্ততঃ ৩৬ ঘণ্টার পূর্বে ইহার উপকারীতা কিছুই টের পাওয়া যায় না । একটী ইংরেজের অর বিকারের পর পায়ে পক্ষাঘাতের চিকিৎসার ফল হানিমানের উক্ত কথার পোষকতা করে । উক্ত রোগীকে যে দিন প্রাতে রাস্ টক্স ১ম দশমিক ডাইলুশন ব্যবস্থা করা হয়, তাহার পর দিবস ত্রিদি দুই প্রহরের সময় ইহাতে রোগী অনেকটা উপশম অহুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । এতদ্বিন্ন বাত রোগের চিকিৎসার ফলও হানিমানের উক্ত কথার পোষকতা করে । পাঠকগণ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া

দেখিলেও বোধ হয় হানিমানের উক্ত কথার সত্যাসত্য জানিতে পারিবেন ।

## সিপিয়া সাকাস,—সিপিয়া ।

(SEPIA SUCCUS,—SEPIA.)

কাটেল্ নামক মৎস্যের (Cuttle Fish) আতুরীতে যে এক প্রকার কাল্চে কটাবর্ণের তরল পদার্থ থাকে তাহা উক্ত আতুরীতে রাখিয়াই শুকাইয়া সুগার অব্ নিক্কের সঙ্গে মিশাইয়া যথা নিয়মে ইহার ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে হয় । ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আবেক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । যকৃত, পিত্ত নিঃসারক যন্ত্র এবং স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের উপর কার্য্য থাকার দৃক্ণ ইহা উক্ত যন্ত্রাদির উৎপাদক শক্তির হ্রাস করে । ইহার কার্য্য আঁত শিথিল, এবং ইহা দ্বারা উৎপন্ন বেদনা, যন্ত্রণাদি এবং কোন কোন লক্ষণ অনেক সময় অত্যন্ত অস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায় । ইহা উক্ত যন্ত্রাদির অবসন্নতা এবং জড়তা উৎপাদন করিয়া থাকে । ইহা দ্বারা যকৃতের কার্য্যের বিশেষ বৈলক্ষণ্য হয় না, কিন্তু ইহা যকৃতের নিঃসরণে অনেক পরিবর্তন উৎপাদন করা হেতু, নিঃসরণ টক এবং তুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে । এতদ্ভিন্ন যকৃতের আকারেও অনেক পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায় । জননেন্দ্রিয় এবং মূত্রযন্ত্রের শৈল্পিক কিল্লী এবং চর্ম্মের উপরই ইহার প্রধান স্থানিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় । মুখাকৃতি হরিদ্রার আভাবুক্ত, মেটে, মোমের ত্রায় রঙ্গবিশিষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শবীরের কোমলাংশকে শোথের ত্রায় ক্ষীণ ও টল্ টল্ করা এবং মানসিক অবসন্নতা এবং সমুদ্র বিষয়ে অমনোযোগের ভাব উৎপাদন করা এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত ।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অত্যন্ত স্নায়বিকতা ; সামান্য গোলমালও সহ্য হয় না (ককি-উলাস, সাইলিসি) ; অত্যন্ত বিমর্ষভাব এবং অবসন্নতা এবং উহার সঙ্গে

ক্রন্দন (লাইকোপ্, নেট্রাম্-মিউর, প্লাটিনা, পাল্‌স্); সমুদয় বিষয়েই মনের অপ্রকৃষ্টতা ও সর্বদা ভবিষ্যতেব দুর্বটনা বিষয়ে চিন্তা; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা; সন্ধ্যার সময় মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং চিন্তা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত গরম বোধ (একন্); অত্যন্ত খিট্‌খিট্‌ করা, চিড়্‌ চিড়্‌ করা এবং সহজেই বিরক্ত হওয়া (ব্রাই, ক্যাম্); কোন বিষয়েই চিন্তা থাকে না; সমুদয় বিষয়েই বৈবরণা (বাবে'রিস্, কস্-আন্), এমন কি রোগী আপন পরিবারস্থ লোকের বিষয়েও কোন চিন্তা করে না; সর্বদা অলসভাব এবং শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা (নাক্স্-বম্, কস্, সাল্‌ফ্); মনে সহজে ভাবাদিব উদয় হয় না এবং কথা বলিতে বা লিখিতে গেলে ভাষা সহজে স্মরণ হয় না (নাক্স্-মক্, কস্); স্মরণ শক্তির তরলতা বা হ্রাস (আনাকার্ড্, ক্রিয়াজ্, মার্ক্, ল্যাক্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স্-মক্) এবং কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার অশক্তি।

মস্তক । মাথাব, প্রধানতঃ কপালে, কণ্ঠদায়ক্' গোলমলে বোধ; বহির্বাযুতে চলিয়া বেড়াইলে মাথা ঘোরা (আগারিকাশ্, ক্যাক্-কার্ক্); মাথায় চাপিয়া ধরার স্থায় প্রবল বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা কাটিয়া বাইবে (নেট্রাম্-মিউর, পাল্‌স্, সাক্স্-নেরিয়া), মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, নড়িলে চড়িলে, কাশিলে, বা মাথা ঝাঁকিলে যাহাব বৃদ্ধি হয় (বেল্, ব্রাই); মাথা ধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন, যাহা প্রাতঃকালে আরম্ভ হয় (নাক্স্-বম্, নেট্রাম্-মিউর) এবং যাহা বেলা তই প্রহর বা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে ও বহির্বাযুতে যাহার উপশম হয় (পাল্‌স্, সাক্স্-নেরিয়া); বাম চক্ষুর কোটির এবং মাথাব বাম পার্শ্বে ভারি বোধ এবং চাপিয়া ধরার ক্ষায় বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাম চক্ষু হইতে মাথায় বাম পার্শ্বে দিয়া মাথার পশ্চাৎভাগে ছুরী বিধানের স্থায় বেদনা, আহারের পর যাহার উপশম হয়; মাথায় সমুখ ভাগে চাপিয়া ধরার স্থায় গুশ্‌ গুশ্‌, স্ফীতি বিধান বা জিড়িয়া ফেলার স্থায় প্রথম বেদনা; কপালের বাম পার্শ্বে হইতে মাথায় বাম পার্শ্বে উপরিভাগ পর্য্যন্ত জিড়িয়া ফেলার স্থায় বেদনা; এক পেশে মাথা বেদনা (আধ্ কপালিয়া মাথা বেদনা) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং বমনোদ্বেগ; মাথায় ঠিক উপরি ভাগে ঠাণ্ডা বোধ

(বিরেট্-আব্) ; মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া (আব্, গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্, লাক্, লাইকোপ্, মার্ক্, নেট্রাম্-মিউর, নাইট্রিক্-আস্, পিট্রোল্, ফস্) ; মাথার ঠিক উপরিভাগে এবং পশ্চাৎভাগে কল্-তানি বিশিষ্ট ফুসুড়ী (গ্রাফ্, হিপ্-সাল্ফ্, লাইকোপ্, রাস্-টক্স্, সাল্ফ্) ; মাথার হাড় এবং চুলের গোড়া স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায় (চায়না, ফেবাম্, হিপ্-সাল্ফ্, ষ্টাফিস্, সাল্ফ্, বিরেট্-আব্) ; মাথা অত্যন্ত চুলকাই (কষ্ট্, গ্রাফ্, সাল্ফ্) ।

চক্ষু । চক্ষুপ্রদাহ এবং তদ্রূপ চক্ষু ক্ষীত, লালবর্ণ, জ্বালাযুক্ত এবং উহাতে চাপিয়া ধরিলে হ্রাস বেদনা ; প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় চক্ষু দিয়া জল পড়া ; পক্ষাঘাত হইলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেকরূপ চাপা বোধ এবং চক্ষু বুদ্ধি থাকার ইচ্ছা ; (কষ্ট্, কোন্যাম্, জেল্, প্লাসাম্) ; ঠাণ্ডা বাতাসে চলিয়া বেড়াইলে চক্ষের মধ্যে টাটানি, খশ্-খশে এবং জ্বালাভূত, গ্যাসেস্ আলোক বা পুস্তকাদি পড়িলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; বাগির কথা শ্রবণ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেকরূপ চাপা বোধ, চক্ষু রগড়াইলে যাহার বৃদ্ধি হয় (আস্, কষ্ট্, হিপ্-সাল্ফ্, পাল্, রাস্-টক্স্, সাল্ফ্) ; লিখিলে বা পড়িলে চক্ষু সহজেই ক্লান্ত হয় ; ঘোষ বাতির আলোকেই উক্ত অসুখ অধিক অসুস্থ হইয়া থাকে (ফস্, ক্রটা, মিরিকা) ; রাত্রিতে চক্ষুর পাতার পাতায় লাগিয়া থাকে (ক্যাক্স-কার্ব্, গ্রাফ্, লাইকোপ্, মার্ক্, রাস্-টক্স্, সাল্ফ্) ; চক্ষুর পাতার ধার শুষ্ক এবং উষ্ণ এবং উহাতে অত্যন্ত চুলকানি (ষ্টাফিস্, সাল্ফ্) ; এক খানি সন্ধ্যা বা পাতলা কাপড় চক্ষের সম্মুখে রাখিলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেকরূপ ব্যাপা দেখা (কষ্ট্, ক্রোকাশ্, নেট্রাম্-মিউর, পিট্রোল্, ফস্, সাল্ফ্) ; চক্ষুর সম্মুখে যেন আগুনের কণার ছায় চিহ্ন (বেল্, সাইক্রেমেন্, নেট্রাম্-মিউর, ফস্, সাল্ফ্) এবং এঁকা বাঁকা রেখা ভাসে ; চক্ষুর সম্মুখে দাগ যেন অনেক কাল ভাসে (আগারিকাশ্, মার্ক্, ফস্) ।

কর্ণ । কানে সকল প্রকারের শব্দই লাগে বা সহ্য হয় না (একন্, বেল্, লাইকোপ্, সাইলিসি) কানের মধ্যে সৌ সৌ, ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ হয় (বেল্, লাইকোপ্, নাইট্রিক্-আস্) ; কানের পাতার মধ্যে এবং উহার

পশ্চাৎভাগে দাঁদের ত্রায় চুলকানি বিশিষ্ট ফুস্কড়ী ; কান দিয়া পাতলা পৃথ পড়া ।

নাসিকা । নাসিকা প্রদাহযুক্ত এবং ক্ষীত ; নাসারন্ধ্রে ক্ষত এবং উহাতে টাটানি (আলাম্, আন্টি-ক্লুড্, গ্রাফ্, মার্ক্) ; প্রবল শুষ্ক সদি যাহা বাম নাসারন্ধ্রেই অধিক অনুভূত হয় : তরল সদি এবং নাক দিয়া প্রচুব পরিমাণে জলবৎ তরল স্লেঙ্খার ত্রায় পদার্থ নির্গমন ও বার-বার হাঁচি (একন্, সিপা) ; নাক দিয়া অধিক পরিমাণে রক্ত পড়া, রক্তস্রাবের সময় যাহা অধিক হয় (ফন্স) ; নাক দিয়া সবুজ বর্ণের চাপ চাপ ডেলা ডেলা গাঢ় স্লেঙ্খা নির্গমন ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা, হরিদ্রাবর্ণ (হিপ-সাল্ফ্, নেট্রো-মিউর), লালবর্ণ এবং উজ্জল ; গালের উপবিভাগ হইতে নাকের উপর দিয়া আড়া আড়ি ঘোড়ার জিনেব ত্রায় হরিদ্রা বর্ণের দাগ পড়ে ; মুখমণ্ডলে হরিদ্রা বর্ণের দাগ পড়ে (ফেরাম্) ; মুখে চতুর্দিক তীব্রদার আভাযুক্ত ; ওষ্ঠে দাঁদের ত্রায় ফুস্কড়ী ; টুটিতে বর্ণের ত্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুলকানি যুক্ত ফুস্কড়ী ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । অকালে দাঁত ক্ষয় ; দাঁতের গোড়ায় কানিয়া ধরা, ছিড়িয়া ফেলা বা সূচা বিধানের ত্রায় বেদনা বা ব্যতনা বাহ্য কণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; অহার বা পানের পথ অথবা উষ্ণ বা ঠাণ্ডা কোন পদার্থ মুখে দিলেই এই বেদনা অধিক অনুভূত হয় ; মাড়ি বেদনাযুক্ত, ক্ষীত, কালচে লালবর্ণ, ক্ষতযুক্ত হয় এবং উহা ওষ্ঠের সহজে রক্ত পড়ে (মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, ফন্স) ; জিহ্বার উপর ক্ষুদ্র বর্ণ বা ফোকার ত্রায় ফুস্কড়ী (বোরাক্স, নাক্স-বন্, নাইট্রিক্-অ্যাস্) ; জিহ্বা মদ্যে লেপযুক্ত (আন্টি-ক্লুড্, ব্রাই, নাক্স-বন্, পাল্ন্) ; পড়িয়া বা ছাল উঠিয়া গেলে যেক্রপ হয়, জিহ্বার অগ্রভাগে সেক্রপ অনুভূত হয় (মার্ক্, আইরিস্, প্লাটিনা) ; মুখে তর্গন্ধ (আণিকা, হিপ-সাল্ফ্, অ্যারোড্, মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, নাক্স-বন্) ; ওষ্ঠ, মুখগহ্বর এবং জিহ্বা শুষ্ক (এপিন্, নাক্স-বন্) ; মুখে তিক্ত স্বাদ (ব্রাই, চায়না, নাক্স-বন্, পাল্ন্, সাল্ফ্) ; মুখে টক স্বাদ (ক্যাক্স-কার্ক্, চায়না, ম্যাগ্-কার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, নাক্স-বন্) ; মুখে চট্‌চটিয়া আঠা



স্বাদ বাহা প্রাতঃকালেই অধিক অহুভূত হয় ; গর্ভাবস্থায় দম্ভশূল । গলার মধ্যে হল ফুটানের স্থায় অহুভূত হয় ; গলার মধ্যে শুক বোধ এবং টাটানি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে কনিযা ধরা বা টাটানি ফেলাব স্থায় বেদনা বা বাতনা ; গলার মধ্যে প্রচুর স্লেখার সঞ্চার ; কসিয়া গলাবন্ধ বাঁধিয়া রাখিলে যেক্রপ হয়, গলার মধ্যে টন্সিল্ প্রদেশে সেক্রপ চাপা বোধ ; মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে খশ্খশে এবং জ্বালা বোধ, গলায় থেকুর দিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । হয় খাওয়ার অত্যন্ত প্রবল অনিবার্য ইচ্ছা, নতুবা খাওয়ার ইচ্ছা একবারেই না থাকে ; সমুদয় দ্রব্যই অরুচি ; সকল দ্রব্যই লোস্তা লাগে ; বারম্বার তিক্ত বা টক উদ্যার উঠা (নাক্স-বম্, ফস্, পাল্‌স্), অথবা পচা ডিম্‌ব গন্ধ এবং স্বাদ বিশিষ্ট উদ্যার (আগারিকাশ্, আগিকা, বোরাক্স্) বাহা আহার বা পানের পরই অধিক অহুভূত হয় ; গর্ভাবস্থায় বমন বা বমনোদ্বোগ (কোনায়াম্, ক্রিমাজ্, নাক্স-বম্, বিরেট্-আব্) ; প্রাতঃকালে বমনোদ্বোগ, কিছু খাইলেই বাহা নিবারিত হয় ; আহারের পর বমনোদ্বোগ ; আহার দ্রব্যের গন্ধে বমনোদ্বোগ ; দুর্বলতা, মাথাধোবা এবং চক্ষু সমুখে শরকার দেখার সহিত বমনোদ্বোগ ; পিত্ত এবং উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন ; স্পর্শনে পাকস্থলীতে বেদনা (হায়োস্, নেট্রাম্-কার্ক্, সাইলিসি) ; পাকস্থলী এবং উদরে কষ্টদায়ক খালি খালি বোধ (সিমিদিফ্, হাইড্রাষ্ট্, ইগ্‌নেস্, পিট্রোল্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্) ; এক খানি পাথর বসাইয়া রাখিলে যেক্রপ হয়, আহারের পর পাকস্থলীতে সেক্রপ চাপা বোধ (ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্) ; পাকস্থলীর মধ্যে দপ্‌দপানি (আণ্টি-টার্ট্, আসাফটিডা, পাল্‌স্) । যকৃত প্রদেশে স্থচী বিধানের স্থায় বেদনা (আস্, ব্রাই, চায়না, ক্যালী-কার্ক্), পূর্ণ এবং চাপা বোধ ও টাটানি (এপিস্, বেল্, ব্রাই) ; উদরের বাম পার্শ্বে স্থচী বিধানের স্থায় অহুভূত হয় ; উদরে চাপা এবং ভারি বোধ ; উদর ক্ষীত, ভারি, বিস্তৃত এবং বেদনায়ুক্ত হয় (ব্রাই, চায়না, গ্রাফ্) ; উদর ক্ষীত হইয়া ঢপ্‌ঢপ্‌ করে ; সন্তান শ্রমের পরও উদর ক্ষীত থাকে ; উদরের মধ্যে প্রবল গড়্‌গড়্‌, কল্‌কল্‌ শব্দ হয় (আগারিকাশ্, আলোজ্, লাইকোপ্‌) আহা-রের পরই বাহা অধিক হয় ; উদরের উপর কটা বর্ণের দাগ পড়ে ।

মল এবং মলদ্বার । গুহ এবং গুহদ্বারে জ্বালা এবং চুলকানি (সাল্‌ক্); গুহদ্বারে কন্‌কনানি, টাটানি এবং স্থচী বিধানের ভ্রায় অল্পভূত হয়; অস্ত্রের জড়তা (আলাম্, ক্যাম্‌ফার, ওপিয়াম্); বাহ্যের বেগ হয়, কিন্তু বেগ দিলে কেবল শ্লেষ্মা বা দূষিত বায়ু নির্গত হয়; কোষ্ঠ-পরিষ্কার হয় না, অথবা নির্গত হইতে হইতে মল গুহের মধ্যে থাকিয়া যায়; মল ভেড়ার মলের ভ্রায় (আলাম্, ক্যালী-কার্ক, ওপিয়াম্, প্রাথম); মল সাদাটিয়া বা কটাব আভাযুক্ত; মলের সঙ্গে স্তব্ধ এবং ক্ষুদ্র ক্রমি নির্গমন (ফেরাম্, মার্ক, স্পাইজেল্); মল কঠিন এবং অতি কষ্টে নির্গত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহ দ্বারে চাপা বোধ, যাহা মলত্যাগের পরও দূরীভূত হয় না; (ক্যাক্টাস্) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রাধারে চাপ পড়ার দরুণ বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা; দিবা রাত্রিতে বারম্বার মূত্রত্যাগ (আম্বা, বোরাক্স, কোনায়াম্, ফন্‌-আস্); অত্যন্ত ক্ষীত এবং বিস্তৃত হইলে যেরূপ হয়, মূত্রাধারে সেরূপ অল্পভূত হয়; মূত্রত্যাগের সময় মূত্রনালীতে জ্বালাগ্ভব (একন্, আস্, ক্যাঙ্ক, কোনায়াম্, নেট্রাম্-কার্ক); মূত্র ঘোলাটিয়া, কাদাব রঙ্গ বিশিষ্ট এবং উহাতে লালচে তলানি পড়ে; মূত্র গাঢ়, চট্‌চটিয়া আঠা এবং অত্যন্ত ঘর্গকযুক্ত (ক্যাক্-কার্ক, ক্রিয়াজ্) এবং উহাতে হরিত্রাবর্ণের কাইয়ের ভ্রায় তলানী পড়ে; মূত্র ঘোলাটিয়া এবং ঘর্গকযুক্ত ও উহাতে সাদা তলানি পড়ে (ক্যাক্-কার্ক, কল্‌চ, গ্রাফ্); প্রথম রাত্রে স্বপ্নে অনিচ্ছাপূর্বক মূত্রত্যাগ বা বিছানায় প্রস্রাব করা ।

জননেন্দ্রিয় । স্ত্রীলোকের জরায়ুতে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে এত চাপা বোধ হয় যে উহার দরুণ মনে হয় যেন বস্ত্রিকোটরস্থ সমুদ্র বহু নিম্নদিকে যোনি দ্বার দিয়া ঠোঁলয়া বাহির হইয়া পড়িবে (বেল, লিগিয়াম্-টাটগ্ৰি, নেট্রাম্-মিউর, প্রাটিনা) এবং তদরুণ রোগী এক পায়ের উপর অপর পা আড়াআড়ি চাপিয়া রাখে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট; ভিষকোষে যুগ্মপ্বে বেদনা; যোনি এবং যোনি দ্বারে অত্যন্ত শুষ্কগ্ভব এবং স্পর্শনে উহা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়; জরায়ু স্বস্থান ভ্রষ্ট হয় (Prolapsus uteri) (আর্জেন্ট-নাইট্রিক্, কোনায়াম্); জরায়ু এবং যোনিদ্বার স্বস্থানভ্রষ্ট হয় এবং

উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরের পশ্চাৎভাগে আলায়ুক্ত বেদনা বা বাতনা (মার্ক) ; অরায়ুর গ্রীবার আলায়ুক্ত এবং খোঁচা বিঁধার জ্বার বেদনা বা বাতনা ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে স্বল্প রজঃস্রাব ; নিয়মিত সময়ের অনেক পর স্বল্প রজঃস্রাব, নিয়মিত সময়ে স্বল্পরজঃস্রাব, —রক্ত কালচে (নাক্স-বন্) ; যোনির লেবিয়া ( Labia ) নামক অংশ, যোনিদ্বার ও মলদ্বারের মধ্যবর্তী স্থান ( Pereneum ) এবং উরুর মধ্যবর্তী স্থান লালবর্ণ এবং উহাতে টাটানি (ক্রিয়াজ্) ; শেষ রজঃস্রোধ হওয়ার সময় অসুখ ; শ্বেতপ্রদর এবং তদ্রূপ যোনিদ্বার দিয়া হরিদ্রা, বা ছুধের জ্বার ক্লেদ নিঃসরণ ( ক্যাক্-কার্ক্, কোনারাম্, লাইকোপ্, \*সাল্ফ্-আস) ; ক্ষতকারক শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ (আলাম্, আস্, ক্রিয়াজ্) ; পূর্বের জ্বার শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ; যোনিদ্বার দিয়া প্রচুরপরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ ক্লেদ নিঃসরণ ; রজঃস্রাবের পূর্বে শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ; শ্বেতপ্রদর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যোনি দ্বারে চুলকানি ; কেবল দিনের বেলায় ছুধের জ্বার শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ; গর্ভসঞ্চারের পাঁচ মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেলে গর্ভস্রাব ; স্তনের বোঁটার চুলকানি, বাহার দরূপ স্তনের বোঁটা দিয়া রক্ত পড়ে এবং উহাতে ক্ষত হওয়ার উপক্রম হওয়া (গ্রাক্) ।

শ্বাস যন্ত্র । স্বরভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক কাশি এবং গলার মধ্যে হুড়্-হুড়ী ; প্রাতঃকালে কাশি এবং গলাদিয়া প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত লোন্তা স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন (আস্থ্রা, মাগ্-কার্ক্, ফস্) ; থক্ থক্ করিয়া শুষ্ক কাশি, সন্ধ্যার সময়, শয়ন করিয়া থাকিলে এবং রাত্রিতে যাহার অধিক উদ্রেক হয় (কোনারাম্, হায়োস্, পাল্‌স্, সাইলিসি) ; বায়ুনলের উপরিভাগে হুড়্-হুড়ীর দরূপ কাশি (হিপ্-সাল্ফ্, ফস্, ক্রমেজ্, সাস্থনেরিয়া, সাইলিসি) ; বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড়্-ঘড়ী (ইপিকাক্, আন্টি-টার্ট্, ফস্) ; ক্ষণস্থায়ী শুষ্ককাশি, পাকস্থলী হইতে যাহার উদ্রেক হয় বলিয়া অনুভূত হয় (ব্রাই) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে বেদনা, বমনোদ্বেষ্ট এবং তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন ; গলাদিয়া প্রচুর পরিমাণে পুঁথ সংযুক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত এবং লোন্তা স্বাদবিশিষ্ট শ্লেষ্মা নিঃসরণ (আস্থ্রা, কার্কো-বেজ্, লাইকোপ্, ফস্) ; সবলাবহায় গলাদিয়া রক্ত পড়া, চলিয়া বেড়ানোর সময় বা

সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই বৃক্ক কষ্টগ্রস্ত এবং স্বাসকষ্ট (একন্, আর্স); প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় স্বাসকষ্ট; কাশির সময় বৃক্ক স্থচী বিধানের জ্বাৰ বেদনা বা বাতনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্ক), বাম পার্শ্বেই বাহা অধিক অনুভূত হয় (ফস); বৃক্কের উপর কটাবর্ণের চিহ্ন বা দাগ পড়ে।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎস্পন্দন; সন্ধ্যার সময়, বিছানার শয়ন করিয়া থাকিলে, উদরস্থ আহার দ্রব্য পরিপাক হওয়ার সময়, হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্কের বাম পার্শ্বে স্থচী বিধানের জ্বাৰ বেদনা।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা, যাহার দক্ণ উরু অংশ নোহান যায় না, চলিয়া বেড়াইলে বাহ্যার উপশম হয় (বাস-টক্স); দুই স্বক্কের মধ্যবর্তী স্থানে এবং বাম স্বক্কাস্থির নিম্ন-ভাগে কন্কনানি; কোমর এবং গুহদেশের উপরিভাগে কন্কনানি এবং ঘূর্ণঘূর্ণ বেদনা যাহা উরুদেশ এবং পা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; চলিয়া বেড়ানোর সময় কোমরের পশ্চাৎভাগে দুর্বলতা এবং ক্রান্তি বোধ (নাইট্রাট্); কোমরের পশ্চাৎভাগে দন্দপিয়া বেদনা (ব্যারাইটা-কার্ক, থুজ); দুই স্বক্কের মধ্যবর্তী স্থানে ঠাণ্ডা বোধ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভারি বোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরার জ্বাৰ বা পক্ষাঘাতের জ্বাৰ বেদনা এবং দুর্বল বোধ, সন্ধিভলিতেই বাহা অধিক অনুভূত হয়; সন্ধিতে বাতের বেদনা; হস্ত পদাদি সহজেই অসাড় হয় বা উহাতে কিঁ কিঁ ধবে (সাইলিসি, সালুফ); পায়ের পাতা ঠাণ্ডা। হাড় স্থানচ্যুত (Dislocated) হইলে যেক্রপ হয়, স্বক্কের সেক্রপ প্রবল বেদনা (ব্রাই, কটা); খেঁতালিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেক্রপ হয়, বাহ্যর উপরি অংশে সেক্রপ বেদনা (আর্গিকা, জেল্‌স); হাতে উষ্ণাভাব; কহুইয়ের সন্ধির বাক্‌ চুলকানি বিশিষ্ট কুস্কৃতা। ডাইন উরুতে স্থচীবিধানের জ্বাৰ প্রথর বেদনা, বাহ্যার দক্ণ উপশমের আশায় রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িতে বাধ্য হয়; ডাইন উরুতে ক্ষত হওয়ার জ্বাৰ টাটানি; উরু এবং উরুর সন্ধিতে বেদনা যাহা হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; কুচ্ছির সন্ধির ভাঙ্গে জ্বালা এবং টাটানি; পায়ের পাতা ক্ষীত এবং উহাতে ভারিবোধ; পায়ের পাতায় দুর্গন্ধবৃদ্ধ ঘণ্ড (ব্যারাইটা-কার্ক, নাইট্‌ক্-আস),

বাহার দরুণ পায়েব আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া বাইরা চড়্ চড়্ করে বা টাটার (সাইলিসি) ; পায়েব পাতা বরকের ঝায় ঠাণ্ডা (গ্রাফ্, ফন্, বিরেট্-আৰ্) ; রাত্রিতে বিছানায় পায়েব ডিমে (থোড়ায়) খিলখরা (কলোস্, রাস্-টম্, সাল্ফ্, বিরেট্-আৰ্) ।

**চর্ম্ম ।** শরীরের নানা স্থানে চুলকানি (রাস্-টম্, সাল্ফ্) ; মুখমণ্ডল বাহ, হাত, পৃষ্ঠদেশ, কুচকী, উদর এবং জননেন্দ্রিয়ে চুলকানি ; গায়ের স্থানে স্থানে লাল দাদের ঝায় ফুসুড়ী এবং উহাতে অত্যন্ত চুলকানি ও জ্বালা-মুভব ; যকৃতের অস্থখের দুরূপ যেরূপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে সেরূপ কটার আভাযুক্ত বা লালচে দাগ পড়ে ; শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষত, যাহা সহজে শুকায় না এবং যাহাতে চুলকানি এবং হলফুটানের ঝায় অমুভূত হয় ।

**নিদ্রা ।** দিনের বেলা, প্রধানতঃ পূর্বাহ্নে, নিদ্রাবেশ বা নিদ্রার অত্যন্ত ইচ্ছা এবং রাত্রিতে ঘুম একবারেই হয় না (ফন্-আন্) ; ঘুমের ঘোরে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা (নেটাম্-মিউর, সাল্ফ্) ; রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে বারম্বার হাত পায়ে ধাক্কা লাগার ঝায় ঝাকনি বা স্পন্দন ; প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিবার অনিচ্ছা এবং অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ ; রাত্রিতে ঘুম হয় না এবং ঘুম হইলেও উহার দরুণ রোগী আপনাকে আপনি স্নহ মনে করে না এবং ঘুম ভাঙ্গিলে সে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে ও শরীর কন্ কন্ করে বা টাটায় ; রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে ভয় থাইয়া চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠা (কফিয়া মার্ক্, সাল্ফ্) ।

**জ্বর ।** সবিরাম বা পালা জ্বর এবং উহার সঙ্গে শীতলাবস্থায় পিপাসা, হাত পায়ে বেদনা, হাত এবং পায়েব পাতা বরকের ঝায় ঠাণ্ডা ; আঙ্গুল যেন অসাড় হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় ; শীতলাবস্থার পর শরীর অত্যন্ত উষ্ণ হয়, বাহার দরুণ রোগী প্রায় অচেতন হইয়া পড়ে এবং তৎপর প্রচুর ঘর্ম্ম হয় । শরীরের স্বাভাবিক সজ্জাপের অভাব (লেডাম্, সাইলিসি) ; সন্ধ্যার সময়, বহির্কায়িতে এবং প্রত্যেকবার নড়া চড়াতে শীতবোধ ; দিনের বেলা, উষ্ণ ঘরেও শীত বোধ ; গরম জল ঢালিয়া দিলে যেরূপ হয়, গায় সেরূপ উষ্ণামুভব ; সামান্য নড়া চড়াতেই উষ্ণামুভব ; অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যার সময় শরীর উষ্ণ এবং তদরূপ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয় ; উষ্ণতা যেন শরীরের নিয়ন্ত্রণ

হইতে উৰ্দ্ধদিকে মাথা এবং মুখমণ্ডলে উঠে একপং অহুত হয়; রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম হয় (ক্যাল্‌ক্-কার্ক, চায়না, মার্ক্, ফন্, সাইলিসি, ষ্ট্যানাম, সাল্‌ক্-আস্); প্রাতঃকালে ঘ্রুণভাঙ্গিলে প্রচুর ঘর্ম (ক্যাল্‌ক্-কার্ক, নাস্‌-বন্, নাইট্রিক্-আস্, পাল্‌স্, সাল্‌ক্); চলিয়া বেড়ানোর সময় প্রচুর ঘর্ম; সামান্য নড়া চড়াতেই প্রচুর ঘর্ম হয় (আস্‌, ক্যাল্‌ক্-কার্ক, হিপ্-সাল্‌ফ্, লাইকোপ্, ফন্, সাইলিসি); রাত্রিতে বৃকে, (প্রধানতঃ স্তনে), পৃষ্ঠদেশ এবং উরুতে শীতল ঘর্ম হয়।

ব্যবহার। স্বল্প রজঃস্রাব বা রজঃবোধ; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful menstruation); জরায়ু হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব (Metrorrhagia); স্বেতপ্রদর; জরায়ু স্বহান ভ্রষ্ট হওয়া; মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis); সন্তান প্রসবের পরও গর্ভাবস্থার জায় পেট উচু থাকা; গর্ভাবস্থায় বমন বা বমনোদ্বেগ (Morning sickness); প্রমেহ রোগ; বারম্বার গর্ভস্রাব হওয়ার ঝুঁকি; হিষ্টেরিয়া; শুক্রবায়ু; একপেশে মাথা বেদনা (আধ্‌কপালিয়া মাথাবেদনা); বিকচ (Eczema); দাদ বা দাদেশ জ্বর ফুসুড়ী; চক্ষু প্রদাহ; বক্রত এবং পেটের অসুখ; কোষ্ঠবদ্ধ; কেন্দ্রিকা মজ্জার উত্তেজনা (Spinal irritation); উদরাময়; পক্ষাবাত; কাশি; আভ্যন্তরিক গয়ের ফেটেক রোগ (Tuberculosis); হপিংকফ্ বা কাশি; সন্ধিবাতজনিত অসুখ; সবিরাম বা পালা-জ্বর; দন্তশূল (প্রধানতঃ গর্ভাবস্থায় এবং হিষ্টেরিয়া আক্রান্ত রোগীর); পুরাতন সর্দি; রাত্রিতে প্রথম ঘুমের সময় বিজানায় প্রস্রাব করা; বৃদ্ধা জীলোকের পেট বড় হওয়া; স্তনের বোটার ছাল উঠিয়া যাওয়া; শিশুগণের গায়ের স্থানে স্থানে ছাল উঠিয়া ক্ষত হওয়া ইত্যাদি অসুখে সিপিয়া ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। শাস্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট রোগী, প্রধানতঃ জীলোকের পক্ষে উপযোগী (পাল্‌স্); জীলোকের শেষ রজঃরোধের সময়ের অসুখ (ল্যাক্, সাস্টুনেরিয়া); জীলোকের যেপ্রকার অসুখে হঠাৎ অত্যন্ত বলকর হইয়া বারম্বার মূৰ্ছা হয়; বেদনা যন্ত্রণাদির সময় শীতবোধ এবং শরীরের কাঁপনি (আস্, বেল্, পাল্‌স্); শরীরে স্বাভাবিক সন্তাপের অভাব (লেডাম্); সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই ক্লান্ত হওয়া; ঠাণ্ডা বাতা-

সাদি একবারেই সমুদ্র শরীরেই নাড়ীৰ স্পন্দনের জ্বাৰ, প্রাধানতঃ বুকের বাম পাৰ্শ্বের সমুদ্র অংশের, স্পন্দন ; গর্ভাবস্থা, সন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করানোর সময় এবং স্মৃতিকাবস্থায় অসুখে বিশেষ উপযোগী ; অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যার সময়, প্রাতঃকালে, বিশ্রামকালীন ( রাস্ট-টক্স ), আহাৰের পর, বসিয়া থাকার অবস্থায় এবং স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের পর অসুখের বৃদ্ধি ; এবং বহির্বাযুতে, উষ্ণ প্রয়োগে এবং প্রবল শারীরিক পরিশ্রমে অসুখের উপশম ইত্যাদি সিপিয়ার কৃতকণ্ডলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত । কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, অজ্ঞাত প্রাকৃতিক লক্ষণের সঙ্গে জীলোকের যোনি, কুচক্ষি এবং উরুদেশে দাদের জ্বাৰ শুকনা ফুসুড়ী থাকাও সিপিয়ার একটা বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । প্রকৃত পক্ষে পাল্‌সেটিল্য বাতীত অজ্ঞ কোন ঔষধের কার্যের সঙ্গে সিপিয়ার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য নাই । তবে কোন কোন বিষয়ে সিপিয়ার কার্যের সঙ্গে লাইকোপডিয়াম, লিলিয়াম্ টাইগ্রিনাম্, মিউরেজ, একোনাইট, আনিমিক, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ক, কার্কো-বেজ, চায়না, মার্কিউরিয়াম্, নাক্স-বমিকা, রাস্ট-টক্স এবং সাল্‌ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । একোনাইট, আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্, আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্, রাস্ট-টক্স ইত্যাদি সিপিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ৬ষ্ঠ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । জরায়ুর অসুখে অনেক সময় ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশন দ্বারা অজ্ঞাত ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায় ।

## সাইলিসিয়া,—সিলিকা,—সাইলিসি ।

( SILICIA,—SILICA,—SILIC. )

কোন এক বিষন্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত সিলিকা ক্রয় করিয়া উহা যথানিয়মে স্তূগার অব্ মিক্কেব সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া উহার ৩য় শতভাগিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় শতভাগিক ক্রম হইতে যথা নিয়মে ইহার ৪র্থ শতভাগিক ক্রমের আবোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

**সাধারণ ক্রিয়া ।** শরীরের প্রায় সমুদয় যন্ত্রের উপরই ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ যন্ত্রাদির শৈথিল্য কিল্লী, গ্রন্থি, অস্থি এবং সন্ধিগুলিই ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে । ইহা শরীরের পরিপোষণ কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া গণ্ডমালা ( Scrofula ) এবং অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশ হেতু রোগ ( Rachitis ) উৎপাদন করে । উক্ত অস্থির গতির ন্যায় এই ঔষধের কার্য্যও আস্তে আস্তে, গভীর ভাবে এবং অনেক কাল ব্যাপিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে । শরীরের কোমলাংশ, অস্থির আবরক কঠিন পর্দা ( Periosteum ), অথবা অস্থিতে পুঁয়োৎপাদন করা এই ঔষধের একটা বিশেষ গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত । প্রতিক্রিয়াতে স্নায়বিক মণ্ডলী আক্রান্ত হইয়া উহাৰ উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্নতা উৎপন্ন হয় এবং তদরুণ কসেরুকা মৰ্জ্জার উত্তেজনা ( Spinal-irritation ), জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত চাঞ্চল্য এবং তৎপর উহার অবসন্নতা ও পক্ষাঘাত হইয়া থাকে ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**মন ।** মন কোন বিষয়েই স্থির থাকে না ; মনে গোলমালে বোধ ( জেল্‌স্, নাক্স-বন্ ) ; সৰ্ব্বদা মনের অস্থিরতা এবং পুঁত্ পুঁত্ করা ; সামান্য শব্দেও চমকিয়া উঠা এবং চিন্তাশূন্য হওয়া ( ককিউলাস্ ) ; সৰ্ব্বদা নিরাশা, নিস্তব্ধভাবে থাকা এবং জীবনে দিক্কার বা বাচিবার অনিচ্ছা ; চিড়্ চিড়্ করা, খিট্ খিট্ করা এবং মানসিক অবসন্নতা ( নাক্স-বন্ ) ; সামান্য বকনের অন্তর্য কাজ করিলেও মনে হয় যেন অত্যন্ত গর্হিত কাজ করা হইয়াছে ( ইগ্রেস্ ) ; সহজেই মন টলে এবং সৰ্ব্বদা বুক দুড়্ দুড়্ করে ও



চিন্তার ভাব ; সর্বদাই বিমর্ষ ভাব এবং রোগী মনে কবে যেন সে মরিবে ; কোন বিষয়ে চিন্তা কবার অশক্তি ( জেল্‌স্, ল্যাক্ ) ; রোগী শিশু হইলে তাহার নিকট কোন কথা বলিলে সে কাঁদে ( ক্যাম্ ) ।

**মস্তক ।** নেসা করিলে যেকূপ হয়, মাথায সেরূপ অনুভূত হয় ( জেল্‌স্, ক্যানাবিস্-স্যাট্, নাক্স-বম্ ) ; মাথাঘোরা, যাহার দরুণ রোগী সম্মুখ দিকে বারম্বার টলিয়া পড়ে, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, গাড়ী ঘোড়ার চাপিলে, অথবা উপরের দিকে তাকাইলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; মাথায রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং উহাতে জ্বালা অনুভব ; মাথায চাপিয়া ধরার ত্রায় বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মস্তিষ্ক এবং চক্ষু উহার কোটির হইতে ঠেলিয়া বাহির হইবে ( একন্, ব্রাই, ক্যালী-আনোড্ ) ; মাথায দপ্‌দপিয়া বেদনা যাহা ঘাড় হইতে আরম্ভ হইয়া মাথায উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; মাথায প্রবল বেদনা, যাহার দরুণ ইতিহিত জ্ঞান থাকে না ; প্রাতঃকালে মাথায চাপিয়া ধরার ত্রায় প্রবল বেদনা এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে শীত বোধ এবং বমনোদ্বেগ ; মাথায দপ্‌দপিয়া বেদনা যাহা কপাল এবং মাথায উপরিভাগেই অধিক অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীত বোধ ( পাল্‌স্, আলোজ্, ক্যাস্ট্, ক্যালী-বাই, নাক্স-বম্ ) ; মাথায ছিড়িয়া ফেলার ত্রায় অত্যন্ত যাতনা, যাহা মাথায এক পার্শ্বেই সচরাচর অধিক অনুভূত হয় এবং যাহা মাথায পশ্চাৎ ভাগের উন্নত স্থান হইতে আবম্ভ হইয়া উপর এবং সম্মুখ পানে বিস্তৃত হয় ; মাথা ধবা এবং উহাব দরুণ চক্ষুয উপরিভাগে মোচড়াইবা পড়া বা থেঁত-লিয়া যাওয়ার ত্রায় বেদনা, যাহার দরুণ রোগী চক্ষু মেলিতে পারে না ; কপাল এবং কপালের দুই পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ত্রায় বেদনা বা যাতনা ; মাথায পশ্চাৎভাগে চাপিয়া ধরার ত্রায় বেদনা বা যাতনা, মানসিক পরিশ্রম বা চিন্তা, গোলমালে, নড়াচড়াতে, ঝাঁকি লাগিলে, আলোকে, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, ঠাণ্ডা বাতাসে, মাথা কদিয়া বাঁধিলে মাথা বেদনার বৃদ্ধি ( অ্যাজের্ট্-নাইট্রিক্ ) ; মাথা গরম কাপড় দিয়া বাঁধিলে মাথা ধরার বৃদ্ধি ( ম্যাগ্-মিউর ) ; গরম, ভিজা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে এবং উষ্ণ ঘরে মাথা বেদনার বৃদ্ধি ; মাথায মব্যাদেশস্থিত মমুদয়ই যেন জীবিত একরূপ

অনুভূত হয়; অমাবস্থা, পূর্ণিমাতে মাথা ধরার উদ্রেক বা বৃদ্ধি; রাত্রিতে মাথা প্রচুর ঘর্ষ দ্বারা আবৃত (চায়না), বাহ্যর দরুণ মাথা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবার ইচ্ছা হয়; মাথা বড় এবং উহার ঠিক উপরিভাগের হাড়ের জোড় খোলা থাকে (Open Fontanelles) এবং শরীর শীর্ণ এবং শিটা; উদর ক্ষীণ এবং উষ্ণ (ক্যাক্স-কার্ক্স); মাথায় সামান্য চাপ, এমন কি টুপীর চাপও, সহ হয় না (কার্কো-বেজ, চায়না, মার্ক); মাথার পশ্চাৎভাগে আর্দ্র, শুষ্ক, অথবা ছর্গক যুক্ত কলকানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী; মাথায় পূঁয়, সংযুক্ত, জালাযুক্ত এবং চুলকানি বিশিষ্ট পোস পাঁচড়া (হিপ-সাল্‌ফ্‌, গ্রাফ, লাইকোপ্‌, রাস্‌টক্স, সাল্‌ফ্‌); মাথায় চুলকানি (ক্যাম্ফার, সিপিফ, সাল্‌ফ্‌) যাহা চুলকানের পর বেদনায়ুক্ত হয় এবং জ্বালা করে (মার্ক); মাথা এবং গ্রীবা দেশে পূঁব বা জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুলকানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী, গরম ভাবে বাঁধিয়া রাখিলে যাহার উপশম হয়।

চক্ষু । চক্ষু প্রদাহ এবং তদরূপ চক্ষু লালবর্ণ হয়, উহাতে জ্বালায় উদ্রেক হয় এবং চিড়িক মারে ও উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে জল পড়ে (আলান, ক্যাক্স-কার্ক্স, লাইকোপ্‌, মার্ক, পাল্‌স্‌, সাল্‌ফ্‌); রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে (ক্যাক্স-কার্ক্স, গ্রাফ, লাইকোপ্‌, ফস্‌, সাল্‌ফ্‌, রাস্‌টক্স); বালি পরিপূর্ণ থাকিলে যেরূপ হয়, চক্ষুর মধ্যে প্রাতঃকালে সেকপ শুষ্কানুভব (আর্স্‌, কঠ, হিপ-সাল্‌ফ্‌, পাল্‌স্‌, রাস্‌টক্স, সিপিফা); চক্ষু বুজিয়া চাপিলে চক্ষে ছিড়িয়া ফেলা বা খোঁচা বিধার দ্বারা বেদনা বা যাতনা; ডাইন চক্ষুর জল নিঃসারক গ্রন্থি এবং উহার আধারের ক্ষীতি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর চর্মে প্রদাহ; দৃষ্টিহীনতা; পাখীর ডানা ঝাড়িলে যেরূপ হয়, চক্ষুর সম্মুখে সেকপ অথবা ক্রাশার দ্বারা অনুভূত হয় (ফস্‌); চক্ষুর কর্ণিয়াতে (Cornea) নালী (Fistula); চক্ষুর পাতায় বড় আঞ্জনি (Stye) যাহা বারম্বার হয় এবং বারম্বার সারিয়া যায়; পড়িবার সময় মনে হয় যেন পুস্তকাদির সমুদয় অক্ষর একত্র জড়াইয়া গিয়াছে (নেট্রাম-ইউব); পুস্তকের অক্ষরাদি যেন মলিন বা ফিকা কালী দিয়া মুদ্রিত; চক্ষুর সম্মুখে ঝাল দাগ ভাসে (আগারিকাশ্‌, সাইক্লেমেন, মার্ক, ফস্‌, সিপিফা, সাল্‌ফ্‌); কর্ণিয়াতে কঠ, দাগ পড়া এবং উহার অস্বচ্ছতা (ইউক্লেস্‌, নাই-

ট্রিক-আস্, সাল্ফ্); চক্ষুজালোক অভ্যন্ত লাগে বা সহ হয় না; চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ বা অণুনের কণার জায় কণা ভাসে (নাক্স-বম্)।

কর্ণ । কর্ণের বহির্দেশ ক্ষীত, এবং কর্ণের মধ্যদেশ হইতে জলের জায় তরল ক্রেন্দ নিঃসরণ এবং কানের মধ্যে হিস্ হিস্ শব্দ হওয়া; কানের মধ্যে চুলকানি (ব্যারাইট্ কার্ন্, হিপ্-সাল্ফ্), গিলিবীর সময়ই যাহা অধিক অনুভূত হয়; কান বন্ধ হয় (কোঁকাণ্, মাজেনিজ্) বাহ্য হঠাৎ শব্দ হইয়া সময়ে সময়ে পুলিয়া বায়; কানে কম শুনা, বিশেষতঃ মনুষ্যের স্বর (ফস্); কানের মধ্যে সোঁ, সোঁ এবং গানের শব্দের জায় শব্দ হয় (চায়না, মার্ক্, সাল্ফ্); কানে কোন প্রকারের শব্দই সহ হয় না (একন্, বেল্, লাইকোপ্, সিপিয়া)।

নাসিকা । বারবার প্রবল হাঁচি অথবা হাঁচি হওয়া হওয়া হইয়া হয় না; নাক দিয়া ক্ষতকারক প্লেগাদি নিঃসরণ (আস্, আমন্-কার্ন্, এরাস্, মার্ক্-কর); শুষ্ক সর্দি এবং নাসারন্ধ্র একবারে বন্ধ হইয়া থাকে (নাক্স-বম্); পর্যায়ক্রমে তরল এবং শুষ্ক সর্দি (আলান্, মাক্স-বম্, ফস্); নাকের মধ্যে শুষ্ক, বেদনানুভব এবং উহাতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জায় ক্ষত হইয়া উহাতে চুমটী পড়া; নাক দিয়া রক্ত পড়া (একন্, বেল্, ব্রাই, ফস্-আস্); নাকের মধ্যে চুলকানি (সাল্ফ্); আঘাত লাগিলে ঘেরূপ হয়, নাকের হাড় সে রূপ বেদনা বা যাতনা; ভ্রাণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ (ক্যালী-বাই, সিপিয়া); অনেকক্ষণ ধরিয়া নাসিকার অগ্রভাগের চুলকানি।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা এবং যাতনার চিহ্ন বিশিষ্ট; নিম্ন ওষ্ঠের লাল অংশে ক্ষত; ওষ্ঠের কোণে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ক্ষত (আন্টি-ক্রুড্, লাইকোপ্, গ্রাফ্, রাস্-টক্স) এবং উহাতে চুলকানি; টুটিতে দাঁদের জায় ফুলুড়ী (হিপ্-সাল্ফ্, গ্রাফ্); ইন্নাস্থির নিম্নস্থিত গ্রন্থির অত্যন্ত কষ্টদায়ক ক্ষতি (হিপ্-সাল্ফ্)।

মুখগহ্বর এবং গলারমধ্য । উচ্চ আহার দ্রব্য পাইলে বা মুখ দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস টানিলে দাঁতের গোড়ায় বেদনা বা যাতনা (ক্যাল্-কার্ন্, মার্ক্, সাল্ফ্); দাঁত নড়ে এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা বলিয়া অনুভূত হয় (আস্, মার্ক্, রাস্-টক্স) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাড়ি ক্ষীত এবং

বেদনায়ুক্ত হয়; দন্ত মাড়ি ব্রণ (Gum-boils) : মুখের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিলেই মাড়িতে অত্যন্ত বেদনা বা যাতনাব উৎপন্ন হয়; জিহ্বা অত্যন্ত টাটায়; এক গাছি চুল লাগিয়া থাকিলে যেকপ হয়, জিহ্বার সম্মুখ ভাগে সেরূপ অশুভ হয়; মুখ দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয় (আর্গিকা, হিপ্-সাল্ফ, আযোড, মার্ক, নাইট্রিক-আস্); মুখের মধ্যে শুষ্কবোধ (আস্, এপিস্, নাক্স-মফ্, সিপিয়া, পাল্‌স্)। ক্ষত হইলে বা ডেলার ছায় কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে বেরূপ হয়, গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেরূপ বেদনা, যাতনা বা টাটানি; গিলিবার সময় গলার মধ্যে চাপিয়া ধরার ছায় বেদনা বা যাতনা এবং কুট্-কুটানি; কোন দ্রব্য গিলিবার সময় নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

পাকস্থলী এবং উদর । হয় তৃষ্ণা, নতুবা ক্ষুধা একেবারেই থাকে না; অত্যন্ত পিপাসা (একন্, আস্, ব্রাই, রাস্-ট্রঙ্ক, সিকেল্), প্রাতঃকালে মুখে তিক্তস্বাদ (ব্রাই, পাল্‌স্, চায়না, সাল্‌ক্); টক্ উদগার উঠা (কার্বো-বেজ্, নাক্স-বম্, ফন্, পাল্‌স্); জল ভাল লাগে না, যাহার দ্রব জল খাইলেই বমন হয়; আহারের পর পাকস্থলাতে ভারি এবং চাপা বোধ (আস্, ব্রাই, নাক্স-বম্, সিপিয়া); পাকস্থলীর মধ্যে জ্বালাহুভব (আস্, ক্যাছ্, ফন্, সাস্থুনেরিয়া); চাপিলে পাকস্থলীতে অত্যন্ত বেদনাশুভ হয় (হায়োস্, নেট্রাম্-কার্ব্, সিপিয়া, পাল্‌স্); পাকস্থলীতে নিঙ্‌ডান বা আঁকড়াইয়া ধরার ছায় বেদনা বা যাতনা, আহারের পরই বারি অধিক অশুভ হয়; ক্ষুধা থাকে বটে, কিন্তু কোন দ্রব্যে কঁচ থাকে না, যাহার দ্রব কোন দ্রব্য মুখে দিলেই বমনোদগ হয়। বক্রত প্রদেশের ক্ষীতি এবং উহাতে অশুখ এবং চাপাবোধ; উদর ক্ষীত, বিস্তৃত ও কঠিন (আস্, ব্যারাইটা-কার্ব্, ক্যাক্-কার্ব্, মার্ক্); উদরে প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু সঞ্চার এবং উহাতে গড়্‌গড়্‌, কল কল শব্দ হওয়া (আগারিকান্, আলোজ্, হিপ্-সাল্‌ক্); শুষ্কতার দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্, ব্রাই, গ্রাক্); উদরে কনঠবৎ এবং চিন্তিনে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ; উদরের মধ্যে জ্বালাহুভব (আস্); কুচকীর গ্রন্থির ক্ষীতি (বাগী)।

**মল এবং মলদ্বার ।** শুষ্ক দ্বারে কর্তনবৎ এবং হল ফুটানের স্তায় বেদনা বা যাতনা ; মলত্যাগের সময় শুষ্কদ্বারের মধ্যে জালা এবং হলফুটানের স্তায় যাতনা ; শুষ্কদ্বার বেন সর্বদা ভিজা থাকে (কার্কো-বেজ, কার্কো-আনিমেল, মার্ক-কর) ; শুষ্কভাবে জালা (আস্, ক্যাস্, সাল্ফ), শুষ্ক, কঠিন মলত্যাগেব পবই যাতনা অধিক উদ্ভক হয় ; অনবরত বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না (নাক্স-বন্) ; উদরাময় এবং মল অত্যন্ত ছুর্গন্ধযুক্ত (আস্, অসাকিচ্চিডা, লেপ্ টেণ্ডা) ; কাইয়ের স্তায় তরল শ্লেষ্মা ভেদ ; কোষ্ঠবদ্ধ, মল পরিমাণে অল্প, কঠিন পদার্থ যুক্ত, ফিকা রঙ্গবিশিষ্ট এবং শুষ্ক জড়তা বদরুণ যেকূপ হয়, মল নির্গত হইতে দেরূপ কষ্টানুভব (আলাম), ও মল একবার কতক পরিমাণে নির্গত হইয়া পুনরায় শুষ্কের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ; রক্তশ্রাবের সময় এবং উহার পূর্বে কোষ্ঠবদ্ধ ; অমাবশ্টা, পূর্ণিমাতে উদরাময় ; মলের সঙ্গে ক্ষুদ্রবৎ গোল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি নির্গত হয় ; অত্যন্ত কষ্টদায়ক অর্শ রোগ এবং অশ্মে অত্যন্ত কষ্টদায়ক অর্শেব অন্তর্কর্ষী বাহ্য প্রত্যেক বার মল ত্যাগেব সময় শুষ্ক দ্বারের বাহির হইয়া পড়ে (আলোজ্, ক্যাক্স-কার্ক, ল্যাক্, মিউর-আস্, পাল্ফ) ।

**মূত্রযন্ত্র ।** বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে অতি অল্প পরিমাণে মূত্র নির্গত হয় এবং মূত্রাধাবের সঙ্গেচক যন্ত্রের উত্তেজনার দরুণ অত্যন্ত যাতনা ; মূত্রে লাল বালির স্তায় তলানি পড়ে (লাইকোপ্) ।

**জননেন্দ্রিয় ।** পুরুষের হয় স্ত্রীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা, নতুবা উক্ত ইচ্ছার অত্যন্ত হ্রাস বা উহা একবারেই না থাকা ; রাত্রিতে পুরুষাঙ্গ অত্যন্ত প্রবল বেগে খাড়া হয় (গ্রাক্) ; রাত্রিতে স্বপ্নে ধাতু নিঃসরণ (চায়না, ডিজিট্, ফন্-আস্) ; মল ত্যাগের সময় বেগ দিলে ধাতু নিঃসরণ (আগ্নাশ্, সেনিগা) ; পুরুষাঙ্গের মাংসের আবরক চর্ম ছাল উঠিয়া যাওয়ার স্তায় লালবর্ণ হয় এবং চুল্কার (মার্ক) ; স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছার অত্যন্ত হ্রাস বা প্রায় বিনাশ (আর্জেট্-নাইট্রাশ্, হিপ্-সাল্ফ, লাইকোপ্, ম্যাগ্-কার্ক) ; অণ্ডকোষাধার বা পোতার নানা স্থানে চুলকানি বিশিষ্ট ফুস্ফুড়ী (পিট্রোল্, সাল্ফ) ; অণ্ডকোষাধারের শোথ (পোতার জল হওয়া,—Hydrocele) ; পোতায় ঘর্ষ হওয়া (রডোডেণ্ডুন্) ।

রক্তস্রাবের বৃদ্ধি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরে বারিমার বরফের ছায় ঠাণ্ডা বোধ; রক্তঃস্রাব (কলোফিলাম, সিমিসিক, পাল্‌স্); নিষমিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং অতি অল্প পরিমাণে রক্তঃস্রাব; শিশুকে স্তন দুই পান করণের সময় জরায়ু হইতে প্রচুর পরিমাণে টাট্‌কা রক্তস্রাব; স্বতন্ত্র সময় রক্তস্রাবের পদবর্ত্তে জরায়ু হইতে সাদা জলের ন্যায় পদার্থ নিঃসরণ (পাল্‌স্); প্রচুর পরিমাণে উগ্র, ক্ষত কারক স্বেত প্রদর নিঃসরণ; তলপেটের সমুদয় বস্ত্র যেন নিম্নদিকে ঠেলিয়া নামিতেছে বোনি হারে একপ অমুভূত হয়; বোনিতে চুলকানি, জ্বালা এবং টাটানি (সাল্‌ফ্); স্তন ক্ষীত, কঠিন এবং বেদনায়ুক্ত (কোনায়াম), যাহার দরুণ যেন হয় যেন স্তনে ফোড়া দি হইবে (মার্ক্, কাইটোল্) এবং যাহা স্তনের বোটার নিকটই অধিক অমুভূত হয়; বাম স্তনের বোটার ছুবী দিয়া কাটার ছায় বা জ্বালায়ুক্ত বেদনা; স্তনের বোটার ক্ষত এবং উহাতে অত্যন্ত টাটানি।

স্থানযন্ত্রে । স্বরভঙ্গ; কণ্ঠনালীতে ঋণ্ণশ্বে বোধ (হিপ্-সাল্‌ফ্, কার্কো-বেজ্, রাস্-টম্, ক্যালী-বাই); শুক খুশ্‌খুশে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ ও গলার মধ্যে স্ফুটন্তী ও চড়্‌চড়ানির দরুণ বৃকে টাটানি (ফস্, কমেস্, সাল্‌সুনেরিয়া, সিপিয়া); কাশি, সন্ধার সময় এবং রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার উদ্রেক হয় (কোনায়াম্, পাল্‌স্, সিপিয়া); প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে কাশি; গলা দিয়া গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণের, ডেলার ছায়, পূর্ব সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন (কার্কো-বেজ্, লাইকোপ্, টাকিস্); গলা দিয়া চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা নির্গমন (টোনাম্); হাস প্রস্থাস বাঁধবোধ এবং ঘন ঘন, হাঁপানির ছায়; বেঁটলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেদরুণ হয়, কাশির সময় বৃকের মধ্যে স্ফুটন্ত বেদনাজ্বা (মার্কিকা, এপিদ্); বৃক এবং উহার পার্শ্বে বাটিয়া ধবাব ছায় বেদনা বা বাঁহনা (বাই, ক্যালী-কার্ক, ফস্, সিপিয়া); বক্ষার্স্থ (Sternum) প্রদেশে চাপিয়া ধরার ছায় বেদনা বা বাঁহনা।

হৃৎপিণ্ড । বদিয়া পাকা কালীন হৃৎস্পন্দন বা উহার দ্রুতপানি, যেরূপ সমুদয় শরীরেই অমুভূত হয়; প্রত্যেকবার নড়া চড়াতেই হৃৎস্পন্দন।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । আব্রাদেশ এবং কর্ণমূলস্থিত গ্রাহগুলি ক্ষীত

ও কঠিন হয় এবং পাকিয়া উহাতে পূর্বের সঞ্চার হয় (ব্যারাইটা-কার্ক, ক্যাক-কার্ক, আরোড); বাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া (চেলিডন্, ইম্পেস); পৃষ্ঠ দেশের দুর্বলতা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাতের জ্বায় অবশবোধ, বাহার দক্ষণ চলিয়া বেড়ান এক প্রকার অনন্তব হইয়া পড়ে; কোমর এবং গুহ দ্বারের উপরিভাগে কন্-কনানি, খোঁচা বিঁধার জ্বায়, জালায়ুক, দপ্‌দপিয়া বেদনা; হুই স্বক্কাস্থির মধ্যবর্তী স্থানে এবং উহার নিম্নভাগে ছিড়িয়া কেলাস জ্বায় বেদনা বা যাতনা; বসি অবস্থা হইতে দাঁড়াইবার সময় এবং প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিবার সময় কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা এবং তদক্ষণ উক্ত অংশ নোয়ান যায় না; মারিলে যেকূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎভাগে এবং কুঁচকি প্রদেশে সেকূপ বেদনানুভব; গাড়াতে চাপিয়া অনেক ক্ষণ বেড়াইলে যেকূপ হয়, গুহ দ্বারের ঠিক উপরি ভাগের হাড়ে সেকূপ বেদনা বা যাতনা; গুহ দ্বারের উপরি ভাগের হাড়ের মধ্য দিয়া হল ফুটা-নের জ্বায় অগ্নুভূত হয় এবং চাপিলে উক্ত স্থানে বেদনা বা যাতনার উদ্ভেক হয়।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। নখ কাল্‌চে হরিদ্রা বর্ণ, অব্‌ডু খাব্‌ডু এবং নট্‌কা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা, বাহার দক্ষণ রোগী কদাচিত্ত চালতে পারে; সানাত্ত কারণেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঝিঁ ঝিঁ ধরা (সিপিয়া, সাল্‌ফ্); পা এবং পায়েব পাতা ববকের জ্বায় ঠাণ্ডা (বিরেট্-আব্); অঙ্গ প্রত্যঙ্গে টাটানি এবং অবশবোধ। বাহুতে ভারিবোধ এবং উহাতে পক্ষাঘাতের জ্বায় অবশবোধ; সমুদয় অঙ্গের কাপনি, হাতেই বাহা অধিক অগ্নুভূত হয়; পোগলের প্রতিরক্ষ্য ক্ষীতি (ব্যারাইটা-কার্ক, লাই-কোপ্); মণিবন্ধ এবং হাতের পাতাব তালুতে ছিড়িয়া কেলাস জ্বায় প্রবল বেদনা বা যাতনা; চাপিয়া শয়ন করিলে বাহু অবশ বা অসাড় হয়; সানাত্ত পরিশ্রমেই হাতে ঝিল ধরে এবং উহাতে অবশবোধ হয়; হাতে প্রচুর ঘর্ম; রাত্রিতে হাত যেন অসাড় হইয়া থাকে; অঙ্গুলীর অগ্রভাগ গুহ; হাত গুটানের সহায়কারী পেশীর (Flexor-muscles) অগ্রভাগে (Tendons) সঙ্কোচন, অঙ্গুলী সঞ্চালনের সময় বাহা অত্যন্ত বেদনানুরূপ হয়; পাকিয়া পূর্ব

হওয়ার উপক্রম হইলে বা আঙ্গুল হাঁড়া (Whitlow) হইলে যেকোন হয়, আঙ্গুলে ছিড়িয়া ফেলা, কাসিয়া ধরা বা ষাটিয়া ধরার জ্বার সেকোন বেদনা বা যাতনা এবং অবশবোধ (হিপ্-সাল্ফ, নার্ক্) । নিম্নাঙ্গে ভারি এবং প্রান্তিবোধ ; উরুর সন্ধি এবং উক্তে ছিড়িয়া ফেলা বা কাসিয়া ধরার জ্বার বেদনা বা যাতনা ; কুচকির সন্ধিতে পূঁথ হওয়ার জ্বার বেদনা বা যাতনা ; অত্যন্ত কাসিয়া বাধিয়া রাখিলে যেকোন হয়, হাঁটুর সন্ধিতে সেকোন বেদনা বা যাতনা ; পায়ের ডিনে (খোড়ায়) খিল ধরার জ্বার কাসিয়া বা ষাটিয়া ধরা ; পায়ের পাতা ক্ষত এবং লালবর্ণ ; প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় সময় পায় এমনোৎপাদক দুর্গন্ধ, কিন্তু ঘষ হয় না ; পায়ের পাতায় অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঘষ্ম (ব্যংগাইটা-কার্ক, নাই-ট্রিক্-অস্, গ্রাক্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুলের কাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বার ক্ষত (সিপিয়া) ; পায়ের পাতায় তলায় খিল ধরা (কার্কো-বেজ্, সাল্ফ্) ; পায়ের পাতার তলায় ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বার ক্ষত এবং উহাতে জ্বালা (কার্ক্, কার্ক্, সাল্ফ্) ; পায়ের বুদ্ধাঙ্গুলেতে অনবরত ছিদ্র করা বা ছিড়িয়া ফেলার জ্বার বেদনা বা যাতনা ; পায়ের আঙ্গুলের নখ আঙ্গুলের কোণে প্রবিষ্ট হওয়া (Ingrowing toe-nails) এবং তদ্বৎ আঙ্গুলের কোণে দিগ্ দুর্গন্ধযুক্ত পুঁথ নিঃসরণ ; কড়িতে (Jorn-) স্থায়ী বিধানের জ্বার বেদনা বা যাতনা (সাল্ফ্) ; পায়ের আঙ্গুলের নখের নাচে স্থায়ী বিধানের জ্বার বেদনা বা যাতনা ।

চর্ম্ম । সান্নিধ্য যাও সহজে শুকাই না এবং উহাতে প্রচুর পুঁথের সঞ্চার হয় (বোরাক্, হিপ্-সাল্ফ্, গ্রাক্, সাল্ফ্) ; গায় অত্যন্ত বেদনা-বুদ্ধ বা কষ্টদায়ক রূপের জ্বার ক্ষত ক্ষত কুসুড়া (দিকুটা, ক্রোটন, সাল্ফ্) বাহ্য অবশেষে পুঁথ পূর্ণ ক্ষতে পরিণত হয় ; গায় দাদ বা বিকলের জ্বার কুসুড়া (গ্রাক্, হিপ্-সাল্ফ্, লাইকোপ্, সাল্ফ্) ; ত্রণ হওয়ার ধাতু ; শরীরের নানা স্থানে ত্রণ হয় ; গায় ক্ষত এবং উহাতে ছাল কুটান বা ষাটিয়া ধরার জ্বার জ্বালাবদ্ধ বেদনা বা যাতনা ; দুর্গন্ধযুক্ত ছালার জ্বলের জ্বার ছেকুড়া ছেকুড়া পর্দার জ্বার পদার্থ বিশিষ্ট ক্ষত এবং উহাতে মাংসের অস্বাভাবিক ব্রন্ধি (Proud-flesh) (অস্, কার্কো-বেজ্, গ্রাক্) ; পর্দা বিশিষ্ট স্থানে মুক্ত আকারের সাংঘাতিক ক্ষত এবং উহাতে পুঁথের সঞ্চার ; গ্রন্থির বেদনাইন



ক্ষীতি ; গ্রন্থির পূর্ব সম্বলিত ক্ষীতি (গ্রাফ, হিপ-সাল্ফ) ; নালী বা এবং উহা ইহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পূর্ব নিঃসরণ ও ঘাঘের চতুর্দিকবর্তী স্থান কঠিন, ক্ষীত এবং নীলের আভাযুক্ত লালবর্ণ (আণ্টিমোনিয়াম্, ক্যাক্স-কার্ল, ক্যালী-আমোড্) ; যা ওকাইয়া গেলে ঘাঘের স্থানে বিশিষ্ট দাগ থাকিবা যায় ।

নিদ্রা । আগারের পর ঘুমের অত্যন্ত ইচ্ছা (ক্যালী-কার্ল, নাক্স-মক্স) ; সন্ধ্যার সময় ঘুমের অত্যন্ত ইচ্ছা ; অস্থির নিদ্রা এবং নিদ্রাবারা রোগী আপনাকে আপান স্তম্ভ মনে করে না ; ঘুমেরঘোরে ভয় বাইরা হঠাৎ চমকিয়া উঠা এবং তদ্রূপ সমুদয় শরীরের কাঁপনি ; এলোমেলো, ভয় উৎপাদক স্বপ্ন দেখা ; যৌবন কালের এবং গত ঘটনার বিষয়ে চিন্তা উৎপাদক স্বপ্ন দেখা ; ঘুমেরঘোরে স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের স্বপ্ন দেখিরা অনিচ্ছাপূর্বক ধাতু নিঃসরণ (ফস্-আস্) ।

জ্বর । অন্তঃপত শীত বোধ, শারীরিক পবিত্রমে এবং উষ্ণ ঘরে থাকিলেও বাহ্য অল্পভূত হয (পাল্-স্) ; জ্বর এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে মাথার অত্যন্ত উষ্ণভাব (বেগ্) ; বাবঘার দমকা উষ্ণভাব, মুখমণ্ডল এবং মাথা-রই বাহ্য অধিক অল্পভূত হয ; রাত্রিতে জ্বরের বৃদ্ধি ; রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম (গায়না, সাল্ফ-আস্, ষ্টানাম্) ; ঘর্ম দুর্গন্ধযুক্ত (ক্যাসো-আনিমেল্, অগিকা, আস্) ; সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই ঘর্ম হয (সিপিরা, অম্বা, ক্যাক্স-কার্ল, হিপ-সাল্ফ, লাইকোপ্, ফস্) ; পূর্বাধি রসকর হেতু জ্বর বা হেক্-টিক্ ফিবার (Hectic-Fever), বিশেষতঃ অনেক কাল ধরিয়া পূর্ব দ্বারা রক্ত বিযাক্ত হওয়ার দরুন অমুখ (ক্যাক্স-কার্ল, হিপ-সাল্ফ, ফস্, সাল্ফ) ; ক্রমির উত্তেজনাজনিত জ্বর ।

বাবহার । পূর্ব সম্বলিত অমুখ বাহ্য আন্তে আন্তে বৃদ্ধি পায় ; গ্রন্থির অমুখ, ফোড়া, ক্ষত, আঙ্গুল হাড়া (Whitlow) ; ব্রণ ; ছুইব্রণ (Carbuncle) ; কর্কট-বোগ (Cancer) ; অস্থি পোকাখ ধরা (Caries) ; গণ্ডমালা (Scrofula) , এবং অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশজনিত অমুখ ; (Rachitis) ; অস্থির অমুখ ; গ্রন্থির অমুখ ; শোথ ; পেশীক্ষয় বা শীর্ণ হওয়া (Marasmus) ; অস্থিক্ষয় (Necrosis) ; ইংরেজী টিকা দেওয়ার (Vaccination) দরুন অমুখ ;

কসেরিকা স্ফকীয় অস্থি ; অস্থির আবরক কঠিন পর্দার প্রদাহ (Periostitis) ; বিনর্প বা ইরিসিপেলাস্ ; বিকচ ; দাদ বা দাদের জ্বর চক্ষু রোগ ; হাঁপানি কাশি ; অভ্যন্তরীণ বস্ত্রের ক্ষেটিক বোগ (Tuberculosis) ; রক্ত-বোধ বা গৌণে প্রথম রক্তস্রাব ; জ্বাশু হইতে রক্তস্রাব (Metrorrhagia) ; শ্বেতপ্রদর ; মূত্রিকা পাণ্ডুবোগ (Chlorosis) ; স্তনের প্রদাহ বা উহাতে ফোড়াহি হওয়া ; অণ্ডকোষাদ্যেরেব শোণ বা পোতায় জন হওয়া (Hydrocele) ; রাত্রে স্বপ্নে অনিচ্ছাপূর্ণক মূত্রত্যাগ বা বিছানায় প্রস্রাব করা ; কোষ্ঠবন্ধ ; অর্শ রোগ ; নানিকা স্ফকীয় সন্ধি ; কান দিরা পূঁথ পড়া ; চক্ষুর কণিরার অস্থি, উহাতে ক্ষত, এবং উহার অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea), লিম্ফেটিক গ্রন্থি স্বাকৃতি ; গণ্ডমালা, পারার অপব্যবহার বা স্কার্ভি জনিত (Scurbutic) ক্ষত ; মাথা ঘোরা ; মাথায় ঘা ; তরুণ অস্থির দরুণ মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া ; চক্ষু ছানি পড়া ; দৃষ্টিহীনতা ; কানে কম শুনা ; পুরাতন সন্ধি এবং সামান্য কারণেই সন্ধি লাগার ধাতু ; বক্ষা কাণ জনিত অস্থি বধা,—রক্তোৎকাশ, ছুরণ কারক ঘৃষ্ম, পুঁথ নাশনের ইত্যাদি ; হাঁটুর সন্ধি স্বাকৃতি ; হাড়ের পক্ষাঘাত ইত্যাদি অস্থি সাহায্যসহ ব্যবহার্য ।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।** সর্বদা ছুরণতা এবং তদরুণ সর্বদা শয়ন করিয়া থাকিব হুছা ; শরীরক পারিশ্রমের সময়ও যেন গার স্বাভাবিক সন্তাপ থাকে না ; সামান্য কারণেই সন্ধি লাগা ; সমুদ্র শরীরেই খেঁচলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার জ্বা বেদনা বা বাতনা (আনিকা, ব্যাপ্ট) ; যে পার্শ্বে শয়ন করা যায়, সে পার্শ্বেই সমুদ্র অঙ্গুষ্ঠ ক্ষত হওয়ার জ্বা বেদনা এবং গারের কাপড় কোণরা দিলেই অত্যন্ত শীত বোধ, পিপাসা এবং মাথায় উকাহুতব ; গণ্ডমালা ধাতু বিশষ্ট বালক বালিকার অস্থি ; পেট বড়, মাথা বড়, পারের পাটার সন্ধি ছর্সল এবং মাথায় প্রচুর ঘর্ম ও অনেক কাল মাথার ঠিক উপরি ভাগের হাড়ের জোড় খোলা থাকা (Open-Fontanalles) ; শরীরের অসম্পূর্ণ পরিপোষণ হেতু ছর্সলতা ; পুঁথ উৎপাদন করার উপর হহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, বাহার দরুণ ইহা সেবনে ফোড়া পাকে এবং আক্রান্ত স্থানে অতিরিক্ত পরিমাণে পুঁথ উৎপন্ন হইলে পুঁথের সকার কম হয় (হিপ্সাল্ফ, মিউর-আস্,

ফাইটোল) ; ইংরেজী টিকা দেওয়া জনিত অসুখ ; পূর্ণিমা, অমাবস্যাতে (কষ্ট), নড়াচড়াতে, রাত্রিতে, প্রাতঃকালে, মাথা আড়ল করিলে বা রাখিলে অসুখের বৃদ্ধি এবং মাথা ঢাকিয়া রাখিলে, উষ্ণতাতে, ঘরের মধ্যে থাকিলে বা গরম কাপড়াদি পরিয়া থাকিলে অসুখের উপশম ইত্যাদি সাইলিসিয়ার কতক গুণি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ ।** সাইলিসিয়ার কার্যের সঙ্গে ফ্লুরোরিক্‌ আসিড্‌, ফস্ফরিক্‌-আসিড্‌, পিক্‌রিক্‌ আসিড্‌, ক্যাল্‌কেবিয়া কার্বি, হিপার সাল্‌ফিউরস্‌, মাকিউবিয়াস্‌ এবং ফস্ফবাসের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বিধি কোন কোন বিষয়ে ইহাব কার্যের সঙ্গে বেলাডোনা, কার্বো-বেঞ্জিটেবিলিস্‌, গ্রাফাইটিন্‌, ল্যাকেসিস্‌, লাইকোপডিয়াম্‌, পাল্‌মেটোনা, রাস্‌-টেক্স্‌, সিাপিয়া, সাল্‌ফার এবং খুজার কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

**প্রতিষেধক ঔষধ ।** ক্যাম্‌ফা, হিপার-সাল্‌ফিউরস্‌ এবং ফ্লুরোরিক্‌ আসিড্‌ সাইলিসিয়ার প্রাতঃসেধক ঔষধ মধ্যে পরগণ্যত ।

**ডাইলুশন বিচার ।** ৬:২ এবং ৩০ ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কখন কখন ৩য় দশমিক ক্রমের শুঁড়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার হিউজ্‌ (Dr. Hughes) বলেন যে, কর্কট রোগের বেদনাদি নিবারণের জন্য ১ম এবং ২য় দশমিক ক্রমের শুঁড়া ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন । কোন কোন প্রকারের পুৰাতন রোগে এই ঔষধের ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় । ১ম দশমিক ক্রমের শুঁড়া, ১ গ্রেইন মাত্রায়, প্রাতঃদিন ৩ মাত্রা ব্যবস্থা করিয়া কএকটা বৎসর কাশাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় প্রচুর দর্শন এবং গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তে ছিটবৃত্ত পুঁথি নির্গমন নিবারণার্থ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে । নেত্র নালীর (Fistula Lachrymalis) চিকিৎসায় ২০০ ডাইলুশন ব্যবহারে ৩৪ টী রোগীর চিকিৎসায় আশাশ্রিত ফল পাওয়া গিয়াছে । আস্থর অসুখে ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রমের শুঁড়া, এক গ্রেইন মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় ।

## সাল্‌ফার, (গন্ধক)—সাল্‌ফ্‌।

(SULPHUR,—SULPH.)

কোন এক বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধানয় হইতে পরিকৃত গন্ধকের গুঁড়া (Flowers of Sulphur) ক্রয় করিয়া পরিশ্রুত জল বা ডিষ্টিল্ড ওয়াটার (Distilled water) দ্বারা থুইয়া বাতাসে শুকাইয়া যথা নিয়মে সূগার অব-  
মিষ্টের সঙ্গে মিশাইয়া ইহা ৩২ শততমিক ক্রম, পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া  
পাকে। ৩২ শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথানিয়মে ৪র্থ শততমিক  
ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথানিয়মে আব-সোলিউট  
আলকোহলে (Absolute alcohol) ইহার মূল আরোকও প্রস্তুত হইয়া  
পাকে। এই প্রকার প্রস্তুত কৰা আৰোককে টিংচুৰা সাল্‌ফিউরিস্‌ ফৰ্টিসিমা  
(Tinctura Sulphuris Fortissima) বলা হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্যাংগলিয়োনিক সায়ুনগুলীর (Ganghonic System of nerves) উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ প্রথমতঃ কৌশল শিবাগুলি অক্রিয় করিয়া ইহা শবাবের সমুদয় গভীরতম অংশও অক্রিয় করিয়া থাকে। ইহা কি প্রকারে এবং শরীরের কোন অংশ দিয়া কার্য্য করে, সে সম্বন্ধে আমরা যদিচ নিশ্চিৎরূপে কিছুই জ্ঞাত নহি, তথাপি মনুষ্য দেহে ইহাৰ আশ্চর্য্য কার্য্য কনতা সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা শরীরে এক প্রকার বাতুগত পুৰাতন আকারের রোগের আকর উৎপাদন করে, যাহার দরুণ শরীরের নানা অংশ বা স্বস্ত্রের নানা প্রকারের বিকৃতিবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। গায় এক বিশেষ প্রকৃতির চর্ম্ম বোগই উক্ত বিকৃতিবস্তার এক বিশেষ উদাহরণ মধ্যে পরিগণিত। চর্ম্মের উপর ইহার স্থানিক কার্য্যের দরুণ গায় ব্রণ, পূঁৰ বা জলপূৰ্ণ ব্রণ, ফোঙ্কার তায় ফুস্ফুড়ী, দাঁদের তায় ফুস্ফুড়ী এবং উধাতে অত্যন্ত চুল্কানি, এবং পূঁৰ পূৰ্ণ পাঁচড়া বা খোস এবং এষ্ট প্রকার অজ্ঞাত রকমের ফুস্ফুড়ী ইত্যাদি প্রকাশ পায়। লিম্ফেটিক গ্রন্থি (Lymphatic glands); লৈঙ্গিক কিল্লী, প্রধানতঃ চক্ষু, বায়ুনল, মূত্রনাগী এবং গুহের লৈঙ্গিক কিল্লী, পিত্তনিঃসারক বহু, প্রধানতঃ

হিমারয়েডেল্‌ শিরার (Hæmorrhoidal Veins) উপরও ইহার কার্য  
অতি প্রবল দেখিতে পাওয়া যায় ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । শুষ্ক বায়ু এবং সর্বদা দুঃখ এবং নিরাশার ভাব ও কান্দার  
ইচ্ছা (অরাম্‌, ইগ্নেস্‌, নেট্রাম্‌-মিউর, পাল্‌স্‌, প্লাটিনা, রাস্‌টক্স্‌) ; সর্বদা  
চিড়্‌ চিড়্‌, খিট্‌ খিট্‌ করা এবং বক্‌ বক্‌ করা ; সর্বদা রাগিয়া থাকা  
এবং ঝগড়া করার স্বভাব (ব্রাই, ক্যাম্‌, নাক্স্‌-বম্‌) ; শরীর এবং মন  
উভয়ের জড়তা এবং তদ্রূপ কাজ কর্ষ কবা, কথা বলা অথবা আশ্রয়  
প্রমোদ কিছুতেই মন নিবিষ্ট হয় না (নাক্স্‌-বম্‌, ফস্‌-আস্‌) ; সন্ধ্যার  
সময় মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং ভয় (ক্যাক্‌-কার্ক্‌, মার্ক্‌, রাস্‌টক্স্‌) ; শর্য  
এবং বিদ্যা বিষয়ে সর্বদা মন নিবিষ্ট করার ভাব (বিরেট্‌-আব্‌) ; মনের  
অস্থিরতা বা অস্বস্থতা এবং সকল বিষয়েই অনিচ্ছাপূর্বক তাড়াতাড়ি করা  
(সাল্‌ফ্‌-আস্‌) ; স্মরণ শক্তির দুর্বলতা বা হ্রাস (আনাকাড্‌, ক্রিয়াক্স্‌,  
ল্যাক্‌, নাক্স্‌-মফ্‌), মনুষ্যের নামই অধিক স্মরণ থাকে না ; অশ্রুমনক ভাব ;  
কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে বা কোন বিষয়ে মন স্থির ভাবে রাখিতে অশক্তি  
(ক্যাক্‌-কার্ক্‌, জেল্‌স্‌, নেট্রাম্‌-মিউর, ফস্‌-আস্‌, সিপিয়া) ; কোন বিষয়ে  
চিন্তা করাতে অশক্তি (হেলিবোরাস্‌, লরোস্‌, স্পাইজেল্‌) ; কথা বলিবার  
সময় মনের ভাব প্রকাশ করার অল্প উপযুক্ত শব্দ মনে হয় না (গ্রাফ্‌) ;  
অত্যন্ত ভ্রম (ক্রোকাশ্‌, ল্যাক্‌, থুজা) ।

মস্তক । মাথার গোলমেলে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা  
ঘোরা এবং এক গাছি ফিতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, কপালে সেরূপ  
কন্‌কনানি (ককিউলাস্‌, জেল্‌স্‌, মার্ক্‌, পাল্‌স্‌, স্পাইজেল্‌) ; মাথা ঘোরা ;  
বহির্বিষ্মতে চলিয়া বেড়াইলে মাথা ঘোরা (আর্জেন্ট্‌-নাইট্রিক্‌, ক্যাক্‌-কার্ক্‌,  
মোনয়েন্‌, সিপিয়া) ; মাথা হেট্‌ করিয়া উপড় হইলে মাথাঘোরা (একন্‌,  
বেল্‌, পাল্‌স্‌) ; বসি অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথা ঘোরা (বেল্‌, ব্রাই) ; নদী  
পার হওয়ার সময় মাথা ঘোরা (ফেরাম্‌) ; প্রাতঃকালে নাক দিয়া রক্ত  
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা (বেল্‌, ব্রাই) ; কপালে ভারি, পূর্ণ এবং চাপা-

বোধ ; মাথার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে দন্দপানি, উষ্ণ এবং চাপাবোধ (একন্, বেল্) ; মাথার চালিয়া ধরার জ্বায় বেদনা বা যাতনা, কপালের দুই পার্শ্বে এবং প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিলেই যাহা অধিক অনুভূত হয় ; মাথার হাড় আঘাত লাগিলে যেরূপ হয়, মস্তিষ্কে সেরূপ বেদনা বা যাতনা, নিজ্রাবেশ হইয়া ঝিমিলে, অথবা মাথা নাড়িলে যাহা অধিক অনুভূত হয় (আর্স্, নাক্স-মক্, হায়োস্, গ্লোনয়েন্) ; চলিবার সময় প্রত্যেক ধাপে (পা ফেলিতে) মাথায় বেদনা বা যাতনা অনুভূত হয় ; মাথা এবং চক্ষুর বাহির্দেশে স্থলী বিধানের জ্বায় বেদনা বা যাতনা ; মাথায় ডিডিয়া ফেলা, কসিয়া ধরা, ব্যাকি লাগা এবং হাতুড়ী মারার জ্বায় বেদনা বা যাতনা ; মাথার সমুখ ভাগে ভারিবোধ এবং চালিয়া ধরার জ্বায় বেদনা বা যাতনা, প্রাতঃকালে যাহা অধিক অনুভূত হয় (নাক্স-বম্) ; মাথা ধরা, বাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথার সমুখে একখানি তক্তা চাপা রহিয়াছে (একন্, বেল্, জেল্, স্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্) ; মাথার উপরিভাগে চাপিয়া ধরার জ্বায় বেদনা বা যাতনা, গাভার দরুণ মনে হয় যেন মস্তিষ্কের উপর কোন একটা ভারি পদার্থ চাপা রহিয়াছে (আলোজ্) ; বসিয়া থাকিলে মাথা ঘোরা ; মাথার উপরিভাগে অনবরত উষ্ণামুভব (গ্রাক্, নাক্স-মক্) ; প্রতি সপ্তাহে বা একমাস্তাহ অন্তর একমাস্তাহে বমন সম্বলিত শিরঃপীড়া (ফাইটোল্) ; মাথা, বিশেষতঃ মাথার উপরিভাগ, অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টটায় (চায়না, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, নেট্রান্-মিউর) ; মাথার অনেক চুল পড়িয়া যাওয়া (গ্রাক্, হিপ্-সালফ্, লাইকোপ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, ফস্, সিপিয়া) ; চুলের গোড়া স্পর্শনেও বেদনা বা যাতনা (চায়না, ফেরাম্) ; মাথার অত্যন্ত চুলকানি (কষ্ট্, কার্বোয়লিক্-আস্, গ্রাক্, সিপিয়া, সাইলিসি) ; মাথা এবং কপালে প্রদাহযুক্ত, বেদনায়ুক্ত এবং চুলকানি বিশিষ্ট ব্রণের জ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ী (হিপ্-সালফ্, সিপিয়া, সাইলিসি) ; মাথার অস্থির জোড় অনেক গোণে বদ্ধ হয় ; মাথায় কল্কতানি বিশিষ্ট, দুর্গন্ধযুক্ত পুঁথ এবং হরিদ্রা বর্ণের চুমটি সম্বলিত ফুসুড়ী যাহা চুলকায় এবং চুলকাইলে যাহা হইতে রক্ত পড়ে এবং জ্বালা করে (আর্স্, গ্রাক্, হিপ্-সালফ্, মার্ক্, সাইলিসি) ; মাথার শুষ্ক, চুলকানি বিশিষ্ট ফুসুড়ী ।

**চক্ষু ।** চক্ষু বা চক্ষুর পাতার প্রদাহ, এবং তদ্রূপ চক্ষুর বোজক ঝিল্লী ক্ষীত এবং লালবর্ণ ও উহাতে অত্যন্ত চুলকানি, জালা এবং চিড়িক মারা বা কড়্‌ কড়্‌ করা (আণ্টি-ফুড্‌, আর্জেন্ট্‌-নাইট্রিক্‌, ক্যাক্‌-কার্ক্‌, গ্রাফ্‌); ঝরের মধ্যে থাকিলে চক্ষুর শুষ্কতা এবং বহির্বায়ুতে গেলে চক্ষু দিয়া জল পড়া (পাল্‌স্‌); চক্ষুর অতিরিক্ত ব্যবহারের দরুন চক্ষুর রেটিনার প্রদাহ (Retinitis); অপটিক্‌ ন্যায়ুতে (Optic-nerve) রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; বালি, কঁাকর বা কয়লাদির গুঁড়া চক্ষের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার দরুন চক্ষের প্রবল প্রদাহ এবং তদ্রূপ উহাতে অত্যন্ত বেদনা বা যাতনা (একো-নাইট্‌ ব্যবহারের পর); বালির কণা প্রবিষ্ট হইলে বেক্রপ হয়, চক্ষুর পাতার নীচে সেক্রপ জালানুভব এবং তদ্রূপ চক্ষু রগড়ান (আস্‌, কষ্ট্‌, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, থুজা); রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা (ক্যাক্‌-কার্ক্‌, লাইকোপ্‌, মার্ক্‌, পাল্‌স্‌, রাস্‌টল্‌, সাইলিসি); চক্ষে খোঁচা বিঁধার জ্বা বেদনা বা যাতনা এবং ছুঁবী দিয়া কাঁটার জ্বা বা স্থলী বিঁধানের জ্বা বেদনা বা যাতনা, ডাইন চক্ষেই যাহা অধিক অন্তত হয়; কর্ণিয়া (Cornea) এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে ফোষ্কার জ্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ এবং ক্ষত (হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, নাইট্রিক্‌-আস্‌, সাইলিসি) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু লালবর্ণ হয়, চক্ষে আলোক সহ্য হয় না বা এবং চক্ষু দিয়া জল পড়ে; চক্ষুর পাতার ধারে ক্ষত (গ্রাফ্‌); সূর্যের আলোকের তেজ চক্ষে সহ্য হয় না বা চক্ষে অত্যন্ত লাগে (একন্‌, বেল্‌, গ্রাফ্‌, ইয়েস্‌, মার্ক্‌); চক্ষুর সম্মুখে একবাণি সরু বা পাতলা কাপড় রাখিলে বেক্রপ হয়, চক্ষে সেক্রপ বাপ্সা দেখা (ক্রোকাশ্‌, নেট্রাম্‌-মিউর, পিট্রোল্‌, ফস্‌, সিপিয়া, থুজা); চক্ষুর সম্মুখে কাল্‌চে দাগ ভাসে (আগারিকাশ্‌, চেলিডন্‌, ক্যালী-কার্ক্‌, মার্ক্‌, ফস্‌, সোরিনাম্‌, সিপিয়া, সাইলিসি); চক্ষু সম্মুখে পাখীর ডানা ঝাড়ার জ্বা ধড়্‌ ফড়্‌ করে; কর্ণিয়াতে ক্ষত এবং উহাতে দাগ পড়া (ল্যাক্‌, মার্ক্‌, সাইলিসি)।

**কর্ণ ।** গিলিবার সময় কানের মধ্যে বেদনা এবং চাপাবোধ; কানের মধ্যে খোঁচা বিঁধা বা কসিয়া ধরার জ্বা প্রবল বেদনা, যাহা কখন কখন গলার মধ্য এবং মাথা পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; বাম কানের মধ্যে স্থলী

বিধানের জায় বেদনা বা যাতনা (আস্, ক্যালী-বাই; ক্যালী-কার্ক্, কোনা-  
য়াস্, গ্রাফ্); কানের মধ্যে চুলকানি (বারাইটা-কার্ক্, হিপ্-সাল্‌ক্  
মার্ক্-বিন্); কানের মধ্যে সোঁ সোঁ, টনটন্ শব্দ হয় (চারনা, মার্ক্,  
সাইলিসি); কানে কন্ডুনা, যাহা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কানে কোনও শব্দ  
নহ্ন হয় না; কর্ণপ্রদাহ এবং কান দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত পূর্ব নির্গমন, বাম কানেই  
যাহা অধিক হয়; প্রতি অষ্টম দিবসে কান দিয়া শ্লেষ্মার জায় পদার্থ  
নির্গমন; শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের কান লাল হয়; জল  
থাকিলে বেক্রপ হয়, কানের মধ্যে সেক্রপ পোঁটা ছাড়ার জায় ভুট্‌ভাট্  
শব্দ হয়।

নাসিকা । নাসিকা ক্ষীত, লালবর্ণ এবং প্রদাহযুক্ত (বেল্, ফস্);  
তরল সর্দি এবং তদ্রূপ নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গমন  
এবং বারম্বার হাঁচি (একন্, সিপা, সাক্সুনেরিয়া); বহির্ব্যুত্রে নাক দিয়া  
জ্বালা উৎপাদক তরল শ্লেষ্মা নির্গমন এবং ঘরের মধ্যে থাকিলে নাক দিয়া  
শ্লেষ্মা নির্গমন একবারেই বন্ধ হয়; নাক কাড়িবার সময় নাক দিয়া রক্ত  
মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণের, পূর্ব  
মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন (ক্যাক্-কার্ক্, হাইড্রাঈ, পাল্‌স্); পুরাতন সর্দিতে  
যেক্রপ হয়, নাকে সেক্রপ দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মার সঞ্চার (পাল্‌স্); নাকের মধ্য  
শুকবোধ এবং ঘা থাকিলে যেক্রপ হয়, নাকের মধ্যে সেক্রপ চুলকানি  
এবং জ্বালা; নাক দিয়া রক্ত পড়া (বেল্, ফস্); শ্রাণশক্তির হ্রাস বা  
বিনাশ; নাকের মধ্যে শুকনা চুনটি (থোসা) বিশিষ্ট ঘা (সিপিয়া);  
নাকের উপর দিয়া আড়ে ঘোড়ার জিনের আকার বিশিষ্ট দাঁদের জায়  
ফুস্‌ফুসী।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল কিকা বা শিটা এবং অসহ্য যাতনার চিহ্ন-  
যুক্ত; চক্ষু বসিয়া যায় এবং নীলের রেখার জায় রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়  
(চারনা, ফস্, ক্যালী-আয়োড্); মুখমণ্ডলে উক এবং জ্বালামুতর  
এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল কালচে লালবর্ণ, অথবা গালের স্থানে  
স্থানে চক্রাকারের লাল দাগ পড়ে (ব্যাপ্‌ই); নাকের বেলায় অস্থিতে (Malar  
bone) চাপিয়া দয়া বা ছিড়িয়া ফেলার জায় বেদনা বা যাতনা; মুখমণ্ডল,



প্রধানতঃ কপাল, নাক, উপরের ওষ্ঠ এবং টুটিতে কাল দাগের জ্বার ফুসুড়ী বা তিল পড়া; ওষ্ঠ ক্ষীত, প্রধানতঃ উপরের ওষ্ঠ (বেল, ক্যাক্-কার্ক); ওষ্ঠ শুষ্ক; টুটির চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থানে বেদনাযুক্ত বা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ফুসুড়ী; ওষ্ঠের কোণে দাঁদের জ্বার ফুসুড়ী (আন্টি-ক্রুড্, আস্); নিম্ন মাড়ির নিকটবর্তী গ্রন্থির ক্ষীতি এবং উহাতে কসিয়া ধরা বা হঠাৎ ধাক্কা লাগার জ্বার বেদনা ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁতের গোড়ায় কসিয়া ধরা, বা ছিড়িয়া ফেলার জ্বার, অথবা দপ্‌দপিয়া বেদনা; বহির্বিয়ুতে বা সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই দাঁতের গোড়ায় বেদনা (চায়না); ঠাণ্ডা জল লাগিলেই দাঁতের গোড়ায় বেদনা (আন্টি-ক্রুড্, ক্যাক্-কার্ক, কোকাস্, ষ্টাকিস্); সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে দাঁতের গোড়ায় বেদনা; দাঁতের গোড়া ক্ষীত এবং উহাতে দপ্‌দপিয়া বেদনা; মুখে তিক্ত স্বাদ (ব্রাই, চারনা, কলোস্, নীক্স-বম্, পাল্‌স্); মুখে কহিয়ের জ্বার স্বাদ; মুখে হর্গক এবং মিষ্ট স্বাদ (আস্, ব্রাই, মার্ক্, প্রাষাম্); মুখে ধাতুর স্বাদ (ইক্সুলাস্, ককিউগাস্, মার্ক্, নেজা); প্রাতঃকালে মুখে বিষাদ; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত এবং উহার পার্শ্ব ও অগ্রভাগ লালবর্ণ (যেমন অনেকা-নেক তরুণ প্রবল রোগে হইয়া থাকে); মুখগহ্বর এবং জিহ্বায় ফোকা পড়া (বোরাক্স্, নাইট্রিক্-আস্, নাক্স-বম্); মুখগহ্বর, জিহ্বা এবং তালুকা অত্যন্ত শুষ্ক এবং উহান সঙ্কে সঙ্কে অত্যন্ত প্রবল পিপাসা (আস্); প্রাতঃ-কালে মুখ শুষ্ক, স্বাদশূন্য এবং চট্‌চটিয়া; মুখে টকস্বাদ বা হর্গক, প্রাতঃকালে এবং আহাবের পরই যাহা অধিক অনুভূত হয়; মুখে প্রচুর লালের সঞ্চার (মার্ক্); মুখে রক্ত মিশ্রিত লালের সঞ্চার (নাইট্রিক্-আস্); মুখে লোন্‌তা লালের সঞ্চার (আন্টি-ক্রুড্, মার্ক্-কব, ফন্‌)। গলার মধ্যে খশ্‌খশে এবং শুষ্কানুভব এবং ছাল উঠিয়া গেলে যেরূপ হয়, সেরূপ অনুভূত হয়, চাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ অস্বস্তি বোধ; বারম্বার থেকুর দিয়া গলার মধ্যে পরিষ্কার করার ইচ্ছা (আমন্-কার্ক্, কার্কো-বেজ্, ফন্‌); গলার মধ্যে ক্ষত এবং তদ্রূপ উহাতে অত্যন্ত জ্বালা এবং শুষ্ক-অনুভব; যন্ত্রণাদি ডাইন পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে বিস্তৃত হয়; গিলিবায়

সময় গলার মধ্যে স্থী বিধানের জ্বায় বেদনা (আলাম্, আর্জেন্ট-নাইট্রিক্); একটা গোলার জ্বায় পদার্থ নিম্নদিক হইতে গলার মধ্যে উঠিয়া গলনালীর উপরিভাগ যেন রুদ্ধ করে, যাহার দরুণ নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় (আসাকিটিডা, লাইকোপ); গিলিবাব সময় গলার মধ্যের অত্যন্ত কষ্টদারক সঙ্কোচন (বেল্, প্লাসাম্); কর্ণ মূল এবং নিম্ন মাড়ির নিম্ন ভাগস্থিত গ্রন্থির ক্ষীতি এবং উহাতে স্থী বিধানের জ্বায় বেদনা বা বাতনা; ডেলার জ্বায় কোন একটা পদার্থ লাগিয়া থাকিলে ঘেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেকরূপ চাপা বোধ (গ্রাক্, হিপ্-সাল্‌ক্, ইগ্নেস্, ল্যাক্, নাক্স-বম্); গলার মধ্যে যেন এক গাছি চুল লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত ভুট্‌ক্ষুধা, যাহার দরুণ রোগী বার-বার খাইতে বাধ্য হয়, অথবা আহারে ইচ্ছা একবারেই থাকে না (আলাম্, আর্স্, চায়না, প্লাসাম্); অনবরত পিপাসা; রোগীর পেটে দুধ সহ্য হয় না এবং দুধ খাইলেই পেটে অস্থখ বা বাতনার উদ্রেক হয় (কার্বো-বেজ্), সুখ দিয়া জল উঠা (নেট্রাম্-কার্ব্); প্রাতঃকালে এবং আহারের পর মুখদিয়া জল উঠা (আর্স্, নাক্স-বম্); টক বা কাঠ উদগার উঠা, বাহা প্রাতঃকালে এবং আহারের পরই অধিক হয় (আম্‌লা, ব্রাই, কার্বো-বেজ্, নাক্স-বম্, ফস্); পাকস্থলীতে জ্বালানুভব (আর্স্, ক্যাস্, আইরিস্, লোবিলিয়া, মেজিরিয়াম্); প্রাতঃকালে বমনোদ্বগ, পেট গুলিয়া উঠা (ক্যাক্-কার্ব্, নাক্স-বম্, পাল্‌স্); আহারের পূর্বে এবং মলত্যাগের সময় বমনোদ্বগ এবং পেট মোচড়াইয়া বা গুলিয়া উঠা; প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময় এবং আহারের পর উদরস্থ আহার দ্রব্য বা টক পদার্থ বমন; সামান্য পরিমাণে আহার জ্বা উদরস্থ হইলেই পাকস্থলীতে পূর্ব বোধ হয় (চায়না, লেডাম্, লাইকোপ); পাকস্থলীতে একবারে খালি এবং অসাড় বোধ (সিমিসিফ্, হাইড্রাষ্ট্, ইগ্নেস্, পিট্রোল্, পাল্‌স্, সিপিয়া); পূর্কাক ১১ টার সময় পাকস্থলীতে উক্ত প্রকার অনুভূত হওয়া; পাকস্থলীতে ভারি এবং চাপাবোধ; আহারের পর পাকস্থলীতে ভারি এবং চাপাবোধ (আর্স্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্); পাকস্থলীর উপর এবং মধ্যদেশে স্থী বিধানের জ্বায় বেদনা বা বাতনা; যকৃত প্রদেশে স্থী বিধা-

নের ত্রায় বা ধুশ্‌ঘুশে বেদনা বা যাতনা (একন্, আর্স্, ব্রাই, ক্যাক্স-কার্ক্, চেলিডন্, চায়না, ক্যালী-কার্ক্, মার্ক্, নাক্স-বম্, সিপিয়া); যকৃতের ক্ষীতি এবং কঠিনতা (চায়না, ফস্); প্রাতঃকালে হুই পার্শ্বেই টাটানি বাহ্যে স্পর্শ করিলেও অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; প্লাহা প্রদেশে স্থলী বিধানের ত্রায় বেদনা বা যাতনা (নেট্রাম্-কার্ক্, নেট্রাম্-মিউর); দীর্ঘ নিশ্বাস প্রথমে উদরের বাম দিকে বেদনা; নাভিপ্রদেশে কানডানীর ত্রায় বেদনা বা যাতনা, গুহ দ্বার দিবা দূষিত বায়ুনিঃসরণে যাহার উপশম হয় (কার্কো-বেজ্, চায়না, গ্রাক্); উদরের মধ্যে গড়্‌গড়্, কল কল শব্দ হয় (আগারিকাশ্, আলোজ্, লাইকোপ্, জিঙ্ক্); অস্ত্রে দূষিত বায়ু রুদ্ধ হইয়া থাকিলে বেক্রপ হয়, উদরে সেক্রপ পূর্ব এবং কসিয়া ধরার ত্রায় অহুভূত হয় (কার্কো-বেজ্, চায়না, লাইকোপ্, ক্যালীকার্ক্, ফস্); গুহ দ্বার দিবা প্রচুর পরিমাণে পচা ডিমের ত্রায় গুরুযুক্ত বায়ু নিঃসরণ (আর্বিকা); পেটকামড়ানী, হাঁটু জুটাইয়া জড় সড় হইলে বাহার উপশম হয় (আলোজ্, কলোস্, আইরিস্, নাক্স-বম্, রুম্); উদরে গুহ দ্বারের দিকে ঠেলিয়া নামার ত্রায় চাপাবোধ; স্পর্শনে উদর অত্যন্ত টাটায় (একন্, বেল্, কুথ্রাম্, মার্ক্); জীবিত কোল প্রাণী বা পদার্থ নড়িতেছে, উদরের মধ্যে এক্রপ অহুভূত হয় (কোকোশ্, সাবাইনা, থুজা)।

মল এবং মলদ্বার । মলত্যাগের সময় গুহে আলা এবং চাপাবোধ; মলত্যাগের পর গুহদ্বারে আলাহুভব (নেট্রাম্-আর্স্); গুহের মধ্যে স্থলী বিধান বা হড়্‌হড়্‌ করার ত্রায় যাতনা, এই যাতনা সন্ধ্যার সময়ই অধিক অহুভূত হয়; গুহ এবং গুহ দ্বারে ভয়ানক চুল্কানি (কঠ্, নাক্স-বম্, সাইলিসি); বারবার বাহের বেগ হয়, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না (আম্ব্রা, কোনাগাম্, নেট্রাম্-কার্ক্, নাক্স-বম্, সাইলিসি); শ্লেষ্মিক; অন্ধ এবং রক্তস্রাবক অর্শরোগ (Mucous, Blind and Bleeding Piles); রাজি দুইপ্রহরের কএক ঘণ্টা পর উদরানয়, অথবা প্রাতঃকালে বাহের এক বেগ হয় যে উহার দরুণ রোগী বিছানা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি পায়খানায় যাইতে বাধ্য হয় (আগারিকাশ্, আলোজ্, ডিসিয়া, নেট্রাম্, আর্স্, রুমেক্স্, পডোফ্); আমাশয়ের মলের ত্রায় মল ত্যাগ এবং উহার সঙ্গে

সঙ্গে পেটকামড়ানী বা শূল বেদনা; বারম্বার কষ্টদায়ক কৌণপাড়া (মার্ক্, নাস্ত্রাম্), রাত্রিতে যাহা অধিক হয়; মল জলবৎ তরল, ফেণাযুক্ত, সবুজ অথবা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা; মল ঘোলাটিয়া, সবুজের আভাযুক্ত, হরিদ্রাবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত; মল চট্‌চটিয়া আঠা এবং ক্ষতকারক (আস্, মার্ক্); অসাড়ে ভেদ (আস্); কোষ্ঠবদ্ধ এবং মল অত্যন্ত কঠিন (ব্রাই), পরিমাণে অল্প এবং অতি কষ্টে নির্গত হয়; মল কঠিন শুটলে এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না (আলাম, গ্রাক্, আরোড্, সিপিথা); মল জলবৎ তরল, সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা, উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল—অর্থাৎ একবার যে প্রকার দান্ত হয়, অপসরণের সেক্ষণে হয় না; দান্তের পূর্বে উদবে কর্তনবৎ বেদনা বা বাতনা; দান্তের পর্ব অত্যন্ত কষ্টদায়ক কৌণপাড়া বা শুলানি; মলের সঙ্গে লম্বা গোল কুনি এবং সূত্রবৎ ক্ষুদ্র কুনি পড়ে (সিনা, ইগ্নেস্, মার্ক্, স্পাইজেল্); মলত্যাগের সময় শুষ্ক বাহির হইয়া পড়ে।

মূত্রে যন্ত্র । মূত্রাবরোধ (একন্, বেল্); বারম্বার এবং হঠাৎ মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, প্রাধান্য: রাত্রিতে, এবং প্রচুর পরিমাণে মূত্র ত্যাগ; রাত্রিতে যন্ত্রে মূত্র ত্যাগ (অর্গিকা, কষ্ট্, কুপ্রাম্, গ্রাক্, পাল্‌স্); মূত্রনালীতে জ্বালা; মূত্র ত্যাগের সময় মূত্র নালীতে জ্বালা (আস্, ক্যান্‌স্, ক্যানাবিস্-স্যাট্, কোনায়াম্); মূত্র নালাতে সূঁচী বা খেঁচা বিধানের দ্বারা বেদনা বা বাতনা; মূত্র নালীতে চুলকানি; মূত্র থামিয়া থামিয়া নির্গত হয় (Intermittent), অথবা স্বাভাবিক অপেক্ষা সৰুধারে মূত্র নির্গমন; মূত্র ঘোলাটিয়া (অটি-টাট্, বেল্); মূত্র লালচে, দুর্গন্ধযুক্ত (ক্যান্‌স্-কার্ক্, জিগ্‌জ্) এবং ক্ষত কারক (মার্ক্); মূত্র কখন পরিষ্কার, কখন বা গাঢ় তলানি বিশিষ্ট।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক ষাট্ নিঃসরণ (চারনা, ফস্-আস্); পুরুষাঙ্গ ঠাণ্ডা; স্ত্রীসহবাসের শক্তির অত্যন্ত হ্রাস বা হ্রাসলতা (আগ্‌নাস্, বাবে'রিন্, ক্যাপ্‌স্); স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছার অত্যন্ত বৃদ্ধি (ফস্); পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চৰ্ম্ম (Prepuce) প্রদাহযুক্ত এবং ক্ষীণ, লালবর্ণ এবং জ্বালাযুক্ত ও উহা খোলা যায় না (Phimosis) এবং গভীর ক্ষতযুক্ত; পুরুষাঙ্গে সূঁচী বিধানের দ্বারা বাতনা অগ্ৰভূত হয়; পুরুষাঙ্গের মাথার চুলকানি (মেজিরিয়াম্); অণ্ডকোষ শিথিল হয় (ক্যান্‌ফার) এবং

কুলিয়া পড়ে (ক্রিমিটস); জননেদ্রিয়ে হৃগন্ধযুক্ত বর্ষ; অণ্ডকোষাধারে ক্ত এবং উহা কল্‌জানি দ্বারা সর্বদা ভিজা থাকে (পিটোন্); জীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে, প্রচুর পরিমাণে, কিন্তু অল্পকাল স্থায়ী, রজঃস্রাব; নিয়মিত সময়ের অনেক পর রজঃস্রাব; বজঃবোধ (সিমিসিক্, পাল্‌স); গাঢ়, কাল্‌চে এবং ক্ষতকারক রজঃস্রাব (আমন-কার্ক); রজঃস্রাবের সময় মাথা ধরা এবং নাক দিয়া রক্ত পড়া (ব্রাই, হানামেলিস); পাকস্থলীর মধ্যে চাপাচ্যুদ; রজঃস্রাবের পূর্বে মাথা ধরা; নিয়মিত সময়ের অনেক পর অত্যন্ত কষ্টকর রজঃস্রাব ও বাবকের বেদনা (Painful Menstruation) (পাল্‌স); প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রাব আভাবুক্ত, ক্ষতকারক শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ (আস্, সিপিগা); ঘোনি দ্বাবে জালাহুভব, বাহার দরুণ রোগী কোন মতেই স্থিতি থাকিতে পাবে না; জননেদ্রিয়ে কষ্টদায়ক চুলকানি এবং উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের জ্বাব কুস্কড়ী (মার্ক); স্তনের বিশপের জ্বায় (Erysipelatous) প্রদাহ (বাস্টক্স); স্তন লালবর্ণ, উষ্ণ, কঠিন এবং উহার ঘোটা হইতে গোড়া পর্যন্ত লাল রেখা পড়ে ও উহাতে স্থতী বিধানের জ্বায় বেদনা বা যাতনা বর্জনান থাকে।

শ্বাস যন্তু । স্বরভঙ্গ এবং স্বর কর্কশ, প্রধানতঃ প্রাতঃকালে; স্বর-শূন্যতা (কার্কো-বেজ্, কষ্ট, ফস্); গলার মধ্যে থশ্ থশে এবং চাঁচিয়া ফেলার জ্বায় অল্পভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে শ্লেষ্মার সঞ্চার, বাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয় (ক্যাম্, নাক্স-বম্); কথা বলিলে (ড্রিসিয়া) অথবা চলিয়া বেড়াইলে শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয়; শ্বাসকষ্ট; অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বা যাতনা (একন্, আস্, পাল্‌স); বারম্বার শ্বাসরোধ হইয়া ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়া, যাহা রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে অধিক হয়; রোগী ঘরের দরজা, জানলা খুলিয়া রাখিতে চাহে (আস্, কার্কো-বেজ্, ব্যাপ্ট); সন্ধ্যার সময় বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে, অথবা ঘুম ভাঙ্গিলে বা রাত্রিতে শুক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ, গলার মধ্যে শুকাহুভব এবং নাক দিয়া তরল শ্লেষ্মা নির্গমন; কণ্ঠস্থায়ী, প্রবল শুক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বক্ষাস্থিতে বেদনা বা বৃকে স্থতী বিধানের জ্বায় বেদনা বা যাতনা; কণ্ঠনাগীতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বায় অল্পভূত হওয়ার দরুণ

কাশি (কস্, কমেস্) ; বৃকে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; কথা বলিবার সময় বৃকে অত্যন্ত দুর্বলবোধ (কার্কো-বেজ্, ষ্ট্রানাম) ; সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া থাকিলে বৃকে দুর্বলবোধ ; মোচ্‌ড়াইয়া পড়িলে বা থেঁতলিয়া গেলে যেক্রপ হয়, বৃকে সেক্রপ বেদনা বা যাতনা ; বৃকে আঁটাবোধ ; বৃকে ষাটিয়া বা কসিয়া ধরার জ্বায় যাতনা ; বৃকে স্ত্রী বিধানের জ্বায় বেদনা বা যাতনা, যাহা পৃষ্ঠদেশ এবং বাম দক্ষাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (কালী-কার্ক, মার্ক), শ্বাস প্রশ্বাস এবং নড়া চড়াতে (ব্রাই), অথবা চীতৃ হইয়া শয়ন করিলে যাহা বৃদ্ধি পায় ; বৃকে জালাহুভব বাহা মুগমগুল পর্য্যন্তও অন্তৃত হয় ; ফুফুস প্রদাহের পর ফুফুসে দূষিত পদার্থের সঞ্চাব ; কাশি এবং গলা দিয়া সবুজের আভাবুক্ত পুঁথ মিশ্রিত, মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন (ষ্ট্রানাম) ; ফুফুসেব মধ্যে শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড়ঘড়ী ; প্রাতঃকালে কাশির বৃদ্ধি (আন্টি-টাট) ও বৃকে ভারিবোধ (ক্রিয়াজ্, ল্যাক্, লাইকোপ্, নাক্স-মক্) ।

জংপিণ্ড এবং নাড়ী । জংস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত যাতনা ; (একন্, আস্, স্পাইজেন্, বিরেট্-আব্) ; রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে এবং কোন উচ্চ স্থানে উঠিবার সময় জংস্পন্দন ; নাড়ী পূর্ণ, কঠিন এবং দ্রুতগামী (একন্, বেল্) ; জংপিণ্ড স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় বলিয়া অনুভূত হয় ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠ দেশ । ঘাড় এবং পৃষ্ঠ দেশ শক্ত হয় বা উঠা নোয়ান যায় না ; মেরুদণ্ডের গ্রীবাদেশস্থ অংশের হাড় কেড়্ কেড়্ শব্দ হয়, পশ্চাৎ দিকে হাড় বাঁকা করিলেই বাহা অধিক শুনিতে পাওয়া যায় ; ঘাড়ে কসিয়া ধরা বা স্ত্রী বিধানের জ্বায় বেদনা বা যাতনা ; নড়া চড়া বা শয়ন করিয়া থাকা কালীন দুই স্বক্কেব মধ্যবর্তী স্থানে ষাটিয়া ধরার জ্বায় বেদনা বা যাতনা ; থেতলিয়া গেলে বা মোচ্‌ড়াইয়া পড়িলে যেক্রপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেক্রপ বেদনা বা যাতনা (পাল্‌স্, রাস্টেন্) ; কোমরের পশ্চাৎভাগে মোচ্‌ড়াইয়া পড়া বা থেতলিয়া যাওয়ায় জ্বায় প্রবল বেদনা বা যাতনা (কুপ্‌রাম্) ; শুষ্কহারের উপরিভাগে উক্ত প্রকারেব বেদনা বা যাতনা, মাথা ঠেট করিয়া উপুড় হইলে বা বসি অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে বাহার উল্লেখ হয় (রাস্টেন্) ; দক্ষাস্থি,

পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরের পশ্চাৎ ভাগে স্থলী বিধানের ভ্রায় বেদনা বা বাতনা; মেরুদণ্ডের বক্রতা (Spinal-curvature) এবং উহার কোমলতা (সাইলিসি); একখানি হাড়ের উপর অন্য একখানি হাড় গড়াইয়া গেলে যেরূপ হয়, মেরুদণ্ডে সেরূপ অন্তর্ভূত হয়।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের, প্রধানতঃ হাত পায়ের পাতার, দুর্বলতা এবং কাঁপনি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কিঁ কিঁ ধরা (সিপিয়া, সাইলিসি), শয়ন করিয়া থাকিলেই বাহ্য অধিক হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে থেঁতলিয়া যাওয়া, মোচড়াইয়া পড়া, কসিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার ভ্রায় বেদনা বা বাতনা (বাই, কলোস্, লেডাম্, লাইকোপ্, মার্ক্)। বাম স্বক, বাহু এবং হাতের আঙ্গুলে বাত রোগের কসিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার ভ্রায় বেদনা বা বাতনা; বাহুর উপরি ভাগে দুর্বল এবং ক্রান্তিবোধ; বোঁগলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট বমনোৎপাদক ঘন্থ; হাতের পাতার তালুতে অত্যন্ত জ্বালাবুত্ব (ল্যাক্); হাতের চর্ম কঠিন, শুষ্ক এবং কাটাযুক্ত (নেট্রিম্-মিউর); হাতের নখ সম্মুখ পানে বাঁকিয়া পড়ে (নেট্রিম্-মিউর, থুজা); আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ভ্রায় ঘা এবং লালবর্ণ হয়; আঙ্গুলে অবশবোধ। চলিয়া বেড়ানোর সময় নিম্নাঙ্গের দুর্বলতা এবং উহাতে অবশবোধ; কুঁচকির সন্ধিতে খোঁচা বিঁচা ভ্রায় প্রবল বেদনা বা বাতনা, নড়া চড়া বা স্পর্শনে বাহ্য বৃদ্ধি হয় এবং বাহ্য দরুণ বিছানা হইতে উঠিবার শক্তি থাকে না; উক্ত দেশেব পেশীতে খিল ধরা বা কসিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা বা বাতনা; হাঁটু এবং পায়ের পাতার সন্ধি শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; সঙ্কুচিত হইলে যেরূপ হয়, পা বাড়াইবার সময় হাঁটুর, পশ্চাৎভাগের গর্ভের ভ্রায় অংশে অংশে সেরূপ কসিয়া ধরার ভ্রায় অন্তর্ভূত হয়; হাঁটু, পায়ের ডিম এবং পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক অস্থিতে বাটিয়া ধরা; পায়ের ডিম এবং পাতার নীচে খিল ধরা (কার্কো-বেজ্), রাত্রিতেই বাহ্য অধিক অন্তর্ভূত হয় (ক্যাক্-কার্ক্, ক্যাম্কার, ক্যাম্, ফেরাম্, নাক্স-বম্, নাইট্রিক্-অ্যাম্, সাইলিসি); পায়ের পাতার তলায় জ্বালা (ক্যাক্-কার্ক্, সাইলিসি, ল্যাক্), বাহ্য দরুণ পায় কাপড় রাখিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় (ক্যাম্); পায়ের আঙ্গুলে কড়া (Corn)

এবং উহাতে কল্তানি ও বাটিয়া ধরার ছায় বেদনা বা যাতনা; পায়ের পাতা, প্রধানতঃ উহার তলা, ঠাণ্ডা ।

**চর্ম ।** শরীরের নানা স্থানে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দী এবং তদ্রূপ ব্যাঞ্চার সহিত চুলকানি এবং চুলকাইলে উহাতে অত্যন্ত জ্বালা এবং টাটানির উদ্রেক হওয়া (কার্বোলিক-অ্যাস্); ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের ছায় জলপূর্ণ ফোঁকা এবং দাঁদেব ছায় কুসুড়া ও উহাতে অত্যন্ত চুলকানি এবং জ্বালা (ক্রোইট্, মার্ক্, বাস্টল্); পায় চুলকানী, বিছানার উষ্ণাভে বাহ্য উপশম হব (আলাম্, মার্ক্, মের্জিবিসাম্, পাল্‌স্); চর্ম শুষ্ক, খশ্ খশে এবং মরা চর্ম বিশিষ্ট; নামাত্ত কাটিলে বা ঘা হইলেই আক্রান্ত স্থানে পুঁথ হা (বোরাক্, ক্যাম্, ক্যাক্-ফার্স্, হিপ্-সালক্, গ্রাক্, সাইলিসি); চর্মের ভাজে ভাজে হাল উঠিয়া যাওয়ার ছায় হইয়া ক্ষত হয় (গ্রাক্, হাইড্রাঠি, ইগ্‌নেস্, লাইকোপ্, মার্ক্); উঁচু এবং ক্ষীত ধাব বিশিষ্ট ক্ষত এবং উহা হইতে সহজেই রক্ত পড়ে, (খাসাফিটিজা, মার্ক্, মেজেরিসাম্) এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের ছায় কুসুড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত, বাহ্য হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁথ পড়ে; পুরাতন ঘা এবং উহাতে মাংস বৃদ্ধি হয় (গ্রাক্, সাঙ্গুনেরিসা, সাইলিসি) ।

**নিদ্রা ।** দিনের বেলা গুমালিবার অনিবার্য ইচ্ছা (মার্টি-টার্ট্, এপিস্, নাক্স-মরু) এবং প্রায় সমুদয় রাত্রিতে জাগিয়া থাকা (লাইকোপ্, মার্ক্); অস্থির নিদ্রা এবং বারম্বার জাগিয়া উঠা; গুম হওয়া হওয়া সময়ে চমকিয়া উঠা (অ্যাস্, বেল্, হাবোস্); গুমেরদ্বারা ভয় এবং চিন্তা উৎপাদক স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা (আর্বিকা, অদান্, পাল্‌স্); গুমেরদ্বারা অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা (বেল্, নেট্রাম্ নিউট, সিপিবা); গুমের দ্বারা শরীরের নানা স্থানের কাকনি এবং স্পন্দন ।

**জ্বর ।** সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া থাকিলে শীত বোধ, তৎপর শরীর উষ্ণ হইয়া তৎপর ঘর্ম হওয়া; বারম্বার আভ্যন্তরিক শীতবোধ, কিন্তু পিপাসা থাকে না (পাল্‌স্); শীত যেন হামাদিরা বা স্বচ্ছন্দ করিয়া পৃষ্ঠ দেশের নিম্নদিক হইতে উপরের দিকে উঠে; শীত এবং অর; প্রতিক্রিয়া না হইয়া রোগী নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে; অপরাহ্ন বা সন্ধ্যার সময় শরীর উষ্ণ



এবং শুষ্ক এবং উষ্ণর সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা ; বারবার দম্‌কা উঠাছুত্তব, কখন কখন শরীরে সামান্য ঘর্ষ বা মুচ্ছার ভাব হইয়া বাহার শেষ হয় ; প্রাতঃকালে ঘর্ষ, ঘুম ভাঙ্গিলেই যাহাব আরম্ভ হয় (সিপিয়া) ; রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ষ (চারনা, ফ্‌স্‌, সাইলিসি, ফ্‌স্‌-আস্‌) ; সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ষ হয় (আস্‌হা, ক্যাক্‌-কার্ক্‌, হিপ্‌-সাল্‌ক্‌, ফ্‌স্‌, সাইলিসি) ; শীতলাবস্থার পূর্বেও পিপাসা (সাইমেক্‌, ইউপেট-পাক্‌) ; সন্ধ্যার সময় শীত, তৎপন্ন শরীর উষ্ণ এবং অবশেষে প্রচুর ঘর্ষ (আস্‌, বেল্‌, রাস্‌টক্‌) ; পূর্বাহ্ন ১০ টার সময় শীত আরম্ভ হইয়া অপরাহ্ন ৩টা পর্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে ।

ব্যবহার । গণ্ডমালা (Scrofula) এবং অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশ জনিত অস্থখ (Rachitis) ; কোইনাইন বা পারার অপব্যবহার জনিত রোগ ; খোস পাঁচড়া ; চর্ম্মে ফোকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ এবং দাঁদের ছায় ফুস্‌ড়ী ; ক্ষত ; ফোড়া ; বিসর্প বা ইরিসিপেলান্‌ (Erysipelas) ; গ্রন্থির প্রদাহ, শ্লেতি এবং উহাতে পূর্ব হওয়া ; শোথ ; পেশী এবং বৃহৎ সন্ধি বাত ; ক্ষুদ্র সন্ধিবাত বা গাউট্‌ (Gout) ; মৃগীবোগ ; চক্ষুপ্রদাহ ; শ্লেয়া জনিত রোগ ; পাকস্থলী এবং বকৃতের অস্থখ ; উদরানয় ; কোষ্ঠবদ্ধ ; অর্শ ; হাঁপানি কাশি ; ছপিং কফ বা কাশি (Hooping Cough) ; ফুফুস প্রদাহ ; ফক্ষাশ ; রজঃরোধ ; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation) ; স্বেত প্রদব ; মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) ; পুরুষা-স্বেব মাথা প্রবাহিত হইয়া উষ্ণর আবরক চর্ম্ম (Prepuce) খোলা যায় না (Phimosis) ; প্রমেহ বোগ ; অর-বিকার এবং পূর্বাদি রসক্ষয় জনিত জ্বর বা হেক্‌টিক্‌ ফিবার (Hectic-fever) ; পুরাতন আকারের স্থানিক প্রদাহ ; হস্তমৈথুন বা অতিরিক্ত স্রাবজনিত দুর্বলতা হেতু অস্থখ ; গায় পুরাতন আকারের ফুস্‌ড়ী ; নাগী ঘা ; রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া থাকার চায় আপন কাজ কর্ম্ম করা বা চলিয়া বেড়ান (Somnambulism) ; শিরঃশীড়া ; তরল, শুষ্ক তরুণ এবং পুাতন সন্ধি ; মুখের মধ্যে ঘা ; আহারে অনিবার্য্য অকুচি ; পাকস্থলীতে বেদনা ; সর্বদা মদ্যপানের ইচ্ছা ; বকৃতের পুরাতন আকারের অস্থখ ; দূষিত বায়ুজনিত আক্ষেপিক শূল বেদনা ; উদরী (Ascites) ; গণ্ডমালা বা পারার অপব্যবহার

জনিত বাগী (Buboes); বহুমূত্র; রক্ত মূত্র ত্যাগ; হাতের কাঁপনি; কম্পন বিশিষ্ট পক্ষাঘাত (Paralysis Agitans) ইত্যাদি অসুখে সাল্‌ফার ব্যবহার্য্য ।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।** শরীর শীর্ণ এবং লম্বা এবং মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া চলা; অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ হওয়া; অত্যন্ত দুর্বলতা এবং শরীরের কাঁপনি (আলাম্, চায়না), ক্রান্তি বোধ এবং বলহীন; ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য হয় না এবং সামান্য কারণেই সর্দি লাগে; হাত কাঁপে; মাথার ঠিক উপরিভাগে সর্বদা উষ্ণাভাব; শরীরের নানা স্থানের গ্রন্থির ক্ষীতি এবং কঠিনতা এবং উহাতে পূঁথ হওয়া; প্রত্যহ শরীর মর্দন করিয়া স্নান করিলেও গায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ; কথা বলিলেই বেদনা যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি; সমুদয় শরীরের বারম্বার আক্ষেপিক স্পন্দন বা কাঁকনি; আক্ষেপের পর, রোগী আপনাকে আপনি অত্যন্ত স্নহ মনে করে; পূর্বাহ্ন ১১টার সময় অত্যন্ত দুর্বলতা বা অবসন্নতা, যাহার দরুণ রোগী কিছু না খাইয়া থাকিতে পারে না; সন্ধ্যার সময়, রাত্রি ৩ই প্রহরের পর, বিশ্রাম কালীন, দাঁড়াইলে, স্পর্শনে, গা মুছাইলে বা স্নান করিলে এবং বহির্বাযুতে অসুখের বৃদ্ধি; নড়া চড়া বা বেড়াইলে অসুখের উপশম ইত্যাদি সাল্‌ফারের কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ ।** সাল্‌ফারের কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক এবং সিপিয়ার কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে বেলেডোনা, কল্‌চিকাম্, চায়না, আরোডিন্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াম্, নাইট্রিক্‌ আসিড্, নাক্‌ বমিকা, সোরিনাম্, পাল্‌সেটিল্লা, রাস্‌টক্স, সাইলিসিয়াব কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

**প্রতিষেধক ঔষধ ।** একোনাইট্, ক্যান্‌ফার, ক্যামোমিলা, চায়না, মার্কিউরিয়াম্, পাল্‌সেটিল্লা, রাস্‌টক্স, সিপিয়া ইত্যাদি সাল্‌ফারের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

**ডাইলুশন বিচার ।** ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ৬ষ্ঠ ডাইলুশনও কোন কোন চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া থাকেন । ডাক্তার হিউজেস (Dr. Hughes) মতে বাত রোগ

এবং ইপানি কাশিতে নিম্ন ক্রমের গুঁড়া ( ১ম, ২য় বা ৩য় ) ব্যবহার্য্য ।  
লেখক স্বয়ং ৩০ ক্রমই সচরাচর, অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন ।  
পারার অপব্যবহার জনিত চর্ম্মরোগে ১ম, ২য়, ৩য় ক্রমের গুঁড়া, ১  
গ্রেইন মাত্রায় ব্যবহারে অনেক সময় বিশেষ ফল পাওয়া যায় । অনেক  
কালের পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগ, শ্বেত প্রদর, পারার অপব্যবহার  
জনিত চর্ম্ম রোগ, চক্ষু প্রদাহ, পুরাতন আকারের মস্তিস্করোগে ২০০  
ডাইনুশন দ্বারা অনেক সময় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায় ।

### বিরেট্রাম্-আল্‌বাম্,-বিরেট্-আল্‌ব্ ।

(VERATRUM ALBUM,—VERAT. ALB.)

ইউরোপের আল্প্‌স্ ইত্যাদি পর্ব্বতে এই গাছ জন্মে । ফুল ফুটিবার  
পূর্বে এই গাছের মূল লইয়া যথা নিয়মে উহা প্রক্‌স্পিরিটে (Proof spirit)  
মিশাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত করিতে হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিস্ক এবং কসেরকা মজ্জা সঞ্চকীয় স্নায়ুগুণীর  
মধ্য দিয়া ইহা শরীরের সমুদয় অংশ বা যন্ত্রের উপর কার্য্য করিয়া থাকে,  
যাহার দরুণ রক্ত দূষিত হইয়া রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বাধাত জন্মে এবং  
তদ্বর্ণন সমুদয় যন্ত্রের জড়তা উৎপন্ন হইয়া ওলাউঠাতে যেক্রপ অবস্থা  
ঘটিয়া থাকে, শরীরের সেরূপ অবস্থা উৎপন্ন হয় । অতএব সমুদয় শরীর  
শীতল, বলক্ষয়, পতনাবস্থা (Collapse) এবং প্রচুর পরিমাণে চাউল  
ধোয়া জলের স্থায় ভেদ ও বমন, হাত পায়ে খিলখরা, পেটে আক্ষেপিক  
শূল বেদনা এবং শীতল চট্‌চটিয়া ঘর্ম্ম হইয়া থাকে । জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু  
মণ্ডলের (Sensory Nerves) উপরও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়,  
বাহ্যার দরুণ মস্তিস্ক সঞ্চকীয় স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া প্রলাপ এবং উন্মত্ততা  
উৎপন্ন হইয়া থাকে । স্নায়ুর শক্তির হ্রাস বা বিনাশও হইয়া থাকে ।  
ওলাউঠার উক্ত লক্ষণাদি উৎপাদন করা বিরেট্রামের এক বিশেষ প্রকৃতি  
বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত ।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । উন্নততা ; ক্রমাগত রোগ প্রকাশ করা এবং কাপড়াদি কাটিবার বা ছিড়িবার ইচ্ছা (বেল্, ষ্ট্রামন্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অনি-  
বার্থা ক্রন্দন এবং চীংকার করা (সিকুটা) এবং কোন প্রকারের কাল্পনিক  
দৃবদৃষ্ট বিষয়ে সর্বদা চীংকাব করিয়া ক্রন্দন ; ক্রমাগত কথা বলিবার  
অনিচ্ছা (বেল্, ইগ্নেনস্, নাইটিক্-আন্, বন্-আন্) ; প্রলাপ এবং প্রলাপে  
ধ্বংসধ্বকীয় কথা বলা (আর্স্, অবান্) ; উপাননা করা, অভিদাপ দেওয়া  
এবং সমুদয় রাত্রি অনবরত চীংকার করা ; নানা বিষয়ে প্রলাপ বলা ;  
সর্বদাই অস্ত্রের দোন্ বলা অথবা একবারে চুপ করিয়া থাকা, কিন্তু এক  
বার কোন কারণে উত্তেজিত হইলে নান ধরিয়া লোককে অনবরত ভৎ-  
সনা করা বা গালি দেওয়া ; সন্নিহিত মধ্য আগুনকে আপনি হেয়জ্ঞান করা  
এবং আপনাকে আপনি হতভাগ্য মনে করিয়া মানসিক অবসন্নতা, হতাশ  
এবং নিরাশার ভাব ; কোন ছন্দ করিলে বেকুপ হইব, সর্বদা সেকপ  
চিন্তা এবং ভয় (কবিউলাস্, ইগ্নেনস্) ।

মস্তক । মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কপালে শীতল ঘর্ষ  
(ওপিরাম্, টেবেকাম্) ; মাথা হেটকবিয়া উপড় হইলে মাথার রক্তাধিক্য বা  
রক্তাবরোধ ; থাকিয়া থাকিয়া মাথা ধরা এবং নোচড়াইয়া পড়িলে বা  
ছিঁড়িয়া গেলে বেকুপ হইব, মস্তিষ্ক সেকপ বাতনা, এবং চাপা বোধ (কফিয়া,  
মিউর-আন্) ; মাথার উপরিভাগে চাপা বোধ ; শিরপৌড়া এবং উহার  
সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং বমনোদ্বেগ (আর্স্, ইপিকাক্, ক্যালো বাই, নাক্স-বন্) ;  
মস্তিষ্কে জ্বালাভাব (ক্যাছ্, হেলিপোবাস্) ; বক লাগাইয়া রাখিলে সেকপ  
হইব, মাথার ঠিক উপরিভাগে সেকপ ঠাণ্ডা বোধ (আগোবিকাশ্, ক্যাল্-  
কার্ক্, লরোস্, সিপিয়া) ; মাথায় ভারি বোধ ।

চক্ষু । চক্ষু বিকৃত এবং যেন বহির্দিকে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার স্তায়  
অনুভূত হয় (বেল্, ষ্ট্রামন্), স্থিরতার বিশিষ্ট, জলপূর্ণ এবং বদিয়া যায় (আর্স্),  
জ্যোতি ভীন এবং যেন কাল বা নালের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত (চামনা, ক্যালী-  
আরোড্, ফন্, সিকেল্, সালফ্) ; চক্ষু পাতা অত্যন্ত শুষ্ক ; চক্ষুর তারা  
সঙ্কুচিত (মার্ক্-কর, ওপিরাম্, কন্, কাইটোল্, কাইসট্) ; চক্ষুর পাতার

পক্ষাঘাত; এক বস্তু দ্বিগুণ বা ডবল দেখায়; রাত্রিতে চক্ষে না দেখা (বেল্) ।

নাসিকা । নাসিকা যেন স্বাভাবিক অপেক্ষা তীক্ষ্ণ এবং লম্বা; মুখ মণ্ডল ঠাণ্ডা এবং বসিয়া যায়; নাক ঠাণ্ডা (আস্, ক্যাম্ফার); নাক দিয়া রক্ত পড়া (একন্, বেল্, ব্রাই, হামামেলিস্, ইপিকাক্) ।

মুখ মণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা এবং শীর্ণ, শীতল, বসিয়া যায় এবং মৃত দেহের জায় ৯ নাসিকা তীক্ষ্ণ (আস্, ক্যাম্ফার); মুখমণ্ডল নীলের আভাযুক্ত; বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে মুখমণ্ডল লালবর্ণ, কিন্তু বিছানা হইতে উঠিলেই শিটা বা ফিকা হয় (একন্); গাল উষ্ণ এবং উহাতে জালাহুতব; মুখমণ্ডলে, প্রধানতঃ কপালে শীতল ঘর্ষ (সিনা); মাড়ি সঞ্চালনের সহায়কারী পেশী শক্ত হয় বা উহা নোহান যায় না; দাঁত লাগা (Lock-jaw) (ইগ্নেস্, সিকুটা, হায়োস্, লরোস্, নাক্স-বম্, বেল্); ধমুঠকার বাঁহিষ্টিরিয়া ইত্যাদি আক্ষেপিক রোগের পূর্বে যেরূপ হয়, সেরূপ হঠাৎ আক্ষেপিক হাসি (Risus Sardonius) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা শীতল (ক্যাম্ফার, নেজা), শুষ্ক এবং কালচে (ওপিয়াম্, ফস্), ফাটায়ুক্ত, লালবর্ণ এবং ক্ষীত (বেল্, রাস্ টক্স); মুখগহ্বর এবং তালুকা শুষ্ক (এপিস্, আস্, নাক্স-মক্); মুখ দিয়া প্রচুর লাল পড়া; গোল মরিচ ইত্যাদি চিবাইলে যেরূপ হয়, মুখের মধ্যে সেরূপ ঝাল বোধ; দাঁতে দাঁতে কড়্ মড়্ শব্দ করা; জিহ্বা শীতল এবং শুষ্ক (কার্বো-বেজ্, সিষ্টাস্-ক্যান্, মিউর-আস্); ছাল উঠিয়া যা হইলে যেরূপ হয়, জিহ্বায় সেরূপ অহুত হয় (কলোস্, বিরেট্-বিরাইড্) । গলার মধ্য শুষ্ক এবং জালাযুক্ত; গলার মধ্যে খশ্‌খশে বোধ; গলার মধ্যে চাঁচিয়া ফেলার জায় অহুত হয় (আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, ক্রমের্); গলার মধ্যের আক্ষেপিক সঙ্কোচন (হায়োস্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত শূন্য; কল, রসাল এবং টক ত্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (আন্টি-টার্ট্, চায়না, ফস্-আস্, পিট্রোল্); অথবা ঠাণ্ডা এবং লোন্‌তা ত্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা; অত্যন্ত অনিবার্য প্রবল লিপাসা এবং প্রচুর পরিমাণে শীতল জলপানের ইচ্ছা (একন্, আস্, ব্রাই, রাট্রোকা,

কম্); উষ্ণ দ্রব্য খাওয়াতে অনিচ্ছা; প্রবল কাঠ উপসার (ইপিকাক্, কম্, মাক্); হিক্কা (সিকুটা, হায়োস্, ইগ্‌নেস্, সাল্‌ফ্-আস্); প্রবল বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত বমনোদ্বিগ এবং অত্যন্ত বলক্ষয় ও শয়ন কবিত্যা থাকার ইচ্ছা; বমনোদ্বিগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠা ও প্রবল গিপাসা (মাক্); অত্যন্ত প্রবল বেগে বমন; উদরস্থ আহাব দ্রব্যাদি বমন (ইপিকাক্, ক্রিয়াজ্); সবুজবর্ণের স্লেয়া বমন; টেটচিয়া আঠা বা টক তরল পদার্থ বমন; নড়িলে চড়িলে সা জ্বলাদি পান করিলেই বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীতল ঘর্ষ হওয়া; কাল পিত্ত এবং রক্ত বমন (আস্, হাইড্রোব্, আস্, সিকেল্). বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরামব এবং অত্যন্ত বলক্ষয় (আস্, স্যাট্রোফা, আন্টি-টার্ট্); পাকস্থলীর অত্যন্ত ক্ষতি এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা; পাকস্থলীর মধ্যে প্রবল চাপাবোধ যাহা বক্ষস্থি (Sternum), নিম্ন উদরের দুই পার্শ্ব এবং তলপেট পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; পাকস্থলী এবং উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশে প্রথর বেদনা (ইক্সান্, আস্, ক্যান্, আইরিস্, কম্)। স্পর্শনে উদর অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় (একন্, বেল্, কলোস্); উদরের ক্ষতি এবং বিস্তৃতি (আলোজ্, চায়না, ক্যাম্, কলচ্); শূল বেদনা; উদরে কর্জনবৎ বা কামড়ান এবং মোচড়ানের ভাষ বেদনা যাহা নাভি প্রদেশেই অধিক অনুভূত হয়; মলত্যাগের পর পেটের বেদনার উপশম (আলোজ্, কলোস্); অল্প মোচড়াইয়া গিরা (Knot) দিলে ঘেরূপ হয়, উদরে সেরূপ বেদনা; অল্পের মধ্যে দূষিত বায়ুর গন্ধার হেতু শূল বেদনা; উদরে শীতল ঘর্ষ; ঠাণ্ডা লাগিয়া শূল বেদনা; কোইনাইনের (Quinine) অপব্যবহারের পর শূল বেদনা; শাক তরকারি বা ফলাদি খাইয়া শূলবেদনা; অল্প বেটে রিল্লী প্রদাহ (Peritonitis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং উদরামব, চর্ম্ম শীতল, মুখাকৃতি বেন বসিয়া যায়, নাড়ী ক্ষুদ্র এবং দ্রুত; অস্থিরতা এবং মনের উদ্বিগ্ন; অল্পের মধ্যে অল্পের অংশ প্রবিষ্ট হওয়া (Intussusception) এবং তদ্রূপ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বা যাতনা; কয়লার আঙুনে ঘেরূপ হয়, উপরে সেরূপ আলাপ্তব (আস্, কম্, সিকেল্)।

মল এবং মলহার। পেটে বেদনা সম্বলিত প্রবল এবং প্রচুর পরি-

মাণে উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ঘর্ষ ; মল জলবৎতরল, সবুজের আভাযুক্ত এবং পক্ষীর স্তায় ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া পদার্থ বিশিষ্ট; চাউল ঘোঁসা জলের স্তায় ভেদ ; হঠাৎ ভেদ এবং অসাড় হা অনিচ্ছা পূর্ব মলত্যাগ ; কাল্‌চে জলবৎ তরল মল ভেদ ; গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে হঠাৎ তরল ভেদ বা ভেদ ও বমন ; সাংঘাতিক আকারের ওলাউঠা, যাহা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এবং যাহার সঙ্গে সঙ্গে কপালে শীতল ঘর্ষ হয় ; ফলাদি খাইয়া ওলাউঠা ; গুহের জড়তা হইলে যেরূপ হয়, সেরূপ কোষ্ঠবদ্ধ, — মল কঠিন এবং মোটা, লম্বা নেড় (আলাম্, ক্যালী-কার্ক্, নাক্স-বম্), প্রবল উদরাময় ; দান্তের পূর্বে পেটে চিন্‌চিনে বেদনা বা যাতনা ; দান্তের সময় শরীর মলিন হয় এবং কপালে শীতল ঘর্ষ এবং বমন হয় ; দান্তের পর পেটে অত্যন্ত খালিবোধ (আস্) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রাবরোধ (একন্, বেল্, ষ্ট্রামন্) ; অসাড় হা অনিচ্ছা-পূর্বক মূত্রত্যাগ (অস্, বেল্, হায়োস্, সিকুটা) ; সবুজের আভাযুক্ত মূত্র ত্যাগ (আস্, ম্যাগ্-কার্ক্, কুটা) ; বারম্বার অতি অল্প পরিমাণে কাল্‌চে লাল মূত্র ত্যাগ ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব (ক্যাক্স-কার্ক্, নাক্স-বম্) ; রজঃরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি বিষয়ে হতাশ ; কষ্টকর রজঃস্রাব ও বাৎকের বেদনা (Painful Menstruation) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভেদ ও বমন, অথবা অত্যন্ত দুর্বলকারক উদরাময় এবং শীতল ঘর্ষ ; সন্তান প্রসবের পর জরায়ু হইতে রক্ত নিঃসরণ (Lochia) বদ্ধ হওয়া এবং স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া যাওয়া ও উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ বলা ; আতুড়ে জীলোকের পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা (চায়না, প্লাটিনা) ।

শ্বাস যন্ত্র । কণ্ঠনালীর বারম্বার সঙ্কোচন এবং উহাতে আঁটাবোধ ; বারম্বার কাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বেন বহি-  
দিক পানে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে এরূপ অনুভূত হওয়া ; শ্বাসকষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে আঁটা এবং বাঁধ বাঁধ অনুভূত হওয়া (ফস্) ; বৃকের বক্ষস্থি প্রদেশে চাপা বোধ, সামান্য নড়া চড়াতেই শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ বন্ধ হয়

বা ইপানি (একন, আস্) ; গভীর শব্দ বিশিষ্ট কাশি যাহা রোগীকে বেশ  
 হঠাৎ ধাক্কা দেওয়ার জ্বাৰ আক্রমণ করে ; আক্কেপিক কাশি এবং গলা  
 দিয়া অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা নির্গমন, মুখ মণ্ডল লাল বর্ণ এবং উহার সঙ্গে  
 সঙ্গে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূৰ্ব্বক মূত্র ত্যাগ (আলাম, কষ্ট, কলচ্) ; ঠাণ্ডা  
 বাতাস হইতে উষ্ণ ঘরে প্রবেশ করিলে কাশির উদ্রেক (ব্রাই) ; গভীর  
 কাশি, উদর হইতে যাহার আরম্ভ বলিয়া অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে  
 কেবল দিনের বেলা গলা দিয়া কঠিন, হরিদ্রা বর্ণের তিক্ত বা লোনতা স্বাদ  
 বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন ; বৃক্ক স্থতী বিধানের জ্বাৰ বেদনা বা বাতনা। কাশি-  
 বার সময়ই বাহা অধিক অনুভূত হয় (বেল, ব্রাই, পাল্‌স্) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত  
 যাতনা বা উদ্বেগ (একন, আস্, স্পাইজেল্, সাল্‌ফ্) ও শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন  
 এবং শব্দযুক্ত । নাড়ী দ্রুতগামী, যুগ্মগতি বিশিষ্ট, দুর্বল এবং অনিয়মিত  
 রূপে স্পন্দন বিশিষ্ট ও অসম (কানায়াম্, ডিজিট, নেট্রা-মিউর) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । শিশু বয়স্ এত দুর্বল হয় যে উহার দক্ষণ  
 সে মাথা সোজা করিয়া রাখিতে পারে না (কোনাবাম্) এবং বাহা হৃদয় কাশি-  
 তেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় ; পৃষ্ঠ দেশ এবং কোমরে অত্যন্ত বেদনা  
 (আর্গিকা, আস্, ব্রাই) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাতের  
 জ্বাৰ অত্যন্ত কষ্টদায়ক দুর্বলতা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড় হয় বা উহাতে কি  
 কি ধরে (সিপিরা, সাইলিস, সাল্‌ফ্) ; শীতের দক্ষণ হাত পায়ের নখ  
 নীল বর্ণ হয় ; মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁতলিয়া গেলে ঘেঁরুপ হয়, অঙ্গ  
 প্রত্যঙ্গে সেরূপ বেদনা বা যাতনা, ঠাণ্ডা বা আর্দ্র বাতাস এবং বিছানার  
 উষ্ণতাতে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং উপর নীচে চলাচল করিলে বাহার উপশম  
 হয় ; হাত পায়ের পাতা বরফের জ্বাৰ ঠাণ্ডা (সাইলিস) । চলিতে পার  
 কষ্টানুভব ; প্রথমতঃ ডাইন এবং তৎপর বাম কঁচুচ্কির সন্ধিতে পক্ষাঘাতের  
 জ্বাৰ অবশবোধ ; পায়ের ডিমে খিল ধরা (ক্যাক্-কার্জ, ক্যান্‌ফার, ক্যাম্,  
 নাইট্রিক্-অ্যাস, নাক্স-বম্, সাইলিস, সাল্‌ফ্) ।

চর্ম । জলে ভিজাইলে এরূপ হয়, চর্ম সেরূপ কঁকড়া হয়, চাপিয়া



ধরিত্রা চাপ ছাড়িয়া দিলেও বাহা কৌচ্ কাইরা থাকে ; চৰ্ম্ম নীলবৰ্ণ, বেগুনি এবং ঠাণ্ডা ; খোসের ভায় কুসুড়ী ।

নিদ্রা । অত্যন্ত অস্বাভাবিক রকমের নিদ্রাবেশ (আক্টি-টার্ট্, এপিস্, নাক্স-মক্) ।

জ্বর । সমুদয় শরীরেই শীত এবং কম্প (ত্রাই) ; বাহ্যিক শীতবোধ এবং আন্তরিক উষ্ণভাব ; সমুদয় শরীরে শীতল বর্ষ (ইউকর্ব্), কপালেই বাহা অধিক হয় (কাম্ফরে) ; ওলাউঠার মহামারির সময় জ্বর বিকার-কাহাতে রোগীর জীবনীশক্তির হঠাৎ অত্যন্ত হ্রাস হয় ; নাড়ী অনিয়মিত গতিবিশিষ্ট এবং সচরাচর ক্ষুদ্র ও সূত্রবৎ এবং অনেক সময় প্রায় অহুভূত হয় না (আস্, ক্যানাবিস্, কার্কো-বেজ্) ; সবিরাম বা পালা জ্বর ; প্রত্যহে বা পূর্বাঙ্কে শীত কম্প (নেটাম্-মিউর) ; শীত কম্প এবং কেবল বাহ্যিক ঠাণ্ডা বোধ ; প্রথমতঃ অত্যন্ত শীতবোধ, তৎপর শরীর উষ্ণ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা এবং অবশেষে ঘৰ্ম্ম হয় ; শিরাগুলি দিয়া যেন ঠাণ্ডা রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে একরূপ অহুভূত হয় ; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বলক্ষয়, শীতল বর্ষ, অচেতনতা, বমন এবং জলবৎ-তরল উদরাময়, মুখ মণ্ডল নীলের আভাযুক্ত, নাসিকা তীক্ষ্ণ, এলে ভিজাইয়া রাখিলে বেক্রপ হয় মুখমণ্ডলের চৰ্ম্ম সেক্রপ কৌকড়া হয় ।

ব্যবহার । কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত পুরাতন অসুখ ; ভয়, আতঙ্ক এবং বিরক্তি জনিত অসুখ ; তামাক, কল এবং শাক তরকারি খাইরা শূলবেদনা ; উন্মত্ততা ; আয়ুশূল ; বাতরোগ ; ধমুঠকার ; দাঁত লাগা (Lock-jaw) ; আক্কেপ (Convulsions) ; পক্ষাঘাত ; দৈনিক (Endemic) ওলাউঠা ; এবং বহুব্যাপক (Epidemic) আকারের ওলাউঠা ; সাংঘাতিক আকারের উদরাময় ; গ্রীষ্ম কালীয় উদরাময় বা সরল ওলাউঠা ; কোষ্ঠবদ্ধ ; হপিং কক্ ; রক্তাশ্রুতা ; হিষ্টিরিয়া রোগ জনিত অসুখ ; সবিরাম-জ্বর ; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার ; রক্তবমন ; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা ; (Painful Menstruation) ; জ্বীলোকের আত্মতুড়ে পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা ; স্মৃতিক-জ্বর ; কাশি ; হপিং কক বা কাশি ; জ্বীলোকের গর্ভাবস্থায় বমন এবং পাক-স্থলীর অত্যন্ত রকমের অসুখ ইত্যাদি রোগে বিরেটাম্-আলবাম্ ব্যবহার্য্য ।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।** হঠাৎ বলক্ষয় (একন্, আন্, ক্যান্কার); সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই মুচ্ছা; বিদ্যুতীয় যন্ত্র গায় লাগাইলে যেক্রপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেক্রপ বারম্বার ধাক্কা লাগার ভায় অস্থিত হয়; বিলম্বী, বাহার দক্ষ হাত পায়ের পাতা সম্মুখ পানে আবৃত্ত হয় বা কসিয়া ধরে, অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলক্ষয় (আন্, ফেরাম্, ফন্); খিল ধবা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্ষেপিক স্পন্দন; ভয় পাওয়ার পর অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক তরল ভেদ (জেল্‌স্, ওপিয়াম্); জ্বলাদি পানের পর, দান্তের সময় এবং উহার পূর্বে, দাঁড়াইলে এবং ঘুমের পর অস্থখের বৃদ্ধি (এপিস্, ল্যাক্, ওপিয়াম্) এবং বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকিলে ও ঘর্ম্মের পর অস্থখের উপশম ইত্যাদি বিরেট্রাম্ আলবামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ ।** বিরেট্রাম্ আলবামের কার্যের সঙ্গে একোনাইট্, আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্, কল্‌চিকাম্ এবং ডিজিটালিশের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন ঠেকান কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আর্পিকা, আসিনিক্, চায়না, কফিয়া, কুপ্রাম্, ডুসিয়া, ফেরাম্, ইপিকাক্, ওপিয়াম্ এবং ফফরিক্ আসিডের সাদৃশ্য আছে ।

**প্রতিষেধক ঔষধ ।** একোনাইট্, ক্যান্কার, চায়না, কফিয়া ইত্যাদি বিরেট্রাম্ আলবামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

**ডাইলুশন বিচার ।** ৬ এবং ১২ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ওলাউঠাতে ১২ ডাইলুশনই লেখক অধিক ব্যবহার পাকেন । শিশুগণের ওলাউঠাতে এবং যুবা যুবতীর ওলাউঠাতে অধিক পরিমাণে বগক্ষয় হইলে ৩০ ডাইলুশনই অধিক উপকারী, লেখক উহার চিকিৎসার ফল দেখিয়া এক্রপ বিশ্বাস করেন । ওলাউঠায় অনেক চিকিৎসক ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমক ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া থাকেন । লেখকের মতে ওলাউঠা রোগে ১২ ডাইলুশনই সর্বাপেক্ষা অধিক উপকারী । অতএব তিনি উক্ত রোগে উক্ত ক্রমই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন । অত্যাশ্র অস্থখে ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

চিনিলাম্ সাল্‌কিউরিকাম্,-সাল্‌ফেট্ অব্ কোইনাইন্,-

চিনিন্-সাল্‌ফ্ ।

(CHININUM SULPHURICUM,—SULPHATE OF QUININE,—

CHININ.-SULPH.)

কোন এক বিশ্বস্ত ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে আদত সাল্‌ফেট্ অব্ কোইনাইন্ ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে ভুগার অব মিক্চর সঙ্গে মিশাইয়া ইহার গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। আল্‌কোহলে মিশাইয়া ইহার আরোকণ্ড প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু ইহার গুঁড়াই অধিক উপকারী বলিয়া অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আরোকের ব্যবহার অতি কম।

সাধারণ ক্রিয়া। কোইনাইনের বৈধানিক কার্য (Physiological action) সম্বন্ধে এপর্যন্ত নিশ্চিতরূপে কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ, মস্তিষ্কের নিম্ন ভাগ এবং গ্যাংলিয়োনিক্ স্নায়ু মণ্ডলের (Ganglionic System of nerves) কেন্দ্রের উপরই ইহার কার্য অতি প্রবল। আবার মস্তিষ্ক এবং কসেরকা মজ্জা স্নায়ুগুলির উপরও ইহার প্রাথমিক (Primary) কার্য থাকা অসম্ভব নহে। উক্ত কেন্দ্র হইতেই শরীরের প্রায় সমুদয় অংশ বা যন্ত্রের উপর ইহা কার্য করিয়া থাকে। ইহা বক্তের ফাইব্রিন (Fibrin) নামক পদার্থের অংশ বৃদ্ধি করে এবং উহার লাল কণার (Red-corpuscles) সংখ্যা হ্রাস করিয়া লিউকো-সাইথিমিয়া (Leucocythæmia) এবং রক্তাশ্রতা (Anæmia) উৎপাদন করে, বাহার দ্রবণ সার্বস্রিক দুর্বলতা এবং বলক্ষয় হইয়া থাকে। হোমিও-প্যাথিক মতে উক্ত প্রকারের অবস্থা বা অনুরূপে কোইনাইন এক উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। ইহা হৃৎপিণ্ডের কার্য এবং স্পন্দনের বেগ প্রথমতঃ বৃদ্ধি করে এবং তৎপর উহার হ্রাস এবং দুর্বলতা উৎপাদন করে, বাহার দ্রবণ শরীরের সন্তাপের হ্রাস হইয়া থাকে। রক্ত বহা নাগীগুলির সহায়কারী স্নায়ু (Vaso-motor nerves) প্রথমতঃ উত্তেজিত এবং তৎপর পক্ষাঘাতাক্রান্ত হওয়ার দরুণই উক্ত প্রকারের অবস্থা ঘটিয়া থাকে। কো

কোন যন্ত্র বা অংশের স্থানিক রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া প্রদাহের কাছাকাছি লক্ষণাদিও প্রকাশ পাইতে পারে। মস্তিষ্কেই এই প্রকারের ক্রিয়া অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রদাহ এবং জ্বর ও তজ্জনিত দুর্বলতার পক্ষে কোইনাইন্ হোমিওপ্যাথিক মতে এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। কোইনাইনের প্রাকৃতিকলক্ষণগুলির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে উহা মেলেরিয়া জনিত জ্বরের লক্ষণের স্ভাৱ লক্ষিত হয়। এজন্তই মেলেরিয়া জনিত সবিরাম বা পালাজর এবং সাংঘাতিক আকারের জ্বরে (Pernicious Fever) কোইনাইন্ এত উপকারী। ইহার ক্রিয়াতে শ্রীহা বর্দ্ধিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উহার রক্ত উৎপাদন করার শক্তির হ্রাস বা বিনাশ হয়। অতএব রক্তান্নতা (Anœmia) হইয়া থাকে। এই সকল কার্যের সঙ্গে সঙ্গে নিউমোগ্যাস্ট্রিক ন্নায়ু (Pneumogastric Nerve) বিশেষরূপে আক্রান্ত হওয়ার দরুণ যকৃতের রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হয় এবং উহার জড়তার দরুণ কামল রোগ হয়, বাহার দক্ষণ পরিপাক কার্যে লক্ষ্যীয় অনেকানেক অসুখ এইতে দেখা যায়। চক্ষুর কোটরের উপরি ভাগে ট্রিগিমিয়াস (Trigimius) ন্নায়ুর যে শাখা আছে তাহা ইহা দ্বারা বিশেষ রূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে, বাহার দরুণ উক্ত স্থানের অতিরিক্ত চেতনা এবং তদ্রুপ ন্নায়ুশূলের স্ভাৱ প্রবল বেদনার (Severe neuralgic pains) উদ্ভেক হয়। সবিরাম অসুখ এবং মেলেরিয়া জনিত অসুখের লক্ষণের স্ভাৱ লক্ষণ বিশিষ্ট অসুখ উৎপাদন করা কোইনাইনের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা গুণ মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। এক স্তরেমী এবং মনের উত্তেজনার ভাব ও তৎপর মানসিক অবসন্নতা বা নিরাশার ভাব; কোন বিপদ শীঘ্রই ঘটিবে সে বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তার ভাব (আলাস্, আনাকার্ড, আর্স্, ক্যাক্-কার্ক্); মনের উষ্মেগ; স্রণ শক্তির অত্যন্ত হ্রাস; কোন বিষয়ে চিন্তা করিলে উহার সম্বন্ধে ভালরূপ ভাবের উদয় হয় না।

মস্তক। কোন কণ বা যন্ত্রের ঢাকা ঘোরার স্ভাৱ মাথা ঘোরা এবং

উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে বজ্ বজ্ শব্দ হওয়া, ষাঁদকষ্ট, এবং গা বমী বমী করা; মাথায় ভারি এবং গোলমেলে বোধ; প্রবল শিরঃ-পীড়া; কপাল এবং উহার ছই পার্শ্বে দপ্‌দপিয়া, চাপিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার ভ্রায় বেদনা বা যাতনা; কপালে বেদনা; মাথা ঝাকিলে বেরূপ হয়, মাথার সেরূপ যাতনা, প্রত্যেক ধাপেই যাহা অনুভূত হয় এবং মধ্যাহ্নে শীত হইয়া যাহা আরম্ভ হয়; মাথার ঠিক উপরি ভাগে দপ্‌দপানি; কোন নির্দিষ্ট সময়ে সবিরাম শ্বাস-শূল; সবিরাম শিরঃপীড়া; মাথায় প্রবল দপ্‌দপানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা এবং মুখমণ্ডলে উল্কাগতব; অত্যন্ত বলবৎ হওয়ার দরূণ চক্ষুর পাতা অনিচ্ছাপূর্বক পড়িয়া যাওয়া বা চক্ষু বুজিয়া যাওয়া; শিরঃপীড়া, যাহাতে বেদনা প্রবল হয় না বটে, কিন্তু উহার দরূণ মস্তিষ্ক দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাল পর্যন্ত অনবরত কনকন করে; মাথা এবং গ্রীবার শিরার ক্ষতি এবং বিস্তৃতি।

চক্ষু । চক্ষুর ডিস্ক (Disk) এবং রেটিনা (Retina) রক্তাৱতা; ডিস্ক যেন শুষ্ক বলিয়া অনুভূত হয়, একপানি পাতনা বাপত বা কুরাশার মধ্য দিয়া তাকাইলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ রূপা দেখা (কষ্ট, ফস্, মার্ক্, পাল্‌স্, সাল্‌জ্); চক্ষুর তারা বিস্তৃত (বেল্, হারোস্, ট্রায়ম্); চক্ষে আলোক সহ্য হয় না (একন্, বেল্, চায়না); উজ্জ্বল আলোকে চক্ষু দিয়া জল পড়ে; চক্ষুর সম্মুখে যেন উজ্জ্বল আলোক এবং আগুনের কণা রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (সাইক্রেমেন্, মার্ক্); চক্ষুর কোটরের উদ্ধ এবং নিম্ন স্থানে শ্বাসশূলের ভ্রায় বেদনা বা যাতনা, সৰ্বদা বর্তমান না থাকিয়া কোন নির্দিষ্ট সময়ে যাহার উদ্বেক হয়; সবিরাম টেরাচক্ষু (Intermittent Strabismus); শিশুগণেব হহলে এক দিন চক্ষু টেরা হয় এবং তৎপর দিবস টেরা চক্ষু একেবারেই থাকে না; চক্ষুর যোজক ঝিল্লীতে রক্তাবরোধ বা উহা লাল বর্ণ হওয়া; চক্ষুর পাতা লালবর্ণ এবং ক্ষীত; চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত; চক্ষু দিয়া জল পড়া; চক্ষে আলোক একবারেই সহ্য হয় না; চক্ষুর কোটরে ছিড়িয়া ফেলার ভ্রায় যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া, পিপাসা এবং জর; সমুদয় অস্ত্রুই একদিন অন্তর একদিন প্রকাশ পায়; ডাইন চক্ষের

মধ্যে বেন একটি আল্পিনের মাথার ছায় ক্ষুদ্র দাগ চক্ষুর প্রত্যেক বার সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া বেড়ায়; অন্ধতা; চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক বা রূপমান স্পন্দন (আগারিকাশ্); চক্ষুব কোটরের উপরিভাগের প্রবল স্নায়ুশূল (বেল, চায়না, স্পাইজেল), প্রতিদিনই বাহার উদ্বেক হয় ।

কর্ণ । কানে টন্ টন্, সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া (একন্, আস্, বেল্, চায়না, সাল্ফ) : বধিরতার সঙ্গে সঙ্গেও কানে উক্ত প্রকারের শব্দ হওয়া; কানে বজ্ বজ্ শব্দ হওয়া ।

নাসিকা । যুবক যুবতীর নাক দিয়া রক্ত পড়া (Epistaxis) ।

মুখমণ্ডল । মুখ মণ্ডল শিটা বা দিকা, বাতনার চিহ্নযুক্ত, রুধ, শোণের ছায় স্বীত এবং টল্ টলে, মেটেরদ্য বিশিষ্ট : বাম গালের মেলার নামক অস্থিতে (Malar bone) কনকনানি; মুখমণ্ডল এবং চক্ষুর স্বেতাংশ বা যোজক কিলী কামল রোগের ছায় হরিদ্রা বর্ণ; বাম নিম্ন মাড়ির স্নায়ুশূল (চায়না, স্পাইজেল), মুখমণ্ডলস্থ স্নায়ুশূল, প্রাতঃকালেই প্রায় বাহার উদ্বেক হয় এবং বাহ্য চক্ষুর নিম্ন স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া চক্ষুর মধ্য এবং চতুঃপার্শ্ব-বর্তী স্থানে বিস্তৃত হয় ।

মুখগহ্বর । মুখগহ্বর শুষ্ক; পিপাসা, ঘর্ষের সময়ই বাহার অধিক উদ্বেক হয়; জিহ্বা সাদা (ব্রাই, আন্টি-ক্রুড্, মার্ক্); জিহ্বা গাঢ়, হরিদ্রা-বর্ণের ফারযুক্ত (Furred); জিহ্বার গোড়া হরিদ্রাবর্ণ (মার্ক্-আয়োড্); জিহ্বা কোমল (মার্ক্), সমুদয় প্রকার আহার জবোই অরুচি; মুখে কাইয়ের ছায়া বা তিক্ত স্বাদ বা স্বাদ একবারেই থাকে না; কণা বলিবার শক্তির ব্যাঘাত জন্মে (কষ্ট্, জেন্স, হায়োস্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা শূন্যতা বা আহারে অনিচ্ছা বা অরুচি; উদগার উঠা; মুখ দিয়া জল উঠা; হিক্কা; বমনোদ্বেষ; বমন; পাকস্থলীর মধ্যে চাপাবোধ; আহারের পর পাকস্থলীতে চাপাবোধ হইয়া উদরে কণ্ঠনবৎ বেদনা; অজীর্ণ রোগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে বেদনা, বমনোদ্বেষ, আহারে অরুচি, উদগার উঠা, মুখে তিক্ত স্বাদ এবং পিত্ত বমন । রাত্রিতে শয়ন করিতে যাওয়ার কিছুকাল পূর্বে যত্নত প্রদেহে বেদনা; সার্বরাম বা পালাজ্বরের পর প্লীহার নিবৃদ্ধি এবং

উহাতে বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন শোথ (আস্) ; শ্রীহা প্রদেশে ঘৃণ্ণুশ্বে বেদনা, চাপিয়া ধরিয়া রাখিলে বাহার উপশম হয় ; শ্রীহাতে স্থচী বিধানের ভ্রায় বাতনা ; উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত ও উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে গড়্‌গড়্‌, কল কল শব্দ এবং গুহ্ব দ্বার দিয়া দূষিত বায়ু নিঃসরণ (কার্বো-বেজ্, চায়না, লাইকোপ্, সাল্‌ফ্) ; সরল অঙ্কে (Transverse Colon) প্রদেশে শূল বেদনার ভ্রায় প্রবল কঠনবৎ বেদনা বা বাতনা ; এই প্রকার বেদনা বা বাতনা কখন কখন আহ্বারের পরও হইয়া থাকে ; বৃদ্ধ বয়সে পরিপাক যন্ত্রের শিথিলতা ।

মল । মূত্রে ঘাসের ভ্রায় হবিদ্রাবর্ণ, দানায়ুক্ত, অথবা টেটের গুঁড়ার ভ্রায় তলানি পড়ে ; মূত্র ঘোলাটিকা, লালবর্ণ এবং অত্যন্ত অসহ্য উগ্রগন্ধযুক্ত (বেনজ্-আস্) ; রক্ত মূত্র ভ্রাগ ; মূত্র কোষের ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ বা আল্‌-বুমিনুরিয়া (Albuminuria) ।

জননেদ্রিয় । আবাত লাগিয়া বা অল্প কোন কারণে জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুব উত্তেজনার হ্রাস ।

শ্বাস যন্ত্র । বায়ু উপনল এবং বায়ুনলের উপরিভাগে হৃদ্‌ হৃদীয় দরুণ কাশি ; নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, মূহ্ এবং অনিয়মিত (ডিজিট্) ; বৃক্ কষ্ট বা আঁটাবোধ ; দুর্বলতার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত কষ্টকর হয় ; বৃকের পার্শ্বে স্থচীবিধান বা ঘাটিকা ধরার ভ্রায় বেদনা বা বাতনা (ব্রাই, কালো-কার্ল্) ; পাঞ্জরার হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের দ্বাবুশূল (Intercostal neuralgia) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত বাতনা ; হৃৎস্পন্দন ; হৃৎপিণ্ডেব দুর্বলতা, সর্কাস্কক বলক্ষয় (একন্, আস্, ডিজিট্) ; নাড়ী পূর্ণ এবং মোটা ; নাড়ী দুর্বল, কম্পমান, অনুভূত হয় কি না হয় (আস্, একন্) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । মেক দণ্ডের গ্রীবাদেশস্থ শেষ অস্থি এবং পৃষ্ঠদেশস্থ প্রথম অস্থি প্রচাপনে বেদনায়ুক্ত হব বা টাটায় ; কোমর প্রদেশস্থ হাড়ের উক্ত প্রকারেব বেদনা বা বাতনা অনুভূত হয় ; স্পর্শনে কোমর প্রদেশস্থ তৃতীয় অস্থিতে বেদনা বা বাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ কষ্টা-হুত্ব ; কসেব্রকার উত্তেজনা (Spinal irritation) ; কোন এক নির্দিষ্ট

সময়ে কখন কখন পৃষ্ঠদেশে বেদনা, রাত্রি হুই প্রহরের সময় যাহার উদ্রেক হয় এবং যাহা মাথা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা, উহার কম্পন এবং উহার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সঞ্চালনের শক্তির হ্রাস বা বিনাশ; হাত ঠাণ্ডা এবং উহাতে ঠাণ্ডা ঘর্ষ; প্রদাহবিশিষ্ট বাত রোগ; তরুণ প্রবল সন্ধিবাত; স্বল্পবিরাম এবং সবিরাম-অর; সন্ধিগুলি অত্যন্ত বেদনাযুক্ত (চায়না); সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই ভারি বোধ এবং কন্কনানি, যাহা সন্ধিগুলিতেই অধিক অনুভূত হয়; ডাইন পার্শ্বের সায়োটিক স্নায়ুশূল (Sciatic neuralgia)।

নিদ্রা স্নায়ু মণ্ডল অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তেজিত হওয়ার দরুন নিদ্রাশূন্যতা।

জ্বর । শীতকম্প; এক নির্দিষ্ট সময়ে জ্বরের আক্রমণ (সিঙ্ক্‌ন); অপরাহ্ন ৩টার সময় শীতকম্প; জ্বরে শীতলাবস্থা, উষ্ণাবস্থা, ঘর্ষাবস্থা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া জ্বর সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া যায়; পূর্বাহ্ন ১০ টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত (নেট্রান্ মিটার) এবং অপরাহ্ন ৩টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে দ্ব্যধিক জ্বরের আক্রমণ (চায়না) অথবা ত্র্যধিক জ্বর; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন; প্রীতাহতে বেদনা (অর্স্) ; মেরুদণ্ড বেদনাযুক্ত; মুখমণ্ডল শিঁটা বা ঘিকা; পিপাসা; ওষ্ঠ নীলবর্ণ; কানে টন্টন্ শব্দ হওয়া (চায়না); স্নায়ুগত শীত বোধ, বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে; হাত পাদের অগ্রভাগ বা পাতা, নাক এবং টুঁটা ঠাণ্ডা; শরীরের সন্তাপের হ্রাস; শরীরের অত্যন্ত উত্তাপ; মাথায় পূর্ণ বোধ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ; অত্যন্ত পিপাসা; দ্রাবিতে বা বিছানায় শয়ন করিবার পর শরীর অত্যন্ত উষ্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থার গাভাঙ্গা এবং হাচি হওয়া; প্রলাপ; বাচ এবং পাদের শিরায় বিস্তারিত বা বিস্তৃতি; চক্ষু শুষ্ক এবং উষ্ণ; প্রচাপনে কসেরকা বেদনাদাক্ত হয়; দন্কা উচ্চাত্ত্বব; অপরাহ্ন ৪ টার সময় পিপাসা; ঘর্ষ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা; স্থির ও নিশ্চল ভাবে থাকিলেও প্রচুর ঘর্ম্ম; উচ্চাত্ত্বের পর ঘর্ম্ম আস্তে আস্তে আরম্ভ হয়; সামান্য চড়া চড়াতেই প্রচুর ঘর্ম্ম (ব্যাল্‌বাক্, মাক্, কন্); প্রায় প্রতিদিন



প্রাতঃকালেই বিছানায় শয়নাবস্থায় প্রচুর ঘর্ম (ক্যাঙ্ক-কার্ক, নাইট্রিক-আস্, ফস্); প্রচুর পরিমাণে, হ্রস্বলকারক, রাত্রিযোগে, উদরাময়; ঘুমেরবোধে বা নিদ্রাবস্থায় প্রচুর ঘর্ম (চায়না, ফস্); অত্যন্ত হ্রস্বলকারক ঘর্ম।

ব্যবহার। মেলেরিয়া জনিত সকল প্রকারের রোগ; মেলেরিয়া জনিত সবিরাম, স্বল্প বিরাম এবং সাংঘাতিক আকারের জ্বর; রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হেতু শীত কম্প; প্লীহার বিবৃদ্ধি; বহুতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার বিবৃদ্ধি; কামল রোগ; রক্তাল্পতা (Anœmia); রক্তের খেত কণার বৃদ্ধির দরুণ অসুখ বা লিউকোসাইথিমিয়া (Leucocythœmia); হ্রস্বলতা; সবিরাম আকার বিশিষ্ট সকল প্রকারের অসুখ; প্রদাহ; সপূঁয় প্রদাহ; শোথ; মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; সংশ্রাস বোগ; কোন কোন প্রকারের শ্বাস শূল; বাত রোগ; অঙ্গীর্ণ রোগ; বধিরতা; অন্ধতা; মাথাঘোরা, কোন নির্দিষ্ট সময়ে যাহার আক্রমণ হয়; শিরঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ভারি এবং পূর্ণ বোধ, ঘাটিয়া ধরা এবং মাথাঘোরা ও কখন কখন নাক দিয়া রক্ত পড়া; হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি অসুখে কোইনাইন ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অস্থিরতা, স্পর্শ এবং শব্দাদি অসহ্য হওয়া; শরীরের মধ্যে যেন কেমন কেমন করে, যাহার দরুণ মনে হয় যেন কোন এক কঠিন রোগ শীঘ্রই হইবে; হ্রস্বলতা; কম্পন; মুছার ভাব; ক্ষুধা; বাহ্যিক বিষয়ের অতিরিক্ত জ্ঞান; অত্যন্ত ক্লান্তি, শ্রান্তি এবং ভারি বোধ এবং কোন কার্য করিতে অনিচ্ছা; শরীরের স্থানে স্থানে সবিরাম আকার বিশিষ্ট শ্বাসশূল; লক্ষণাদি কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে (আস্), এক দিন অন্তর একদিন (চায়না) আক্রান্ত হয়, অথবা প্রতিদিনই নিয়মিত সময়ের কিছু পূর্বে ধামিয়া যায়; প্রদাহযুক্ত স্থানে পূর্বের সঞ্চার হইয়া লীত হয় (হিপ্-সাল্‌ফ্, মার্ক্); প্রচুর ঘর্ম (আস্, চায়না, ফস্, সাল্‌ফ্-আস্); শোথ, যাহা বহুত এবং প্লীহার অসুখেই অধিক বর্তমান থাকে, (আস্); মেলেরিয়া জনিত অসুখের দরুণ শোথ (আস্, চায়না); হ্রস্বল এবং শ্বাসবিক; সামান্য পরিপ্রমেষেই শ্রান্তিবোধ এবং হৃৎস্পন্দন, রক্তস্রাব, পুঁয়াদি নিঃসরণ, ধাতু নিঃসরণ, উদরাময়, রক্তস্রাব (চায়না) ইত্যাদির দরুণ অত্যন্ত

চূৰ্ণগতা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রূপমান স্পন্দন এবং গর্ভচর্চা; বহুঔষধের দ্বারা আক্ষেপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অচেতনতা ইত্যাদি কোইনাইনের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । মেলেরিয়া জনিত অনুরে আসিনিঙ্ক, সিড্রন্, ইউপেটবিয়াম্ পাফ'লিওরেটাম্, ফেরাম্ নেট্রান্, মিউরিয়াটিকাম্, ল্যাকেসিস্ ইত্যাদে ঔষধের কার্যের সঙ্গে কোইনাইনের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আসিনিঙ্ক, ইপিকাকিউএনা, নাস্-বমিকা, বিরেটাম্ আল্‌বাম্, সাগ্‌কার ইত্যাদি কোইনাইনের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । আমরা কোইনাইনের ১ম দশমিক ক্রমের শুঁড়া ২ বা ১ গ্রেইন মাত্রায় ব্যবহার করিয়া সকল রোগেই বখোচিত ফল পাইয়া থাকি । আদত কোইনাইন ৩ ২ বা ১ গ্রেইন্ মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোইনাইনের স্পিরিট মিশ্রিত আরোক আমি কখনও ব্যবহার করিয়া দেখি নাই । অতএব উহার গুণাগুণ সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বলিতে পারি না ।

চিনিনাম্ আসিনিকোসাম্,-আসিনিয়েট্ অব্ কোই-  
নাইন্,-চিনিনাম্-আর্স্ ।

(CHININUM ARSENICOSUM,—ARSENATE OF QUININE,—  
(CHININ.—ARS)

চিনিনাম্ আসিনিকোসাম্ যদিচ সচরাচর অধিক ব্যবহৃত না হউক, তথাপি ইহা দ্বারা কতকগুলি রোগের চিকিৎসায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । অতএব ইহার বিবরণও প্রথম শ্রেণীর ঔষধ মধ্যে লিপিত হইল । কোন এক বিষমত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে আদত আসিনিয়েট্ অব্ কোইনাইন্ ক্রয় করিয়া সুগার অব্ মিক্‌স সহিত

মিশাইয়া ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত ইহার গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে ইহার ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । যদিচ এই ঔষধ স্নায়ুশরীরে অধিক পরীক্ষিত হয় নাই, তথাপি রোগ চিকিৎসায় ইহার উপকারীতা অনেক দেখা গিয়াছে । রক্তের সাব পদার্থ, শৈল্পিক ঝিল্লী এবং স্নায়ু মণ্ডলের উপর ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, বাহার দক্ষণ ক্ষুদ্র সন্ধিবাত (Arthritis), বিকারের লক্ষণাক্রান্ত, অত্যন্ত বলক্ষয় এবং জীবনী-শক্তির হ্রাস সম্বলিত প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই প্রদাহের অবস্থা শৈল্পিক ঝিল্লীতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব হোমিওপ্যাথিক মতে ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) এবং সাংঘাতিক আকারের আরক্ত-জ্বর রোগের চিকিৎসায় ইহা দ্বারা বিশেষ কল পাওয়া যায় । ইহা সবিরাম জ্বরের ন্যায় জ্বর এবং সবিরাম আকার বিশিষ্ট স্নায়ুশূল উৎপাদন করে । এই স্নায়ুশূল রোগীকে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে আক্রমণ করিয়া থাকে । ইহা মেলেরিয়া (Malaria) জনিত অনেকানেক অন্থে বিশেষ উপকারী । ইহার কার্য্য কোইনাইন্ এবং আর্দিনিকের মিশ্রিত কার্য্যের তায় ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মানসিক অবসন্নতা ; মানসিক জড়তা ; একাকী নিস্তর্র ভাবে থাকার ইচ্ছা (জেল্‌স্) ; মনের উদ্বেগ এবং রাত্রিতে প্রলাপ ; শিরঃ পীড়া, যাহা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে রোগী চিড়্‌চিড়ে হয় ।

মস্তক । একপেশে মাথা ধরা (আধ্‌কপালীয়া মাথা ব্যাথা), শাধীরিক বা মানসিক পরিভ্রমে সাহার বৃদ্ধি হয় ; ভয় থাইয়া এক পেশে মাথা ব্যাথা ; মাথার গোলঘেলে বোধ ; মাথার মধ্যে ছুঁবী বিধানের তায় বেদনা যেন সর্কাদা চলিয়া বেড়াইতেছে এরূপ অনুভূত হয়, সাহার দক্ষণ ঘূমের ব্যাঘাত জন্মে ; কপালে এবং মাথার পশ্চাৎভাগে বেদনা ; কপালের ডাইন পার্শ্বে এবং চক্ষুর উপরি ভাগে স্নায়ু শূলের তায় বেদনা ; মাথার বাম পার্শ্বে ছিড়িয়া ফেলা বা ছিদ্ৰ করার তায় বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু আক্রান্ত হইয়া চক্ষুর সম্মুখে ধড়্‌ ফড়্‌ কর',

চক্ষে বেদনা এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া ; উক্ত বেদনার আক্রমণের সময় কানে টন্ টন্ শব্দ, বমনোদ্বেষ, বমন, নিয়মিত রূপে রাত্রি ছই প্রহরের সময় যাহার উদ্রেক হয় (চিনিনাম্-সাল্‌ফ্‌) ; মাথার পশ্চাৎ ভাগের বাম উন্নত স্থানে (Left occipital protuberance) জ্বালাযুক্ত বেদনা যাহা বাড়, ক্রমশঃ, বৃদ্ধির বাম অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং যাহার দরুণ সোজা হইয়া না বসিলে বোগীব নিশ্বাস বদ্ধ হয় (Orthopnea) ; হাটতোলা, গা ভাঙ্গা, শীত কম্প ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া উক্ত বেদনা আবৃত্ত হয়, বেদনা সচরাচর প্রাতঃকালেই আরম্ভ হয় এবং প্রায় রাত্রি ছই প্রহর পর্য্যন্ত বর্তমান থাকে ।

চক্ষু । চক্ষে আলোক একবাবেই সহ্য হয় না ; চক্ষুর অর্ধিকিউ-লেরিস্ পেশিব (Orbicularis muscles) আক্ষেপ, চক্ষু দিয়া বারবার বেগে জল নির্গমন এবং চক্ষে বড় রকমের ক্ষত ; রাত্রি ছই প্রহর হইতে রাত্রি এটা পর্য্যন্ত বাতনাদির বৃদ্ধি ; চক্ষুর কর্ণির প্রদাহ (Keratitis) ; গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ বাহার দরুণ বাতনাদি রাত্রি ছই প্রহরের পর বৃদ্ধি হয় ; পাখীর ডানা কাড়িলে যেকূপ হয়, বান চক্ষের সম্মুখে স্লেষ্মা ধড়ফড়ানীর স্কার অনুভূত হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে অত্যন্ত বেদনা বা বাতনা, চক্ষু দিয়া জল পড়া ; এই সকল লক্ষণ আধ্বপালীয়া মাথা ব্যাধাতেই অধিক হয় ।

কর্ণ । কানে টন্টন্ শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে এক পেশে মাথা ধরা (চিনিনাম্-সাল্‌ফ্‌) ।

নাসিকা । তরল সর্দি এবং নাক দিয়া প্রচুর স্লেষ্মা নির্গমন ; স্লেষ্মা দ্বারা যেন নাসাবন্ধু ক্রম হইয়া থাকে, ঘরের বাহির হইলে বাহার উপশম হয় ; পুষ্ট এবং রক্ত মিশ্রিত পদার্থ দ্বারা নাসাবন্ধু ক্রম হইয়া থাকে ; ডিপ্-থিরিয়াতে ; নাসাবন্ধুর কোণে ছাল উঠিয়া যাওয়া ; ডিপ্-থিরিয়া (অরাম) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা বা সাদাটিয়া এবং ক্ষীত ও টলটলে যাহা সবিরাম জ্বরেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় (আস্, নেট্রাম্‌মিউর) ; কণ্ঠ মূল এবং হর্যাস্তির নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থির ক্ষীতি ; ওষ্ঠ নীল বর্ণ (ফুস্‌ফুসের ফোটক রোগে,—In Tuberculosis of the Lungs) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা গাঢ় এবং কটাবর্ণের লেপযুক্ত (ডিপ্‌থিরিয়া রোগে), মুখে দুর্গন্ধ (ডিপ্‌থিরিয়া এবং আরক্ত জরে) । আরক্ত জরে গলার মধ্যে অত্যন্ত বেদনা বা ব্যতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চর্ম ফিকা বা সাদাটিবা, শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎ-ভাগের শৈল্পিক ঝিল্লীর শীঘ্র শীঘ্র বিনাশ ; ডিপ্‌থিরিয়া ; মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ; হ্রাস্তির নিম্নস্থিত গ্রন্থির ক্ষতি এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা ; নাসিকা রক্ত মিশ্রিত পুঁথ দ্বারা ক্লান্ত হওয়া ; নাসারন্ধ্রের কোণে ছাল উঠিয়া যাওয়া ; জিহ্বা গাঢ় কটাবর্ণের লেপযুক্ত ; উন্মিলে ধূসর বর্ণের পদার্থের সঞ্চার ঘাটা দূর্বীভূত হইলে আক্রান্ত স্থানে রক্তের তিস্তের আয় ক্ষত বর্তমান থাকে, এই ক্ষতের ধার আবদ্ধ থাকে ; আল্‌জিহ্বার নিম্ন অর্দ্ধাংশ পচিয়া যায় এবং উহার উর্দ্ধ অর্দ্ধাংশ দূষিত পদার্থ দ্বারা আবৃত হয় ; জলাদি তরল পদার্থ গিলিতে অশক্তি ; অত্যন্ত বলক্ষয় ; নিদ্রাশূন্যতা ; নাড়ী ক্ষুদ্র এবং দ্রুতগামী ।

পাকস্থলী এবং উদর । অনিবার্য পিপাসা ; এইরূপ পিপাসা স্বাস রোধ হওয়ার সময় বা যক্ষা কাশাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় ; ভিন্ন এবং মস্ত খাইলেই ব্যতনাত্মক উদরাময় আরম্ভ হয় ; বোগী (জীলোক) ঠাণ্ডা জল খাইতে চাহে না ; বমনোদ্বোগ এবং বমন ও তৎপর নিদ্রা (আণ্টি-টার্) । বাম হাইপোকণ্ড্রিয়াম্ প্রদেশের বিবৃদ্ধি ; উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত (সিবিরাম-জরে) ।

মল । মেনেসিয়া জনিত উদরাময় (চিনিমাম্-সাল্ক) ; মল জল-বৎ তরল, দুর্গন্ধযুক্ত (আস্) এবং ভেদের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রের মধ্যে অত্যন্ত বেদনা ।

মূত্রযন্ত্র । আক্ষেপিক রকমে মূত্রাবরোধ ।

শ্বাসযন্ত্র । স্বরভঙ্গ (ডিপ্‌থিরিয়া রোগে) ; ইহা ব্যবহারে ডিপ্‌থিরিয়া রোগের দূষিত পদার্থগুলি বায়ুনের উপরিভাগে বিস্তৃত হইতে পারে না ; শ্বাস কষ্ট বা ফাঁপড় হওয়া প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত অবস্থিতি করে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠ, হাত এবং নখ নীল বর্ণ হয় ; শ্বাসরোধ হওয়ার সময় রোগী সমুখ পানে বাঁকিয়া, এবং স্তব্ধ হইলে একটা জানলার নিকট বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় (আস্) ; কার্ফো-

(বজ্র),—এই যাতনা অল্প কোন ভাবে বসিলে বৃদ্ধি হয়; শ্বাস কষ্ট এবং তদ্রূপ মনের অত্যন্ত উদ্বেগ বাহ্য যক্ষাক্রান্তিতেই অধিক হইয়া থাকে; বৃদ্ধ বয়সে কতক পরিমাণে পুরাতন আকাবেবর (Sub-acute) সন্ধি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে জ্বর, যাহা রাগিতেই অধিক হয়; বুকের বাম পার্শ্বের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহায়কারী পেশীর পক্ষাঘাত ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্নায়ুশূল (Angina Pectoris) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শোথের লক্ষণ, শিরা গুলিতে, রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং শরীর নীলবর্ণ হইয়া যাওয়া (Cyanosis); হৃৎকম্প; হৃৎস্পন্দন, পৃষ্ঠ দেশের উপর ভর করিয়া হেলিয়া বসিলেই বাগা অল্পভূত হয়, মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন একবারেই অল্পভূত হয় না; হৃৎপিণ্ড অনিয়মিতরূপে কার্য্য করে । নাড়ী ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত দ্রুতগামী, (এমন কি প্রতি মিনিটে ২০০ বারও স্পন্দন করিতে পারে) এবং অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট; বাম স্তন-প্রদেশে স্নায়ুশূলের জ্বর ভয়ানক বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ মনে হয় আক্রান্ত অংশ যেন কেহ গরম চিন্টা দিয়া ছিড়িয়া কেলিতেছে; পাকুরার হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের স্নায়ুশূল ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । হাত এবং নখ নীল বর্ণ; হাত পা বরফের জায় ঠাণ্ডা ।

নিদ্রা । শ্বাসরোধের আক্রমণের পৰ গভীর নিদ্রা; অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল না হওয়া এবং নিদ্রাশূন্যতা ।

জ্বর । সবিসম জ্বর; পৃষ্ঠাংশে শীত হয়, এই নীচ কোন নির্দিষ্ট সময়ে হয় না; কখন কখন প্রতিদিন একবার করিয়া শীত হয়, আবার কখন কখন একদিন অন্তর একদিন হয়; কখন কখন জ্বরের আক্রমণ ঘণ্টা হইয়া শেষ হয় এবং কখন কখন জ্বর শেষ হওয়ার সময় ঘণ্টা একবারেই হয় না; জ্বরের আক্রমণের পূর্বে শিরঃপীড়া, হাততালি এবং গা ভাঙ্গা; শীত যেন চেউয়ের জ্বর নাচিয়া নাচিয়া আইসে এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতা বর্ধমান থাকে; গায়ের লোম খাড়া হয়, নিছানায় থাকিয়া হাত পায়ের পাতা কোন ঠাণ্ডা বস্তুর লাগাইলে বা নাড়িলে, অথবা চলিলে বা উঠার বিপর্য্য চিন্তা করিলে বাহ্য বৃদ্ধি হয়; শীতের পর রাত্রি দুই প্রহরের সময়

জ্বর, নাড়ী পূর্ণ এবং প্রবল ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেওয়ার ইচ্ছা; জ্বরের পর ঘর্ম হয় না, রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে, প্রাতঃকালে মানসিক অবসন্নতা এবং প্রাতঃকালে খাওয়ার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা; প্রবল জ্বর এবং উহার সঙ্গে অত্যন্ত বলক্ষয় (ডিপ্‌থিরিয়া এবং সাংঘাতিক আকারেব আরক্ত জ্বরে); সপুষ্ট অস্ত্রাবরক কিল্লী প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে হৃদীকাজ্বর (Fever in Puerperal Septic Peritonitis); সমুদয় শরীরে ঠাণ্ডা চট্‌চটয়া ঘর্ম।

চর্ম। চর্ম শুষ্ক এবং সাদাটিলা বা কিকা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত নিস্তেজতা এবং বলক্ষয়; কোন কোন নির্দিষ্ট সময়ে ত্রণ এবং ফোড়া, যাহার দরুণ মাথার ব্যতনাদির অনেক হ্রাস হয়।

বাবহার। সবিরাম বা পাণাজ্বর; মেলেরিয়া জনিত সর্বপ্রকারের অস্থ; এক পেশুমাথা ধরা (আপ্‌কপানীয়া মাথা ব্যাথা, -Hemicrania); শিরঃপীড়া; ডিপ্‌থিরিয়া; সাংঘাতিক আকারের আরক্ত-জ্বর; গ্রীবা দেশের স্নায়ুশূল; পাজরার হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের স্নায়ুশূল (Intercostal neuralgia); গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ (Scrofulous Ophthalmia); চক্ষুর কর্ণির প্রদাহ (Keratitis); গলাব মধ্যের সাংঘাতিক আকারের অত; যক্ষাকশাদি ক্ষেটিক বোগ (Tuberculosis); মৃগীরোগের জ্বর আক্ষেপ; বৃদ্ধবয়সে কতক পারমাণে পুষ্কাতন আকারেব সর্দি; সপুষ্ট অস্ত্রাবরক কিল্লী প্রদাহ সম্বলিত হৃদীকাজ্বর (Puerperal Fever with Septic Peritonitis) ইত্যাদি অস্থে আর্সিনিকোইন্‌ অব্‌ কোইনাইন্‌ ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অত্যন্ত বলক্ষয়; মৃগীর জ্বর আক্ষেপ, যাহার আক্রমণের পূর্বে মনে হয় যেন বিজ্ঞানের জ্ঞান কোন পদার্থ মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া গ্রীবার ডাইন অংশদিয়া বাহ্যে বিস্তৃত হয়, এবং তদরূপ মনে হয় যেন আক্রান্ত অংশ বারদাব মোচড়াইয়া পড়িতেছে এবং যাহার দরুণ স্পষ্ট কেড়্‌ কেড়্‌ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়; মুখমণ্ডলের পেশীগুলি যেন আক্ষেপিক রূপে কদিয়া থাকে, দৃষ্টিরোধ এবং বাকরোধ হয়, চেতনা থাকে না এবং রোগী মৃত্তিকায় পড়িয়া যায়; আক্রমণের পর শরীরে ঠাণ্ডা ঘর্ম হয়, বারদাব জোরে উল্কার বা ঢেঁকুর উঠে এবং রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া

পড়ে; রাত্রিতে, রাত্রি দুই প্রহরের পর, প্রত্যহ বা একদিন অন্তর একদিন, তিজ্রা বা শেত্‌শেতিয়া বায়ু বা জল বৃষ্টিতে অস্থাদির বৃদ্ধি : শোণ হওয়ার ধাতু ইত্যাদি আর্সিনিয়েট্ অব্ কোইনাইনের কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আর্সিনিয়েট্ অব্ কোইনাইনের কার্যের সঙ্গে এণিস্, আর্সিনিক্, আরানিয়া, চিনিমাম্-সাল্ফ্, চারনার কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম দশমিক ক্রমের গুড়াই বিশেষ উপকারী, বিশেষতঃ জ্বর রোগে । সপ্তম অস্ত্রাবরক বিষয় প্রদাহ সম্বলিত স্ত্রীকাজরে (Puerperal Fever with Septic Peritonitis), ১ম দশমিক ক্রমের গুড়া, ১ গ্রেইণ্‌ রাত্রায় ব্যবহা করিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় লেখক আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন । অন্ত্যান্ত রোগে ৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুড়া ব্যবহার্য্য ।





# দ্বিতীয় ভাগ ।

## দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔষধ সমূহ

অর্থাৎ

যে সকল ঔষধ প্রথম শ্রেণীর ঔষধ অপেক্ষা কম

ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

আসিডাম্ হাইড্রোসায়েনিকাম্,-হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্,-  
হাইড্রো-আস্

(ACIDUM HYDROCYANICUM.—AC. HYDROC.)

ত্রিটিন্ ফার্মাকোপিয়ায়র মতানুসারে প্রস্তুত করা হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্‌ই আদত হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্ বলিয়া পরিগণিত । যতপরিমাণ হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্ উহাতে তত পরিমাণ রেক্টিফাইড্ স্পিরিট মিশাইলে, ১ম শততমিক ডাইলুশন প্রস্তুত হয় । এই ১ম শততমিক ডাইলুশন (ইহাকে ২য় দশমিক ডাইলুশনও বলা যায়) হইতে যথা নিয়মে ২য়, ৩য় এবং ততোধিক শততমিক বা দশমিক ডাইলুশন প্রস্তুত করা যাইতে পারে । হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্ অতি শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া যায় । অতএব যখন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তখন সদা সদ্য প্রস্তুত করিয়া লইলেই ভাল হয় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মানসিক অবসন্নতা এবং নিরাশা ; মনের উদ্বেগ বা যাতনা ; পাকস্থলীর মধ্যে কষ্টানুভব বা যাতনা ; কাল্পনিক অনিশ্চয়ের ভয় ; অত্যন্ত চিড়্, চিড়্ করা ; হুঃখ ; রাগ এবং কোন প্রকার কার্যে অনিচ্ছা ।

মস্তক । কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার অশক্তি এবং অবসন্নতা ; স্মরণ শক্তির হ্রাস ; মাথায় গোলমেলে এবং ভারি বোধ ; মাথাঘোরা

এবং তদ্রূপ বারবার টলিয়া পড়ার উপক্রম হওয়া ; মাথা বেদনা বাহ্য কঁপালেই অধিক অস্থিত হয় ; মাথার সমুখ ভাগে কদিয়া ধরা এবং মাথার খোঁচা বিধার জ্বায়ে বেদনা বা বাতনা যাহা সকল সময় একস্থানে থাকে না ।

**চক্ষু ।** চক্ষু অন্ধখোলা (শিবচক্ষু) এবং স্থির ভাব বিশিষ্ট, চক্ষুর তারায় বিস্তৃত এবং স্থির ভাববিশিষ্ট বা অচল ও চক্ষুর গোলক পরিচালনে অশক্তি ; চক্ষুর পাতা পক্ষাঘাতের জ্বায়ে বিস্তৃতরূপে খোলা থাকা ; চক্ষুর উপবের পাতার পাখীর ডানা ঝাড়ার জ্বায়ে স্পন্দন বা ধড়ফুড়ানি ; চক্ষে ঝাপ্সা দেখা ।

**কর্ণ ।** ছই কর্ণের মধ্য দেশেই কন্‌কনানি এবং কখন কখন উহাতে সোঁ সোঁ, টন্‌টন্‌ শব্দ হওয়া ; কানে কম শুনা ।

**নাসিকা ।** নাসারক্ষের উপবিভাগে জ্বালা বা চিড়িকমার ; নাকের পাতার বিস্তৃতি এবং উহা নীলবর্ণ হওয়া ; নাসিকার মধ্য শুক ।

**মুখমণ্ডল ।** মুখমণ্ডল গোথের জ্বায়ে টল্‌টলে এবং বুদ্ধ বয়সের জ্বায়ে কোচ্‌কান ও নীলের আভাবিত্ত ; ওঠের কোণের বিকৃতি ; দাঁত লাগা (Lock-jaw) ; মুখমণ্ডলের পেশীর ভয়ানক বিকৃতি ।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য ।** মুখে অতিরিক্ত পরিমাণে লালের সঞ্চার ; জিহ্বা কখন সাদা, কখন বা কাল্‌চে লেপযুক্ত ; জিহ্বার গোড়ার সঙ্কোচন ; জিহ্বা শীতল ; জিহ্বার পক্ষাঘাত ; তালুকায় বেদনা ; গলার মধ্যের পশ্চাৎভাগ এবং আহার বহা গলনালীর অক্ষিপ ; তালুকা, গলার মধ্য এবং আহার বহা গলনালীতে জ্বালাস্থভব ; গলার মধ্য এবং আহার বহা গলনালীর প্রদাহ ।

**পাকস্থলী, উদর এবং মল ।** মুখে নিষ্ঠুরাদ ; ক্ষুধা শূন্যতা এবং আহারে অনিচ্ছা ; সকল প্রকার আহার জ্বায়াই অকৃতি এবং বমন করার ইচ্ছা ; কাল্‌চে তরল পদার্থ বমন । পাকস্থলীতে বেদনা ; পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা বোধ ; পাকস্থলীতে মোচড়ানের জ্বায়ে বেদনা এবং তদ্রূপ অন্তস্থ বাতনা ; পাকস্থলীর আক্ষিপিক সঙ্কোচন এবং উহাতে জ্বালা এবং উষ্ণাশ্ভব ; অপব্য পাকস্থলী এবং অন্ত্রের প্রদাহ ; স্বঃপ্রদেশে দপ্‌দপিয়া বা চিড়িক মারার জ্বায়ে বেদনা ; সমুদর উদর শীতল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন পর্যায়ক্রমে জ্বালাস্থভব ; উদরে গড়্‌গড়্‌, কণ

কল শব্দ হওয়া ; উদর স্ফীত এবং বিস্তৃত, অথচ চাপিলে কোমল বলিয়া অনুভূত হয় ; অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্বক মলত্যাগ ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রাবরোধ ; বারম্বার মূত্রত্যাগ ; প্রচুর পরিমাণে জলের আয় তবল, ফিকা বা ফিকা হরিদ্রা বর্ণের মূত্রত্যাগ এবং উহাতে ঘোলাটিয়া তলানি পড়ে ; গাঢ় এবং লালচে তলানি বিশিষ্ট মূত্রত্যাগ ; অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্বক মূত্রত্যাগ ; মূত্রনালীতে জ্বালামুভব ।

শ্বাসযন্ত্র । কাশি ; কণ্ঠনালীতে টাঁচিয়া ফেলার আয় জ্বালামুভব ; কণ্ঠনালী প্রদাহ (Laryngitis) ; কণ্ঠনালীর স্ফীতি ; গলার মধোর সন্ধোচন ; কণ্ঠনালীতে হুড়্ হুড়ী ; স্বর কৰ্কশ এবং স্বরভঙ্গ ; রক্তোৎকাশ । শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, ঘড়্ ঘড়্ শব্দ বিশিষ্ট ; নিশ্বাস প্রশ্বাস মৃদু এবং বিলম্বে বিলম্বে বহে ; দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগের ইচ্ছা ; শ্বাস প্রশ্বাস গভীর, ঘন ঘন এবং ঘড়্ ঘড়্, সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত ; শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর ; ফুস্ফুসের পক্ষাঘাত ; বৃক্ কষ্টানুভব ; হাঁপানি ; শ্বাস বন্ধ হইয়া ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়া এবং উহা বন্ধ সন্ধে বৃক্ ভয়ানক বেদনা ; বৃক্ আঁটাবোধ এবং উহার সন্ধোচন ; বৃক্ প্রথর বেদনা ; বৃকের ডাইন পার্শ্বে কনকনানি ; হৃৎপ্রদেশে বেদনা এবং অত্যন্ত চাপা বোধ ; হৃৎস্পন্দন এবং হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত স্পন্দন ; হৃৎপিণ্ডের মৃৎস্পন্দন ।

চর্ম্ম । শরীরের নানা স্থানে চুলকানি, টুটি এবং ওঠের মধ্যবর্তী স্থানেই বাহ্যে অধিক অনুভূত হয় ; কুঁচকিতে লাল ব্রণের আয় ফুসুড়ী ; হাত এবং শরীরের অন্যান্য উর্দ্ধাংশে ও গ্রীবাদেশে ফোকার আয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ী ; চর্ম্ম শুষ্ক, চর্ম্ম মৃত দেহের আয় মলিন এবং নীলবর্ণ ।

নিদ্রা । বাবম্বার হাইতোলা এবং উহার সন্ধে সন্ধে শরীরের কম্পন ও চর্ম্মের সন্ধোচন ; অত্যন্ত অনিবার্ণা নিদ্রাবেশ ; আহারের পর নিদ্রার অত্যন্ত ইচ্ছা ; প্রাতঃকালে ঘোর নিদ্রা ; অনবরত নিদ্রার ইচ্ছা ; নিদ্রাশূন্ততা ; অথবা ঘুম হইলেও বাবম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা ; স্বপ্নে মৃত্যু দেখা ।

জ্বর । শীত কম্প, প্রশ্নানতঃ রাত্রি দুই প্রহরের পর ; শীতকম্প, হাইতোলা অথবা উহার সন্ধে সন্ধে পিপাসা ; হাত পা ইত্যাদি ঠাণ্ডা ;

আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক শীত বোধ, প্রথমতঃ শীতকম্প, তৎপর শরীর অত্যন্ত উষ্ণ; মাথা গরম এবং হাত পা ঠাণ্ডা; অপরাহ্নে সমুদয় শরীর উষ্ণ এবং স্বৰ্ণ; জরের সময় হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত স্পন্দন; শীতকম্পের সময় মাথা ঘোরা; কম্পের সময় চক্ষে ঝাপসা দেখা।

ব্যবহার। মৃগী রোগ জনিত মাথা ঘোরা; অল্প কালের মৃগীরোগ; ধূতঠিকার (প্রধানতঃ আঘাত জনিত ধূতঠিকার); হৃৎপিণ্ড বা কাশি; আক্কেপিকুইপানি কাশি; ওলাউঠাতে দুকেব মধ্যে আক্কেপিক আকারের ব্যতনা (অর্থাৎ ওলাউঠার পতনাবস্থায় যেকপ হইয়া থাকে); হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক এবং বাহ্যিক অস্থখ; হৃৎস্নায়ুশূল (Angina Pectoris); পাকস্থলীতে বেদনা এবং বমন; পাকস্থলী এবং অন্ত্রে শূল বেদনার স্তায় বেদনা ইত্যাদি অস্থখে হাইড্রোসায়োনিক্ আসিড্ ব্যবহার্য্য।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। কসেরকা মজ্জার উপর হাইড্রোসায়োনিক্ আসিডের কার্য্য অনেকটা একোনাইট্ এবং দিকুটার স্তায়। মৃগী রোগে ইহার কার্য্য ইনাসি ক্রোকেটার স্তায়।

ডাইলুশন বিচার। ওলাউঠাতে ওয় এবং ঊষ্ঠ দশমিক ডাইলুশনই লেখক সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া বথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। তিনি এই ঔষধ অল্প কোন রোগে কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। অতএব সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলিতে পারেন না। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন, যে হৃৎপিণ্ডকে এবং পাকস্থলীর বেদনাতে, ১ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য এবং উপকারী।

আসিডাম্ মিউরিয়াটিকাম্, মিউরিয়াটিক্ আসিড্,-

মিউর-আস্।

(ACIDUM MURIATICUM, -MURIATIC ACID, -AC. MUR.)

ইহার সাধারণ নাম হাইড্রোক্লোরিক্ আসিড্ (Hydrochloric Acid)। কোন এক বিশুদ্ধ সোডা ও পাতালক ঔষধালয় হইতে আদত মিউরিয়াটিক্ আসিড্ ক্রয় করিয়া উহার ১২ ভাগ, এবং ৪ ভাগ চুয়ান মিল একটা

কাঁচের ষ্টপারদার (Stoppered) শিশিতে ঢালিয়া মিশ্রিত করিয়া যথা নিয়মে ১ম দশমিক ডাইলুশন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১ম শততমিক বা ২য় দশমিক ডাইলুশন চূয়ান অণে প্রস্তুত হয়। ৩য় শততমিক বা ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন পর্য্যন্ত বেক্টিকাইড্ স্পিরিট্ মিশ্রিত চূয়ান জল (২৫ ভাগ চূয়ান জল এবং ৫ ভাগ বেক্টিকাইড্ স্পিরিট্) দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক ডাইলুট্ স্পিরিট্ এবং ৫ম শততমিক ও ততোধিক ক্রমের আরোক বেক্টিকাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্যাংলিয়োনিক্ স্নায়ু মণ্ডল (Ganglionic system of nerves) দিয়া রক্ত, চৰ্ম্ম, এবং আহারবহানলী (Alimentary canal), প্রধানতঃ মুখগহ্বর এবং গুহ্য দ্বারের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দক্ষণ রক্ত বিকৃতিবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উহার জমাট হওয়ার প্রকৃতি বৃদ্ধি পায় এবং সহজেই পচিবীর স্বভাব বা প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের স্নায়িক শৃঙ্খলীর প্রদাহ, ক্ষত এবং তদক্ষণ উহাতে এক প্রকারের ধূসরের আভাসুক্ত সাদা দূষিত পদার্থের সঞ্চার হইয়া থাকে। দুর্বলকারক বা অতিরিক্ত বলক্ষয় এবং পচন বিশিষ্ট বিকারের লক্ষণ আক্রান্ত অরের স্থায় অবস্থা উৎপাদন করা এই ঔষধে একটা বিশেষ প্রকৃতি বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। অচেতনতা (আস্, বেল্, ওপিয়াম্); কৌধানী বা কৌকানী; সন্দেহা খিট্‌খিট্‌ করা, চিড়্‌চিড়্‌ করা এবং বক্ বক্ করার স্বভাব; সহজে রাগান্বিত হওয়ার স্বভাব (ব্রাই, ক্যাম্, নাস্ক্-বম্)।

মস্তক। বহির্বাযুতে মাথাঘোরা এবং চলিবার সময় বারম্বার হেলিয়া উলিয়া পড়া; ছিঁড়িয়া ফেলিলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে অথবা খেঁত-লিয়া গেলে ঘেক্স হয়, মাথায় সেক্সপ বেদনা (কফিয়া); মাথায় পশ্চাৎভাগে ভারি বোধ; ডাইন কানের পশ্চাৎভাগের হাড়ে বেদনা।

কর্ণ। কানে কম শুনা; কানে সামান্য শব্দও লাগে বা সহ হয় না একন্, বেল্, লাইকোপ্)।

**মুখমণ্ডল ।** মুখমণ্ডল, কপাল, কপালের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণের ভায় ফুসুড়ী; সমুদয় মুখমণ্ডল প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে লালবর্ণ হয়; ওষ্ঠের ধারের ছাল উঠিয়া যায় এবং উহার চৰ্ম শুষ্ক এবং কাটাযুক্ত হয়; ওষ্ঠে জালা (একন, আস্) ; নিম্ন মাড়ি ঝুলিয়া পড়ে ।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য ।** জিহ্বা পুরু, নীলের আভাযুক্ত এবং ধূসরের আভাযুক্ত সাদা পর্দার দ্বারা লেপযুক্ত, অথবা উহাতে গভীর ক্ষত, যাহার নিম্ন ভাগ বা ভূমি কাল্চে; জিহ্বায় কোষ্ঠার ভায় কুঙ্কড়ী (লাইকোপ্ নেট্রাম-মিউর) এবং উহাতে জালা; জিহ্বা যেন একখানি সীসার ভায় ভারি বোধ হয়, যাহার দরুণ কথা বলিবার ব্যাঘাত জন্মে; জিহ্বা যেন খাট বা ছোট হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; ওষ্ঠ এবং মুখের মধ্যের শৈল্পিক ঝিল্লী প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ, ছাল উঠিয়া যাওয়ার ভায় ক্ষতযুক্ত এবং বেদনাযুক্ত হয় ও উহার স্থানে স্থানে সাদা দাগ পড়ে; মুখে দুর্গন্ধ; মুখে ঘা (হাইড্রাষ্ট)। গলার মধ্য এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎ ভাগের শৈল্পিক ঝিল্লী গাঢ় কাল্চে লালবর্ণ, ক্ষীত, জালাযুক্ত এবং উহাতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ভায় চড়্‌চড়নি, উহাতে ধূসরের আভাযুক্ত ডিপ্‌থিরিয়ার ভায় সাদা দূষিত পদার্থের সঞ্চার (বাক্-আয়োড্, নাইট্রিক্-আস্, ফাইটোল্); গিলিবার সময় গলার মধ্যে ভয়ানক আক্কেপ এবং তদরুণ ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়া।

**পাকস্থলী এবং উদর ।** পেটে খালি থালি বোধ, আহার করিলেও বাহা দূরীভূত হয় না। উদর পূর্ণ এবং বিস্তৃত (চায়না, হিপ্-সাল্ক); উদরে খিল ধরার ভায় বেদনা বা ব্যতনা; অন্ন বৃদ্ধ (Hernia)।

**মল এবং মলদ্বার ।** প্রস্রাব করার সময় শুষ্ক বাহির হইরা পড়া; শুষ্কদ্বারে আস্রের ভায় ঝোপায় ঝোপায় অর্শ রোগের বলী বাহির হয় (ক্যাক্-কার্ক, লাক্, পাল্‌স্, আলোজ্) বাহা ক্ষীত এবং নীল বা লালবর্ণ হয় এবং বাহাতে জালা এবং টাটানি বর্তমান থাকে; অস্ত্রের জড়তার দরুণ দোষিত (আলাম্); মূত্রত্যাগের সময় অশাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক জলবৎ-তরল মূত্রত্যাগ (হারোস্) এবং তৎপর শুষ্ক দ্বায়ে জালা এবং চিড়িকমারী; রক্ত ভেদ হওয়া।

মূত্ৰযন্ত্ৰ । বারম্বার প্রচুর পরিমাণে মূত্ৰত্যাগ (এপিদ্, আলোসা-  
নাম্, অৰ্জেণ্ট্-মেট) । মূত্ৰাধার এবং উহার এইবার শিথিলভাৱে দৰুণ  
অসাড়ে মূত্ৰত্যাগ ।

জননেন্দ্ৰিয় । পুরুষের স্বৰ্জভঙ্গ (আগ্নিশ্, চায়না, ক্যাস্কাৰ) ।  
স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূৰ্বে অতিরিক্ত রজঃশ্রাব (ক্যাক্-  
কাৰ্ৰ) ; জননেন্দ্ৰিয়ে ক্ষত এবং উহা হঠতে পচা দুৰ্গন্ধযুক্ত ক্লেদ-নিঃসরণ  
ও উহাতে অত্যন্ত টাটানি এবং সার্কাটিক দুৰ্জলতা ।

খাসযন্ত্ৰ । পুরাতনু আকারের স্বৰ্জভঙ্গ ; প্রবল খাসরোধক কাশি  
এবং কাশির আক্রমণের পরই বৃকের মধ্যে যেন ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয় ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে খোঁচা বিধায় ভায় বেদনা  
বা যাতনা ; রাত্রিতে হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা লাগার ভায় প্রবল বেদনা বা যাতনা  
যাহা মুখমণ্ডল পর্য্যন্তও অনুভূত হয় ।

পৃষ্ঠদেশ । অনেককণ বাকিরা বা উপুড় হইয়া থাকিলে, বা কোন  
ভাৱি বস্ত্ৰ উঠাইলে যেক্রূপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেক্রূপ বেদনা বা যাতনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । বাহ্যতে ভাৱিবোধ ; বাহ্যতে  
ছিড়িয়া কেদার ভায় বেদনা বা কনকনানি ; হাতের পাতার পশ্চাৎভাগে  
এবং আঙ্গুলের উপরিভাগে পূৰ্ব্বে এবং চুমটি বিশিষ্ট ফুস্কড়ী ; শিথিবার সময়  
হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর পেশীযুক্ত অংশে খিল ধরার ভায় বেদনা বা যাতনা ।  
হাঁটুর সন্ধির ক্ষীতি ; চলিবার সময় পায়ের ডিমে এবং গোড়ালীতে কসিয়া  
ধরার ভায় বেদনা বা যাতনা ; পায় পচাযুক্ত ক্ষত ; পায়ের পাতা নীতল ।

নিদ্ৰা । রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া বারম্বার জাগিয়া উঠা ; অত্যন্ত  
চিন্তা উৎপাদক স্বপ্ন দেখা ।

চৰ্ম্ম । গায় চুমটী বা মরা চৰ্ম্মের ভায় খোশা বিশিষ্ট ফুস্কড়ী ; পচা-  
ঘা (পায়ের নিম্নভাগে) এবং উহার চতুর্দিকে আলাহুভব ; গায়  
বেদনাযুক্ত বা কষ্টদায়ক গভীর পচাযুক্ত ঘা এবং উক্ত ঘা মরা চামড়ার  
ভায় খোশা দ্বারা আবৃত ।

জ্বর । শীত সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রবল ; শীতলাবস্থায় কম্প, হাইতোলা,  
গভাক্কা এবং পিপাসা না থাকা, তৎপর শরীর উষ্ণ হওয়া ; উষ্ণাবস্থায়

পিপাসা না থাকে এবং অত্যন্ত ছট্ ফট্ করা ও গায়ের কাপড়াদি ফেলিয়া দেওয়া ; নাড়ী অসম (Intermittent) ; রাত্রিতে, সন্ধ্যার সময়, অথবা রাত্রি দুই প্রহরের পূর্বে ঘৰ্ম্ম । মুখে বা সম্বলিত আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার ।

ব্যবহার । মুখে বা বিশিষ্ট জ্বর-বিকার, মৌহক-জ্বর (Typhus Fever) ; আরক্ত-জ্বর ; গলার মধ্যে পচাযুক্ত ক্ষত বা ঘা ; মুখে বা ; মুখে ক্ষত বিশিষ্ট অস্থখ ; গায় পূর্ববিশিষ্ট ফুসুড়ী ; পচাযুক্ত ক্ষত ; অর্শরোগ ; মুখগহ্বরের প্রদাহ ; গণ্ডমালা জনিত অস্থখ ; বধিরতা ; ধ্বজতঙ্গ ইত্যাদি অস্থখে মিউরিয়াটিক আসিড্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বেদনা বা যাতন, বিশ্রাম কালীন যাহার উদ্বেক বা বুকি হয় এবং নড়াচড়াতে যাহার উপশম হয় ; উরুদেশের দুর্বলতা, যাহার দক্ষণ চলিবার সময় পা কাঁপে ; থেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে ঘেরূপ হয়, সমুদয় সন্ধিতে সেরূপ বেদনা ; অত্যন্ত বলক্ষয় ; হাত পা শীতল ; 'আত্ম' বাত্যাগাদি সম্ভ হয় না ; জিহ্বা এবং গুহ্বারের সঙ্কোচক বস্তুর (Sphincter ani) পক্ষা-ঘাত ; জ্বর রোগে মুখে বা ইত্যাদি মিউরিয়াটিক আসিডের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । মিউরিয়াটিক আসিডের কার্যের সঙ্গে নাইট্রিক আসিডের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আর্সিনিক্, ব্যাপ্টিসিয়া, পালমেটোলা, রান্-টল্, আমোনিয়াম্ কার্ক, ক্যাক্সেরিয়া কার্ক, লাইকোপডিয়াম্, ফক্ষ-রাস, সিপিয়া এবং সাল্ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ব্রাইওনিয়া এবং ক্যান্সার মিউরিয়াটিক আসিডের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । অধিক মাত্রায় মিউরিয়াটিক আসিড্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে কার্বোনেট্ অব্ সোডা, কার্বোনেট্ অব্ লাইম, অথবা ম্যাগনেসিয়া ব্যবহার্য্য ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ২য় এবং ৩য় ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন চিকিৎসক ৬ষ্ঠ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন । জ্বর বিকাবে, বিশেষতঃ মুখে বা থাকিলে লেখক ১ম



ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। অত্যন্ত অল্পে তিনি ওয় ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহার করেন।

## সিমিসিফিউগা রেসিমোসা,—সিমিসিফ্ ।

(CIMICIFUGA RACEMOSA,—CIMIC.-RACE.)

সিমিসিফিউগার অপরা নাম আক্টিয়া রেসিমোসা (Actaea Racemosa)† আমেরিকাস্থ ক্যানডা, জর্জিয়া এবং পশ্চিমাঞ্চলের আবৃত এবং পার্বত্য স্থানে এই গাছ জন্মে। শুকনা মূল বা শিকড় দিয়া যথানিয়মে প্রক্ স্পিরিট দ্বারা ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেবকা মৰ্জ্জা দিয়া ইহা সমুদয় স্নায়বিক মণ্ডলীকে আক্রমণ করিয়া উহার নিস্তেজতা বা অবসন্নতা উৎপাদন করে এবং প্রকারান্তরে পেশী এবং স্ত্রী জননেক্রিয় আক্রমণ করিয়া আক্রান্ত অংশের বাত এবং স্নায়ুশুলের স্তায় অনেকানেক অসুখ উৎপাদন করে। ইহা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক মৃদু করে এবং ধমনীয়া বিস্তৃতির শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহা দ্বারা প্রথমতঃ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হয়, যাহার দরুন মাথাঘোরা, চক্ষুর তারার বিস্তৃতি এবং বেলাডোনার স্তায় অত্যন্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু বেলাডোনার স্তায় ইহাতে লক্ষণাদি অধিক প্রবল হয় না। মনের উদ্বেগ এবং স্নায়বিক উত্তেজনা উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রকৃতি, শুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । নিৰ্জনে বাস করার ইচ্ছা (চায়না, ম্যাগ্নিউর, নাক্স-বম) ; রোগী (স্ত্রীলোক) বলে যেন তাহার জ্ঞান বুদ্ধি শীঘ্রই লোপ পাইবে (ক্যাক-কার্ক) ; দুঃখিত এবং বিরক্ত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ (ইগ্নেনস্) ; মানসিক অবসন্নতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করার ভাব বা ইচ্ছা ; স্নায়ুশূল স্ফারাম হওয়ার পর উন্মত্ততা ; অনবরত নানা বিষয়ে কথা বলা (ল্যাক) ;

সুগুণ্ডর (একন্, আন্, আঘাশ, নাইট্রিক-আন্); কোন বিষয়েই মন-  
যোগ দিতে ইচ্ছা হয় না (এথুজা, জেলস্, নাক্স-বম্, ফন্-আন্); অত্যন্ত  
চিড়্‌চিড়ে স্বভাব; সামান্য কারণেই রাগ হওয়া (ক্যাম)।

**মস্তক।** মাথাঘোরা, মাথা বড় এবং উহাতে ভারিবোধ হয় (জেলস্);  
মাথার সমুখ ভাগে ঘৃশ্‌ঘৃশে বেদনা, চাপিলে যাহার উপশম হয়; মাথা  
এবং চক্ষুর গোলকে প্রবল বেদনা, সামান্য নড়াচড়াতেই যাহার বৃদ্ধি হয়  
(ব্রাই); মাথার উপরিভাগে বেন ফাটিয়া পড়িয়া যাইবে একরূপ অস্থিত হয়;  
মাথা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক বড় বলিয়া অস্থিত হয় এবং উহাতে দগ্ধপ্  
করে (জেলস্, গ্লোনয়েন্); মাথাঘোরা এবং মাথার উপরিভাগে পূর্ণরোধ এবং  
কন্কনানি; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (বেল); মস্তক স্বাভাবিক  
অপেক্ষা বড় বলিয়া অস্থিত হয় (অর্জেন্ট-নাইট্রিক্, গ্লোনয়েন্); অপরাহ্ন  
এবং সন্ধ্যার সময় মাথার পশ্চাৎভাগে কন্কনানি বা ঘৃশ্‌ ঘৃশে বেদনা বা  
যাতনা, ঘরের মধ্যে থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং বহির্বাযুতে গেলে যাহার  
উপশম হয়; সমুদয় মস্তকেই বেদনা বা যাতনা, মাথার পশ্চাৎভাগেই যাহা  
অধিক অস্থিত হয় এবং উক্ত প্রদেশে স্পষ্ট টাটানি; মাথার ডাইন পার্শ্বে  
এবং চক্ষুর কোটির পশ্চাৎভাগে অত্যন্ত প্রখর বেদনা; বহির্বাযুতে মাথা  
বেদনার উপশম।

**চক্ষু।** চক্ষুর গোলকে প্রবল কন্কনানি, মাথা ও চক্ষু সঞ্চালনে  
যাহার বৃদ্ধি হয় (আলোজ্, স্পাইজেন্); চক্ষুর তারা বিস্তৃত এবং চক্ষুর  
সমুখে যেন কাল দাগ ভাসে।

**কর্ণ।** সামান্য শব্দও যেন কানে লাগে (একন্, বেল, ব্রাই); প্রথমতঃ  
বাম কানে এবং তৎপর উভয় কানেই গানের শব্দের জ্ঞান বা সোঁ সোঁ শব্দ  
হয় (চায়না)।

**মুখমণ্ডল।** মুখাকৃতি পাগলের জায় ভয় উৎপাদক ভাব বিশিষ্ট;  
কপাল ঠাণ্ডা; মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা, চক্ষু বড়, বসিয়া বার এবং কাল্‌চে  
রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়; গালের মেলার অস্থির (Malar bone) উপস্থিত  
নামূল্য যাহা রক্তিতে দ্রবীভূত হইয়া পর দিবস পুনরায় আরম্ভ হয়; বারবার  
মুখমণ্ডলে উচ্ছাস্তব, যাহার দক্ষণ দোণী সর্বদা বহির্বাযুতে থাকিতে চাহে।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখে হর্গক; জিহ্বা কিকা কটা-  
বর্ণ, প্রধানত: জিহ্বার মধ্যভাগ; মুখগহ্বর এবং জিহ্বা শুক এবং উষ্ণ;  
আহারবহা গলনালীর উপরি ভাগে পূর্ণ বোধ (জেলস); গলার মধ্যের  
স্থানে স্থানে শুকাহুভব, বাহার দরুণ কাশির উল্লেখ হয়; থক থক করিলেই  
গলা দিয়া আটাল তামার স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গত হয় (আর্জেস্ট-  
নাইট্রাশ্)।

পাকস্থলী এবং উদর । বমনোদ্বগ, উল্কার উঠা, মাথা ঘরা  
এবং শরীরের কম্পন (জীলোকেরই এই সকল লক্ষণ অধিক হয়); সমুদ্র  
পদার্থ বমন; পাকস্থলীতে অত্যন্ত প্রথর বেদনা; উদরোচ্চ প্রদেশ পড়িয়া  
বাওয়ার ভায় অল্পভূত হয় (ম্যাপ্ট, হাইড্রাষ্ট, ইগনেস, পিটোন্, সিপিয়া,  
সালফ, বাইবার্ম)। মধ্যমধ্যে উদরে শূল বেদনার ভায় বেদনা, হাঁটু  
গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিলে বা মলত্যাগের পর বাহার বৃদ্ধি হয়  
(কলোস); অস্ত্র, কোমরের পশ্চাৎভাগ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভয়ানক কষ্টদায়ক  
বেদনা; উদরের পেশীগুলি টাটায়।

মল । পর্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ (আর্জি-ক্লড,  
আরোভ, নাক্স-বম); বারম্বার তরল কালচে দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ (আস)।

মূত্রযন্ত্র । অনবরত অসাড়ে মূত্র নির্গমন; মূত্রকোষ এবং পৃষ্ঠদেশে  
চাপিয়া ধরার ভায় বেদনা বা যাতনা।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের জরায়ু প্রদেশে অত্যন্ত টাটানি (এপিস,  
বেল, ল্যাক); অনিয়মিতরূপে, নিয়মিত সময়ের অনেক পর, রক্তস্রাব বা  
একবারে রক্তস্রাব (পাল্‌স, সেনিসিস্ত, সিপিয়া); নিয়মিত সময়ের অনেক  
পূর্বে, প্রচুর পরিমাণে কালচে চাপ চাপ, থানা থানা রক্তস্রাব; রক্তস্রাবের  
সময় মৃদী বা হিষ্টিরিয়া রোগের ভায় আক্ষেপ; জরায়ু প্রদেশে বেদনা, বাহা  
এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে সঘনিয়া পড়ে; উদরে আড়াআড়ি প্রবল  
বেদনা, বাহার দরুণ রোগী হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়;  
পেটে প্রসব বেদনার ভায় বেদনা (ক্যাম্, নাক্স-মক্); বাতাক্রান্ত কষ্টকর  
রক্তস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation), বাহার  
দরুণ রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে বাধ্য হয়; কষ্টকর

রক্তাশ্রাব এবং রক্তের সঙ্গে পর্দার ভাষ পদার্থ নির্গমন; ডিম্বকোষ প্রদেশে বেদনা যাহা উপরের দিকে সরিয়া পড়ে; জরায়ু এবং কোমরের পশ্চাৎদেশে নিম্নদিকে ঠেলিয়া নামার ভাষ বেদনা বা টন্ টন্ করার ভাষ বাতনা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভারি বোধ এবং উহার জড়তা (আলোজ্, পাল্‌স্, সিপিয়া); তল-পেটে প্রবল বেদনা; শ্বেত প্রদর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে ভারি বোধ (সিপিয়া); গর্ভাবস্থায় বমনোদ্বেষ্ট এবং মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম প্রসব বেদনা (জেল্‌স্, সিকেল্‌); নিভ্রাশূত্ৰতা (কফিয়া); প্রসব বেদনা আরম্ভ হওয়ার সময় শরীর কম্পন (একন্‌); অতি প্রবল এবং আক্ষিপিক আকারের ক্ষুৎসাদিশূল; প্রসব বেদনার সময় জরায়ুর মুখ শক্ত থাকে বা শীঘ্র মুখ খোলে না (বেল্‌, জেল্‌স্); সম্ভান প্রসবের পর পেটে বেদনা যাহা কুঁচকি প্রদেশেই অধিক অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটের অত্যন্ত টাটানি, বমনোদ্বেষ্ট বা বমন; ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রসবের পর জরায়ু হইতে ক্লেন (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হওয়া; সম্ভান প্রসবের পর উন্মত্ততা (Puerperal Mania) (হারোল্‌); স্তনের নিম্নভাগে বেদনা, বাম স্তনের নিম্নভাগেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; স্তনে জ্বালাভূতব।

শ্বাসযন্ত্র । রক্তিতে অনবরত শুষ্ক, কণ্ঠস্থায়ী কাশি (আলাম্‌, হারোল্‌, পাল্‌স্); গলার মধ্যে ফুড়্‌ফুড়ী এবং তদ্রূপ প্রবল কাশি; বুকের ডাইন পার্শ্বে বেদনা, যাহার দরূপ রোগী চীৎভাবে শয়ন করিয়া আক্রান্ত স্থান হাত দিয়া চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হয়; এই বেদনা নড়াচড়াতে বৃদ্ধি হয় (বেল্‌, ড্রাই, মার্‌ক্‌, ফন্‌)।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশ হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া বুকের নিম্নভাগ এবং বাম বাহু পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া হৃৎস্পন্দন আরম্ভ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, হাতে শীতল ঘর্ম এবং বুকের পার্শ্বে বাঁধিয়া রাখিলে ঘেরূপ হয়, বাম হাতে সেরূপ অবশ্য বোধ হয়। নাড়ী দুর্বল এবং অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশের পেশীতে বাতের বেদনার ভাষ বেদনা, যাহার দরূপ ঘাড় বা পৃষ্ঠদেশ নোয়ান যায় না (রাস্-টক্স) এবং হাত সকলন করিতে কষ্টানুভূত হয়; কসেককায় বেদনা বা টাটানি

যাহা ষাড় এবং পৃষ্ঠদেশের অংশেই অধিক অম্লভূত হয় ; মাথা এবং ষাড় যেন খাট হয় ; ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া ষাড় নোয়ান যায় না (ডাক্ ), বাহ্যিক দরুণ হাত সঞ্চালন করিতে কষ্ট অম্লভূত হয় ; কোমর এবং গুহ্বারের ঠিক উপরিভাগে প্রবল কন্কনানি (টিক্সান্স), যাহা কুঁচকি হইতে উৎপন্ন দিয়া নিম্নদিকে বিতৃত হয় ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । বায়বাহ্যিক অনিচ্ছাপূর্বক অনবরত এলোমেলো সঞ্চালন, যাহার দরুণ উক্ত বাহ্যিক সঞ্চালনের শক্তি থাকে না ; সন্ধিক্ষেপে বাতরোগের দ্বারা বেদনা এবং আক্রান্ত সন্ধির ক্ষতি ও উহাতে উৎক্লেশ্তব (ব্রাই) ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কন্কনানি ; পেশীতে অত্যন্ত টাটানি (আর্গিকা) ; পেশীর মোটা অংশই (Belly) বেদনা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয় ; লিখিবায় সময় হাতের আঙ্গুল কাঁপে ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন, বাহ্যিক দরুণ চলিয়া বেড়ান স্থকঠিন হইয়া পড়ে ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অস্থিবোধ, বাহ্যিক দরুণ রোগী ছটফট করে এবং অস্থির হইয়া পড়ে ।

নিদ্রা । অত্যন্ত নিদ্রাশূন্যতা (কফিয়া, ওপিয়াম) ; ঘুমের ঘোরে বিরক্তি জনক বা চিন্তা উৎপাদক স্বপ্ন দেখা ; অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল না হওয়া ।

ব্যবহার । জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হেতু হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত এবং নারিক ধাতু বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের বাত রোগ ; স্নায়ুশূল ; কোরিয়া (Chorea) এবং অজ্ঞাত নারিক অস্থি ; মদোন্মত্ততা (Delerium Tremens) ; মানসিক অস্থি ; মস্তিষ্ক এবং কসেরিকা মার্জাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Cerebro-Spinal Meningitis) ; কসেরিকা উত্তেজনা (Spinal-irritation) ; স্নায়ুশূল ; কুঁচকিবাত ; মৃগী রোগ ; হিষ্টিরিয়া ; বাত রোগ ; পেশীবাত ; কৃত্রিম ফুফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ বা প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) ; স্থিতিকা অর ; কষ্টকর রজঃপ্রাব এবং বাধকের বেদনা ; (Painful-menstruation) ; রজঃরোধ ; স্বেদপ্রদর ; ডিম্বকোষ প্রদাহ ইত্যাদি অস্থি সিমিসিফিউগা রেসিমোসা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । পেশীর দুর্বলতা, কম্পন এবং আক্কেপিক সঞ্চালন ; সমুদয় শরীরের নারিক কম্পন ; আক্কেপ দ্বারা অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ একবার প্রসারিত এবং একবার সঙ্কুচিত হয়; জ্বীলোকের ডিম্বকোষ এবং জরায়ুর অস্থিখের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের নানা স্থানে ছুঁচী বিধানের ভ্রায় প্রথর বেদনা; বাম পার্শ্বই অধিক আক্রান্ত হয়; বেদনাদি হঠাৎ রোগীকে আক্রমণ করে; শরীরের নানা স্থানে বিদ্যুতের ধাক্কা লাগার ভ্রায় অস্থুভূত হয়; মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁৎলিয়া গেলে ঘেঁকপ হয়, সমুদয় শরীরে সেরূপ বেদনা বা যাতনা অস্থুভূত হয়; জ্বীলোকের শেষ রজঃরোধের সময় সমুদয় অস্থুখে বিশেষ উপযোগী (গ্যাক্, পাল্‌স্); চিন্তা এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু স্নায়বিকতা; সমুদয় শরীরে, প্রধানতঃ বাহ্যেত, অবশবোধ; প্রাতঃকালে, স্নাত্তিতে, নড়াচড়াতে, রজঃস্রাবেত সময় অস্থুখেত বৃদ্ধি; বিশ্রামে, বহিঃব্যয়তে এবং আহারের পর অস্থুখেত উপশম; বাম স্তনের ঠিক নিম্নভাগে বেদনা ইত্যাদি সিমিসিফিউগা রেসিমোসার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ।** জরায়ুর উপর সিমিসিফিউগার কার্য্য কলোফিলাম্ এবং সিকেল্ কণ্‌টামের ভ্রায়। বাত রোগে ইহার কার্য্য অনেকটা একোনাইটের ভ্রায়। স্নায়বিক মণ্ডলের উপর ইহার কার্য্য কতকটা একোনাইট্ এবং ইগ্‌নেসিয়া'র ভ্রায়; কম আঁশাল পেশীর এবং রক্তের উপর ইহার কার্য্য অনেকটা ডিজিটালিস্ এবং সিকেল্ কণ্‌টামের ভ্রায়। এতদ্বিন্ন ইহার কার্য্যের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আর্গিকা, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, বেলাডোনা, জেল্‌সমিনাম্, হায়োসায়েরমান্, লিলিয়াম্ টাই-গ্রিনাম্ এবং পাল্‌সেটিলার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

**প্রতিষেধক ঔষধ।** একোনাইট্, ব্যাপ্‌টিসিয়া, কলোফিলাম্, জেল্‌সমিনাম্, পাল্‌সেটিল ইত্যাদি সিমিসিফিউগা রেসিমোসার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

**ডাইলুশন বিচার।** ১ম, ২য়, ৩য় দশমিক ক্রমই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও অনেক চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেক সময় দু'ল আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায়, ব্যবহার করিয়া মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়।

## ইস্কুলাস্ হিপোকাস্টেনাম্,—ইস্কুল্-হিপ্

(ÆSCULUS HIPPOCASTANUM,—ÆSC. HIP.)

ভারতবর্ষেব উত্তরাঞ্চলে এবং উত্তর আমেরিকায় এই গাছ আছে। ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড এবং ফ্রান্স্ দেশে বাগানাদিতে এই গাছ অনেকে রোপন করিয়া থাকে। পাকা ফলের বিচিত্র শাপ বথানিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার মূল আবোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার গুঁড়াই সূক্ষ্ম শবীরে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। অতএব ডাক্তার হিউজেস্ মতে ইহার গুঁড়া আরোক অপেক্ষা অধিক উপকারী। আমরা এতদেশে আরোক ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকি।

সাধারণ ক্রিয়া। যকৃত এবং পিত্তনিসারক শিরাদির উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দ্রুণ উক্ত যন্ত্রাদিতে রক্তাবরোধ হইয়া প্রতি ক্রিয়াতে অঙ্গের কোলন (Colon) নামক অংশ, শুষ্ক এবং শুষ্কতারের স্লেয়া জনিত প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া হিমারয়েডেল্ শিবাগুলিতে অত্যন্ত রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হয় এবং তদ্রূপ প্রবল আকারের অর্শ রোগ উৎপন্ন হয়। কোমর এবং শুষ্কতারের ঠিক উপরিভাগে প্রবল কন্কনানি বা বেদনা উৎপাদন করা ইস্কুলাসের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যোপরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্বদা বিমর্ষভাব; মানসিক অবসন্নতা এবং চিড়্‌চিড়ে বা খিট্‌খিটে স্বভাব (ব্রাই, নাক্স-বন্. ক্যাম্); কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট করার অশক্তি।

মস্তক। কপালে ঘুশ্‌ঘুশে চাপা বোধ; সামান্য বমনোদ্বেগ এবং উহার তৎক্ষণাৎ পর তলপেটের ডাইন পার্শ্বে সূচী বিধানের ভ্রায় বেদনা বা যাতনা (ব্রাই); মাথায় গোলমালে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা; কপালের দুই পার্শ্বেব মধ্য দিয়া স্থানে স্থানে বেদনা; মাথার পশ্চাৎভাগ, গ্রীবা এবং স্কন্ধে বারম্বার দম্কা উচ্চাত্তব।

**চক্ষু ।** চক্ষে ভারিবোধ এবং চক্ষু গোলকে টাটানি ও উন্মাদ-  
ভব; বাম চক্ষু উপরিভাগে অত্যন্ত কনকনানি বা বেদনা; পাখীর ডানা  
কাড়িলে যেরূপ হয়, চক্ষুর সম্মুখে সেকরূপ ধড়ফড় করার স্থায় অস্তিত্ব হওয়া  
(সাইক্লেমেন) ।

**নাসিকা ।** নাকের গোড়ার পশ্চাৎভাগে এবং কোমল তালুকার  
হল ফুটানের স্থায় বেদনা এবং অগ্নিভব; নাকের গোড়ার পশ্চাৎ-  
ভাগেও শুষ্কভব ।

**মুখমণ্ডল ।** মুখমণ্ডল দিকা বা শিটা এবং অত্যন্ত রুগ্ন (আস্);  
মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বের স্থানে স্থানে লালবর্ণ এবং উহাতে দম্কা উন্মাদভব ।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য ।** জিহ্বা সাদা বা হরিদ্রা বর্ণের  
লেপযুক্ত (ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্); মুখে হরিদ্রা বর্ণের লালবর্ণ স্থায় শ্লেষ্মার  
সঞ্চার; মুখে মিষ্ট স্বাদ (মার্ক্, সাল্‌ফ্); মুখে তিক্ত স্বাদ (একন্, চায়না,  
কলোন, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্); মুখে তীব্র স্বাদ (মার্ক্,  
সাল্‌ফ্); ছাল উঠিয়া ক্ষত হইলে যেরূপ হয়, জিহ্বায় সেকরূপ অস্তিত্ব  
হয়, (এপিস্, আইরিস্, পাল্‌স্, সিপিয়া) । ঠাণ্ডা বা সর্দি লাগিলে যেরূপ হয়,  
গলার মধ্যে সেকরূপ শুক এবং খশ-খশে (অথবা ছাল উঠিয়া যাওয়ার স্থায়)  
জ্বালা অস্তিত্ব হয় (একন্, আলান্); মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগের সঙ্কোচন;  
মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে শ্বাসশূন্যের স্থায় বেদনা বা যাতনা ।

**পাকস্থলী এবং উদর ।** প্রবল বমন (আন্টি টার্ট্, ইপিকাক্);  
পাকস্থলীতে অত্যন্ত জ্বালা এবং যাতনা (আস্, ক্যাস্, আইরিস্, ফস্);  
একখানি পাথর চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেকরূপ তাপা বোধ  
(একন্, আস্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্); কাঠ উদ্গার বা উদ্গারে দূষিত  
বায়ু উঠা। তলপেটের ডাইন পার্শ্বে অত্যন্ত টাটানি (ব্রাই, চেলিডন্,  
মার্ক্, চায়না); যকৃত এবং উদ্গোৰ্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত যাতনা (চেলিডন্,  
নাক্স-বম্); পাকস্থলী হইতে যকৃতের ডাইন অংশ পর্যন্ত অনবরত কন্-  
কনানি বা বেদনা; স্পর্শনে উদর অত্যন্ত টাটায় বা বেদনায়ুক্ত হয়; শুষ্ক-  
তার দ্বারা উৰ্দ্ধাভুক্ত দূষিত বায়ু (Erlatus) নিঃসরণ; উদরে গড়গড়, কল  
কল শব্দ হয় ।



মল এবং মলদ্বার । ছোট ছোট কাটি বা চৌচ বিধিয়া বা লাগিয়া থাকিলে ঘেৰুপ হয়, শুষ্ক মধো সেরুপ শুষ্ক এবং অসুবিধা বোধ ; শুষ্কদ্বায়ে চড়্, চড়ানি, জালা, চুলকানি এবং উহাতে পূর্ণ বোধ ; অর্শের বলী (Tumour) গুলি চিনের বাদামের জায় ও বেগুনি রঙের এবং উহাতে কষ্টদায়ক জালাহুভব ; অন্ধ-অর্শ (Blind Piles) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরে কন্কনানি ও উহা সঞ্চালনে অশক্তি, অথবা উহাতে খোঁচানিধার জায় বেদনা বা যাতনা ; মল শুষ্ক এবং অত্যন্ত কঠিন ও অতি কষ্টে নির্গত হয় (ব্রাই) ; অথবা মল তরল হটলেও উহা নির্গত হওয়ার সময় শুষ্কদ্বায়ে অত্যন্ত জালা টন্টনানি বা চড়্চড়ানির উদ্বেক হয় ।

মূত্রযন্ত্র । বারবার অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ (একনু, ক্যাস্, কলোস্, ডিজিট) ; মূত্র কালচে এবং কাদাটিয়া ও উহাতে গাঢ় কটাবর্ণের তলানি পড়ে ; মূত্র হরিদ্রা বর্ণ (আম্বা) এবং উহাতে গাঢ় স্লেমা তলানি পড়ে (বার্বেরিস) ;

জননেন্দ্রিয় । স্ত্রীলোকের গাঢ়, কালচে, ক্ষতকারক শ্বেত প্রদর নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠদেশ ও শুষ্কদ্বারের ঠিক উপরিভাগের সন্ধিতে কন্কনানি এবং উহা সঞ্চালনে অশক্তি ।

শ্বাসযন্ত্র । ক্ষণস্থায়ী কাশি, গিলিবার সময় অথবা দীর্ঘ নিশ্বাস প্রশ্বাসে যাহার বৃদ্ধি হয় ; বুকের মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জায় অসুভূত হয় (আম্বা, ফন্স, ক্রমেজ) ; বুকে আঁটা বোধ ।

হৃৎপিণ্ড । অর্শরোগ হেতু হৃৎপিণ্ডের কার্য্য সম্বন্ধীয় (Functional) অসুখ ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশে অববর্ত্ত কন্কনানি যাহা কুঁচ্কির সন্ধি এবং শুষ্কদ্বারের উপরিভাগের সন্ধি পর্য্যন্তও আক্রমণ করে, চলিয়া বেড়াইলে বা মাথা হেট্ করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় (সিমিসিক্) ; চলিবার সময় পৃষ্ঠে যেন কোন শক্তি থাকে না ; চলিবার সময় কোমরের পশ্চাৎভাগে এবং কুঁচ্কির সন্ধিতে ছিড়িয়া ফেলার জায় বেদনা ; ছই স্বচ্ছের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কন্কনানি ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । ডাইন স্বচ্ছাঙ্কিতে (চেলিডন্),

এবং বুকের ডাইন পার্শ্বে বেদনা, নিম্নাস টানিবার সমস্ত বাঁহার বৃদ্ধিহীন (ব্রাই); পা অত্যন্ত দুর্বল, বাহার দ্রুণ (স্ট্রীলোক) রোগীর চলিবার শক্তি থাকে না।

**ব্যবহার।** সর্দি; যকৃতের রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; কোষ্ঠবদ্ধ; অজীর্ণ; পাকস্থলীতে বেদনা বা যাতনা; গুহ্বদ্বার বাহির হইয়া পড়া (Prolapsus Ani); অর্শরোগ; শ্বেত প্রদর ইত্যাদি অস্ত্রুখে ইঙ্কুলাস্ হিপো-কাষ্টেনাম্ ব্যবহার্য্য। গুহ্ব এবং গুহ্ব দ্বারে অনবরত জালা, টাটানি, চড়-চড়ানি, অজীর্ণ বা পেট গরম হইয়া তরল ভেদ হইলেই বাহার বৃদ্ধি হয়, অন্তর্বলী ও বহির্বলী বিশিষ্ট বহুকালের অর্শ রোগে কলিকাতাস্থ হাইকোর্টের একটি উকীল মহাশয়ের চিকিৎসায় ইঙ্কুলাসের ২য় দশমিক ক্রমের আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রার প্রতি দিন ৩ মাত্রা করিয়া সেবনে এবং ইঙ্কুলাসের মূল আরোকের ৫ ফোঁটা, ২ কাঁচা ওলিভ অয়েল মিশাইয়া মল ত্যাগের পূর্বে এবং পরে গুহ্বদ্বারে লাগাইয়া, ২ সপ্তাহ কাল মধ্যে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। এমন কি এইক্ষেণে তাঁহার অর্শরোগ আছে কি না রোগী তাহা কিছুই টের পান না।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।** বাহ, পা এবং মেরুদণ্ডে পক্ষাঘাতের জ্বর অবশ্যবোধ; সর্বদা শরীরে অবসন্ন এবং শ্রান্তিবোধ (আলাম, চার্নন', সাল্ফ); অনবরত হাই তোলা এবং গা ভাসার ইচ্ছা বা স্বভাব; অতিরিক্ত পরিমাণে ব্রত দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে সমুদ্র যন্ত্রে এক্রপ অমুভূত হয়; শৈল্পিক কিল্লীতে শুকানুভব এবং উহার ক্ষতি; অর্শরোগ এবং উহার দ্রুণ গুহ্বদ্বার এবং গুহ্ব অনবরত জালা, টাটানি, চড়-চড়ানি, তরল ভেদ হইলেই বাহার বৃদ্ধি হয়; পাকস্থলীর অস্ত্রুখ, পিত্তাধিক্য এবং শৈল্পিক ধাতুর পক্ষে বিশেষ উপকারী; প্রাতঃকালে, নড়াচড়াতে, চলিলে, দীর্ঘনিম্বাস গ্রন্থাসে, আহারের পর, গিলিবার সমস্ত অস্ত্রুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি ইঙ্কুলাস্ হিপো-কাষ্টেনামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

**সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ।** ইঙ্কুলাস্ হিপোকাষ্টেনামের কার্য্যের সঙ্গে ইঙ্কুলাস্ মাত্রা, আর্সিনিক্, আলোজ্, ব্রাইওনিয়া, কলিমনিয়া, টেগ-নেসিয়া, মার্কিউরিয়াস্ নাইট্রিক্ অসিড্, নাক্স-বমিকা, পডোফিলাম্ এবং সাল্ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন চিকিৎসক ইহার ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন । অর্শরোগে ২য় দশমিক ক্রমই লেখক সচরাচর ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন । ইঙ্কুলাসের মূল আরোক ৫ বা ১০ ফোঁটা, ১ আউন্স ওলিভ্ অএলে (Olive oil) মিশাইয়া একটা কর্ক অঁটা শিশিতে ভালরূপে ঝাকিয়া মিশাইয়া অঙ্গুলীতে লইয়া মলভ্যাগের পূর্বে এবং পরে গুহ্ব দ্বারে লাগাইলে অর্শরোগ এবং অর্শরোগ সম্বলিত গুহ্ব ফাটা (Fissure in the Anus) রোগের বেদনা, যাতনা, টাটানি এবং চড়্ চড়ানির বিশেষ আশু উপশম হইতে দেখা যায় । এবিষয় পূর্বেই এই ঔষধের “ব্যবহার” নামক শীর্ষে লিখিত হইয়াছে ।

আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্,—ক্রুড্ আণ্টিমোনি,—

আণ্টি-ক্রুড্

(ANTIMONIUM CRUDUM,—CRUD ANTIMONY,—ANT. CRUD. )

কোন এক বিষমত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে ক্রুড্ আণ্টিমোনি ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে উহাতে জুগার অব্ মিক্ মিশাইয়া ইহার ৩য় শত-তমিক ক্রম পর্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ইহার ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক হইতে যথা নিয়মে ৫ম এবং ততো-ধিক শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । সমুদয় প্লেগ্মিক ঝিল্লী এবং চর্ম্মের উপরই ইহার কার্য অতি প্রবল ; তন্মধ্যে অগ্রেব প্লেগ্মিক ঝিল্লীর উপরই ইহার কার্য সর্বাধিক প্রবল, বাহার দ্রুণ উক্ত প্লেগ্মিক ঝিল্লী বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উহার শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে ; উহার প্রদাহ উৎপন্ন হয় না বটে, কিন্তু উক্ত প্লেগ্মিক ঝিল্লীতে প্রচুর স্লেথার সঞ্চয় হয় এবং তদ্রূপ পরিণাম কার্যের ব্যাঘাত জন্মে । জিহ্বা জ্বরের ত্রায় সাদা গাঢ় লেপযুক্ত করা আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডামের একটা বিশেষ প্রকৃতি বলিয়া পরিগণিত ।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন ।। প্রলাপ বলা, নিদ্রাবেশ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে (শিশুর) বমনোদ্বেষ্ট, মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং লালবর্ণ, নাড়ী অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট ; শরীর জ্বরের দ্বারা উষ্ণ ; ঠাণ্ডা জলে স্নান করণের সময় কাঁদা, গরম জলে স্নান করাইলে কোন গোলমাল না করা ; শিশু সর্বদা থিট্ থিট্ করে এবং তাহার শরীর কেহ স্পর্শ করিলে বা তাহার পানে তাকাইলে সে অত্যন্ত বিরক্ত হয় (সিনা) ; সর্বদা বিমর্ষ এবং শোকের ভাব ; বাঁচিবার অনিচ্ছা ; চক্ষুর আলোক দেখিয়া মনের মধ্যে প্রেম জনিত উল্লাসের ভাব ; সর্বদা চুপ মারিয়া থাকার ইচ্ছা এবং কথা বলিতে অনিচ্ছা ; সর্বদা পাগলের দ্বারা ব্যবহার ।

মস্তক ।। কপালে ভারিবোধ ; মাথাঘোরা ; বমনোদ্বেষ্ট (লোবিলিয়া) ; নাক দিয়া রক্ত পড়া (ব্রাই) ; সামান্য রক্তের ঘৃশ্ ঘৃশে শিরঃপীড়া এবং মাথা ঘোরা, সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠিলে যাহার বৃদ্ধি হয় (ক্যাঙ্ক-কার্ক) ; স্নান করার পর প্রবল শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা ও আহারে অরুচি ; মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষ্ট, এবং নাক দিয়া রক্ত পড়া ; মাথার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং তৎপর নাক দিয়া রক্ত পড়া ; অবসন্নকারক শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষ্ট । সন্ধ্যার সময় অথবা আহার বা পানের পর যাহার বৃদ্ধি হয় ; পাকস্থলীর অন্ত্রের দক্ষণ শিরঃপীড়া ।

চক্ষু ।। চক্ষু প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ এবং চক্ষে চুলকানি ও রক্তিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা ; প্রাতঃকালে চক্ষে আলোক সহ হয় না (লাইকোপ্, সাল্ফ) ; চক্ষুর পাতা প্রদাহযুক্ত এবং লালবর্ণ (অর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, গ্রাফ্, মার্ক্, লাইকোপ্, সাল্ফ) ; চক্ষুর বহির্দেশের কোণে জ্বালা এবং চড়্ চড়ানি ।

নাসিকা ।। নাসারন্ধ্র ক্ষত, ফাটা এবং খোসা বা চুমটী বিশিষ্ট (এই-লাস্, গ্রাফ্, ক্যালী-বাট, নাইট্রিক্-অ্যাস্, পাল্‌স) ; ঠাণ্ডা বাতাস গেলে যেৰূপ হয় (হাট্‌ড্রাইট্-সোপ্লিনাম্), অথবা উগ্র ধূম টানিলে যেৰূপ হয়, নিশ্বাস প্রস্থানে নাকের মধ্যে সেক্রপ যাতনা ; শিরঃপীড়ার পর নাক দিয়া রক্তপড়া ।

মুখমণ্ডল । ওষ্ঠের কোণে ফাটা, যাহা কতের জ্বার বেদনাযুক্ত হয় (গ্রাফ, লাইকোপ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্); অনেক কাল ব্যাপিয়া গালে পূঁথ সংযুক্ত কুস্কড়ী (গ্রাফ, মেজিরিয়াম্) ।

মুখগহ্বর । গর্ভ বিশিষ্ট দাঁতে বেদনা বা যাতনা, যাত্রিতে যাহার বৃদ্ধি হয় (বেল্); আহারের পর দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (ক্যাক্-কার্ক্, ককিউ-লাস্, ষ্টাকিস্, সালফ্); জিহ্বা দাঁতে লাগিলে দাঁতে বেদনার উজ্জেক হয়, যাহার দরুণ মনে হয় যেন দাঁতের শিরা ছিড়িয়া গিয়াছে; নিখাস দ্বারা যাতাস টানিবার সময় দাঁতে সূঁচী বিধানের জ্বার বেদনা বা যাতনা; মুখগহ্বর শুষ্ক (এইলাছ্, আর্স্, ব্রাই, নাক্স-বম্, হায়োন্, ক্যালী-বাই); মুখে প্রচুর পরিমাণে লোন্তা লাল উঠে (সাইক্লেমেন্, মার্ক্-কব, সিপিরা, সালফ্); তালুকার ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বার অমূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা পরিস্কার করিবার সময় প্রচুর স্লেমা নির্গত হয়; জিহ্বা লাল লেপ যুক্ত (একন্, এইলাছ্, ব্রাই, মার্ক্, নাক্স-বম্, সালফ্); দাঁতের গোড়া দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত নির্গমন (আর্স্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, ফস্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । প্রবল পিপাসা এবং ওষ্ঠ শুষ্ক (একন্, আর্স্, ব্রাই); উদরস্থ আহার দ্রব্যাদির স্বাদবিশিষ্ট উপহার উঠা (কার্বো-আনিমেল্, ক্যাক্-কার্ক্, চায়না, গ্রাফ, পাল্‌স্); স্লেমা এবং পিত্ত বমন; আহারে অকুচি (অর্গিকা, আর্স্, ককিউলাস্); টক দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (আন্টি-টার্ট্, চায়না); অতিরিক্ত খাইয়া পাকস্থলীতে বেদনা বা যাতনা এবং পাক-স্থলী ক্ষীত ও বিস্তৃত হয় বটে, কিন্তু উহা কঠিন না হইয়া নরমই থাকে (চায়না); অজীর্ণের দরুণ পাকস্থলীতে খিল ধরার জ্বার বেদনা বা যাতনা (আর্স্, চায়না, নাক্স-বম্, পাল্‌স্), আহারে অকুচি, বমনোদ্বেগ এবং বমনের ইচ্ছা (আর্স্, আন্টি-টার্ট্, ইপিকাক্); পাকস্থলী দুর্বল, যাহার দরুণ সামান্য আহারাদির অনিয়মেই পেটের অমূত হয় (আর্স্, পাল্‌স্); পাকস্থলীর মধ্যে বুক আগার জ্বার আলোমুতন (আর্স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা; পাক-স্থলীতে কষ্টদারক পূর্ণবোধ, যাহার দরুণ চাপিলে পাকস্থলী বেদনাযুক্ত হয় (আর্স্, ব্রাই, লাইকোপ্, নাক্স-বম্); প্রবল বমন যাহা কোন উপায়েই ধামান যায় না (লোবিলিয়া ইন্ফুটা, আন্টি-টার্ট্), পিত্ত এবং টেট্‌টিয়া আঠা পদার্থ

বমন ; প্রবল ভেদ এবং বমন । উদর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং বিস্তৃত ও উহাতে অত্যন্ত গড়্-গড়্, কল্-কল্ শব্দ হওয়া ; উদরেও কঠিনবৎ ভয়ানক বেদনা ; উদরে অত্যন্ত যাতনা যাহা পাকস্থলী হইতে যেন বিস্তৃত হয় একরূপ অনুভূত হয় ; কাজ কর্ষে অনিচ্ছা ; পেট ঠোশ মারিয়া বা থামিয়া থাকা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদগার উঠা ।

মল এবং মলদ্বার । জলবৎ তরল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন মল এবং উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাও থাকে (ক্যাক্স-কার্স, চারনা, পডোফ্) ; উদরানয়, টক দ্রব্য খাইলে, শরীর অত্যন্ত গরম হইলে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে, রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে যাহার বৃদ্ধি হয় ; বৃদ্ধবয়সে পর্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ (সিমিনিক্-কাডুয়ান্, নেট্রাম্-আস্, নাক্স-বম্, পডোফ্) ; মল কঠিন যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় ; মল অত্যন্ত মোটা, লম্বা নেড় (ব্রাই) ; শৈথিল্যিক অর্শরোগ ; গুল্মদ্বার দিয়া অনবরত স্রোয়া নিঃসরণ ; অর্শের বলি দিয়া রক্ত পড়া ; মনে হয় যেন অনেকগুলি মল নির্গত হইবে, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত না হইয়া কেবল দূষিত বায়ু নির্গত হয় এবং অবশেষে কঠিন মল নির্গত হয় ; জলবৎ তরল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রের মধ্যে কঠিনবৎ বেদনা ; মলত্যাগের সময় মলদ্বারে অত্যন্ত বেদনা অথবা ক্ষত ফাটিয়া গেলে যেদপ হয়, গুল্ম দ্বারে সেকরূপ জ্বালা বা চড়্-চড়ানি, গুল্ম দ্বারে চুলকানি (নাক্স-বম্, নাক্সলিস, সিপিয়া, সাল্ক) ।

শ্বাসযন্ত্র । শরীর অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইয়া স্বপ্নভঙ্গ বা স্বপ্ন শূন্যতা (কার্সো-বেজ্, কঠে, ফস), বিশ্রামে যাহার উপশম হয় ; স্বপ্নের দুর্বলতা ; কঠিনালী এবং আহার বহা গলনালীর মধ্যে প্রবল আক্ষেপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে ক্ষত হওয়ার স্রাব জ্বালা বা টাটানি ; প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই কাশি, থাকিয়া থাকিয়া যাহার উদ্রেক হয়, কাশি যেন উদরের মধ্য হইতে উৎপন্ন বা আরম্ভ হয় ; কাশির প্রথম আক্রমণ অত্যন্ত প্রবল এবং ক্রমেই কাশির আক্রমণ কমিয়া আসিয়া শেষ আক্রমণ গলা খুল্-খুলিবার স্রাব অনুভূত হয় ; বুকে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উকানুভব ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । হস্তের আঙ্গুলের সন্ধিতে ক্ষুদ্র সন্ধিবাহের স্রাব বেদনা ; আঙ্গুলের নখ পূর্বের স্রাব বৃদ্ধ হয় না এবং

নখের নিচের চর্ম অত্যন্ত বেদনাসূক্ হইয়া চাপা প্রাপ্ত নথ আবড়ুখাবড়ু হই এবং উহার স্থানে স্থানে আঁচিলের তায় ধোঁচা দেখিতে পাওয়া যায় । পায়ে বাতের বেদনা ; শরন কবিতা বা বসিয়া থাকিলে পায় অবশবোধ ; পায়ের তলার স্থানে স্থানে, পদানতঃ আঙ্গুলের নিকটবর্তী স্থানে, ধোঁচার তায় কড়া (Corns) পড়ে ; চলিবার সময় পায়ের পাতা টাটার বা বেদনা-যুক্ত হয় (আলাম্) ।

নিদ্রা । দিনের বেলা ঘুমের ইচ্ছা বা ক্রিয়ান, পূর্ক্সাহেই বাহার অধিক উদ্রেক হয় ।

চর্ম্ম । গায় কোড়া এবং কোদাব তায় ফুস্ফুড়ী ; শরীরের স্থানে স্থানে ধোঁচাপ তায় কঠিন ফুস্ফুড়ী ; গায় কোদাব আঁচিল (Soft warts) ; পোকায় কামড়াইলে ঘেরূপ হইয়া, শরীরের স্থানে স্থানে সেরূপ ব্রণ বা কোদাব তায় ফুস্ফুড়ী (এপিস্, আর্নিকা, লেডাম্) ; গায়ে হামের তায় ফুস্ফুড়ী (কফিয়া, পাল্‌স্) ।

জ্বর । বমন বা বমনোদ্বোগ হইয়া জ্বর আরম্ভ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধতা, বিমর্ষতা এবং শোকের ভাব । অত্যন্ত শীত এবং শীতলাবস্থায় পিপাসা না থাকা ; বেলা ছুই গ্রহর বা অপরাহ্নে জ্বর আইসে ; পালজ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের ইচ্ছা এবং পিপাসা না থাকা ; রাত্রিতে শরীর উষ্ণ এবং পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই ঘর্ম্ম হওয়া ; নাড়ী অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে (আর্স্, ডিজিট্, লরোস্, মার্ক্) ; উষ্ণ ঘরেও অত্যন্ত শীত বোধ ; জ্বরের সময় অত্যন্ত বমন বা বমনোদ্বোগ (ইপিকাক্, পাল্‌স্, নাক্স-বম্) ; ক্ষুধা এবং রুচি থাকে না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বোগ, বমন এবং মুখে তিক্ত স্বাদ (ইপিকাক্), পাকস্থলীতে চাপা বোধ এবং উহাতে কনিয়া ধরা, উদবৃহৎ আহাৰ জ্বরের স্বাদ বিশিষ্ট উল্লার উঠা ; অস্ত্রে বেদনা এবং উহাও সঙ্গে সঙ্গে উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ ও আহায়ে অরুচি ; টক দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা ; আহাৰ বা পানে একবারে বিরক্তি এবং ঘর্ম্ম ; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত ; জ্বরের কোন অবস্থায়ই পিপাসা থাকে না ।

ব্যবহার । শ্রৈষ্মিক সিল্লীর অস্থখ ; আমাশয়, যাহাতে জ্বর থাকে না ; জ্বর সম্বলিত নাসিকা, বায়ুনল, পাকস্থলী এবং অন্ত্র সম্বন্ধীয় শ্রৈষ্মিক রোগ ;

অজীর্ণ ; উদরাময় ; কোষ্ঠ বদ্ধ ; কোন কোন প্রকারের কোষ্ঠার জ্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রণ বা কুস্কুড়ী ; বসন্ত রোগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর কুটকুট করা বা চুলকানি ; মুখমণ্ডল, কণ, নাসিকা এবং গালে বিকচ (Eczema) ; কড়া (Corns) এবং আঁচিল (Warts) ; শিশুগণের পুরাতন আকারের চক্ষু প্রদাহ ; হৃপিং কক ; পালা জ্বর ইত্যাদি অস্থখে আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । উষ্ণ ঘবে অস্থখের বৃদ্ধি ; দুৰ্ব্বলতা বা অবনমনতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিতে ঘৰ্ম্ম, নিদ্রাবল্যা, বমনোদ্বেষণ এবং বমন ; স্থান্য উত্তাপ একবারেই সহ্য হয় না ; ঘৰ্ম্মের পর শরীর পুনরায় উষ্ণ হয় ; শীঘ্র শীঘ্র মোটা হওয়া বাতু ; শিশু ও বৃদ্ধবয়সের অস্থখ ; ঠাণ্ডা লাগিয়া অস্থখ ; ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া অস্থখ ; লক্ষণাদি একবার দূরীভূত হইয়া পুনরায় প্রকাশ পাইলে পূর্বের আকার ধারণ করে না ; প্রাতঃ কালে, সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে, আহারের পর, মদ্যপানে (গ্লানয়েন্), স্নানের পর, নড়াচড়াতে, স্থায়ের উত্তাপে (বেল্) এবং স্পর্শনে অস্থখের বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে ও বহির্কীয়ুতে অস্থখের উপশম ইত্যাদি আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডামের কার্য্যের সঙ্গে আমোনিয়াম্ মিউরিয়াটিকাম্, ক্যালৌ বাইক্রমিকাম্, পিট্রোলিয়াম্ এবং পাল্‌সেটিলাব কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে উহার কার্য্যের সঙ্গে এপিস্, আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্, ক্যামোমিলা, ককিরা, প্রাফাইটিস্, হিপার সাল্‌ফিউরিস্, ইপিকাকিউএনা, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স বমিকা এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । হিপার সাল্‌ফিউরিস্, মার্কিউরিয়াস্, পাল্‌সেটিলাব ইত্যাদি আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য় ক্রমের শুঁড়া এবং ৬, ১২ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ৬ষ্ঠ ক্রমের আরো কই লেখক সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন ।



## এপিস্ মেলিফিকা,—এপিস্ ।

(APIS MELLIFICA,—APIS)

জীবাণুসমূহ মাছি যখন রাগান্বিত হইয়া কামড়াইতে যায়, তখন উহার ছল হইতে যে বিষ নির্গত হয় উক্ত বিষ দ্বারা ডাইলুট্ স্পিরিটে (Dilute Spirit) যথা নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । প্রথম দশমিক ক্রম ডাইলুট্ স্পিরিট্, ১ম শতভাগিক বা ২য় দশমিক ক্রম ডাইলুট্-স্পিরিট্ এবং ৩য় দশমিক ক্রম ২০° ডিগ্রী ওনারপ্রুফ্ স্পিরিটে (20° Over-proof Spirit) এবং ৪র্থ ও ততোধিক ক্রম যথা নিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । শরীরের কোষিক অংশের (Cellular tissues) উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ চর্ম্ম এবং শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর তরুণ শোথ (Acute oedema) হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা চর্ম্মে আমবাতের (Urticaria) ভায় ফুসুড়ী এবং শ্লেষ্মিক ঝিল্লী উত্তেজিত হইয়া সামান্তরূপে প্রদাহযুক্ত হয় । মাস্তক ঝিল্লীর (Serous Membranes) উপরও ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ মস্তিষ্কের শোথ, বক্ষ শোথ, উদরী (Ascites) ইত্যাদি মাস্তক ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে । জীলোকের অরামু এবং ডিম্বকোষের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ উক্ত যন্ত্র উত্তেজিত হইয়া উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং সামান্য আকারের প্রদাহ ও উহার শোথ হইয়া থাকে ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অচেতনতা (বেন্, হায়েন্স, ওপিয়াম) ; অজ্ঞানবৎ ঘুম বাহা সময়ে সময়ে চীৎকার শব্দে ভাঙ্গিয়া যায় ; অজ্ঞমনকতা (অনাকার্ড, নাক্স-মক্, নেজা, ফন্-অন্স) ; অত্যন্ত বিশ্রী চাল বা বিশ্রী কাজ করার স্বভাব ; হাত হইতে জ্বালাদি ফেলিয়া দেওয়া এবং ভাঙ্গিয়া ফেলার স্বভাব ; সর্ব্বদা কার্যে ব্যস্ত থাকা ; অস্থিরতা ; বারম্বার এক কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে নিবৃত্ত হওয়া ; সর্ব্বদা কাঁদার স্বভাব, কোন মতেই কান্না নিবারণ করা যায় না (ইথেন্স, নেটাম্-মিউর, নাক্স-মক্, পাল্-স) ; কোন বিষয়েই মন যায়

না (ফস্, ফস্-আস্); সর্বদা থিট্ থিট্ করা (ব্রাই, ক্যাম্. নান্স্. বম্); সে অমুক দিন মবিবে রোগী এরূপ বসে (একন্); আরক্ত জরের ফুসুড়ী গায় বদিয়া বাইয়া প্রলাপ; জ্বীলোকের অন্তের বিষয়ে হিংসা করা (হারোস্. লাক্); পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা পরিতুষ্ট না হওয়ার দক্ষণ উন্নততা ।

মস্তক । মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শিরঃসীড়া ও বম-  
নোষণে; মাথায় গোলমলে বোধ এবং মাথা ঝিম ঝিম করা ও উহার  
সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর উপরিভাগ এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে অনবরত চাপিয়া  
ধরার স্তায় বেদনা বা যাতনা, হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে যাহার কতক উপশম  
হয়; সমুদয় মাথায় ঘূশ্-ঘূশে বেদনা, চাপিয়া ধরিলে যাহার উপশম হয়;  
মস্তিষ্ক যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; কপাল এবং কপালের  
ছুই পার্শ্বে চাপিয়া ধরার স্তায় বেদনা, বসী অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে এবং উক  
বিছানায় শয়ন করিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং চাপিলে যাহার উপশম হয়  
(পাল্‌স্); মাথার পশ্চাত্তাগে বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে, মধ্যে  
মধ্যে, হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠা; (শিশু বা বালক নালিকা)  
নিশ্চেষ্ট এবং অচলভাবে থাকে; প্রলাপ, হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাদিয়া  
উঠা; চক্ষু টেরা করিয়া তাকান; দাঁতে দাঁতে কড়্ মড়্ শব্দ করা; মাথা  
বালিশের মধ্যে খুসিয়া দেওয়া (হেলিবোরাস্); শরীরের এক পার্শ্বের স্পন্দন  
এবং অপর পার্শ্বের পক্ষাঘাত; ঘর্শ্বে মাথা ভিজিয়া যায়; মূত্র দুর্গন্ধবৃত্ত এবং  
পরিমাণে অল্প; মাথা ক্ষীত হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়; মাথার চর্ম্ম যেন  
ক্ষীত এবং শক্ত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় ।

চক্ষু । চক্ষে আলায়ুক্ত, হল ফুটান বা খোঁচা বিঁধার স্তায় বেদনা  
বা যাতনা; চক্ষুর পাতা ক্ষীত, লালবর্ণ এবং উহাতে শোথ (আস্, কন্);  
চক্ষুর উপরের পাতা যেন একটা থলিয়ার স্তায় চক্ষুর উপর স্থলিয়া পড়িয়াছে  
এরূপ অনুভূত হয় (কালী-কার্ক্); চক্ষুর যোজক ঝিল্লী লালবর্ণ এবং  
কালচে শিরা দ্বারা পরিপূর্ণ; চক্ষু প্রদাহযুক্ত হইয়া উহার যোজক ঝিল্লীর  
স্থানে স্থানে সিরাম্ (Serum) নামক ফেনবৎ পদার্থ সঞ্চিত হইয়া কর্ণিয়ার  
(Cornea) স্বচ্ছতা নাশ করে (Chemosis), কর্ণিয়া পুঙ্ক হয় এবং উহার

হানে হানে কাল্চে ধূমের ভায় দাগ পড়ে ; কর্ণিরায় ধূমর বা ধূমের ভায় অধচ্ছতা ; চক্ষু প্রদাহ এবং তদ্রূপ আলোক লক্ষ্য না হওয়া এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া (একন্, আন্, বেল্, ইউক্রেস্, মার্ক্) ; টেরাচক্স (হারোন্) ।

কর্ণ । উভয় কানই ক্ষীত এবং লালবর্ণ হয় (একন্, বেল্, পাল্) ।

নাসিকা । নাক ক্ষীত, লাল বর্ণ এবং শোথের ভায় ক্ষীত (রাস্-টক্স) ; নাসারন্ধ্রে ত্রণ, ঠাণ্ডাতে বাহার উপশম হয় ।

মুখমণ্ডল । মুখ মণ্ডলের শোথের ভায় ক্ষীতি (আন্) এবং উহা মোমের ভায় শিটা বা ফিকা ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ, উষ্ণ এবং ক্ষীত (বেল্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে জ্বালাযুক্ত ও ছুরীবিঁধানের ভায় বেদনা বা ব্যতনা (আন্) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । ওষ্ঠের শোথ ; উপরের ওষ্ঠ ক্ষীত (হিপ্-দাল্ফ), উষ্ণ এবং লালবর্ণ (বেল্) ; মুখগহ্বর, জিহ্বা এবং গলার মধ্য শুষ্ক (নাক্স-মক্স) ; গল গহ্বরের আঙনের ভায় লালবর্ণ এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা ও টাটানি (বেল্) ; জিহ্বার ধার দিয়া আগা গোড়া চড়্চড়ানি এবং উহাতে জ্বালা ও হল ফুটানের ভায় বেদনামুক্ত ফোঙ্কার ভায় ফুস্কুড়ী ; মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে জ্বালা এবং চড়্চড়ানি (মার্ক্-কর) ; জিহ্বা ক্ষীত, শুষ্ক এবং ফাটা ও ক্ষতযুক্ত, অথবা ফোঙ্কার ভায় ফুস্কুড়ী দ্বারা আবৃত (আন্, রাস্-টক্স, ব্যাপ্ট্) ; শিশুগণের দাঁত উঠার সময় মাড়ি টল্ টলে হয় এবং উহাতে জল আছে এক্রপ দেখায় ; শিশু হঠাৎ চীৎকার করিয়া ঘুম হইতে কাঁদিয়া উঠে ; শরীরের হানে হানে লাল দাগ দৃষ্ট হয় । গলার মধ্য শুষ্ক, অগচ পিপাসা থাকে না (নাক্স-মক্স, পাল্) ; গলার মধ্যে জ্বালা এবং হল ফুটানের ভায় ব্যতনা অম্লভূত হয় (একন্, ক্যাস্, ক্যাপ্স) ; গলার মধ্য এবং উহার বহির্দেশে ক্ষীত ; শরভ্র এবং গলার মধ্যে সংস্কাচন বোধ ও গিলিতে বা নিশ্বাস গ্রহণে কষ্টান্বিত ; টনসিল্ (Tonsils) লালবর্ণ এবং প্রবল প্রদাহযুক্ত (একন্, বেল্, ক্যাপ্স) ; টনসিল্ এবং তালুকার ক্ষত (এইলাস্, মার্ক্-আয়োড্) ; ডিপথিরিয়া এবং উহার দরুণ কৃত্রিম পর্দা একবারে মলিন ধূসরের আঁঠায়ুক্ত আকার ধারণ করে (ক্যালো-ব্রাই) ; গলার উপর কোন প্রকারের চাপ বা স্পর্শন একবারেই সহ্য হয় না (ল্যাক্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । শরীর উষ্ণ, অথচ শিথিল থাকে না (পাল্‌স্); পাকস্থলীতে অত্যন্ত আগাযুক্ত গরম বোধ (আর্স্); স্পর্শনে পাকস্থলীর মধ্যে অত্যন্ত টাটানি (ব্রাই); বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরামর (হাঁপকাঙ্ক্) এবং পাকস্থলীর প্রদাহ । স্পর্শ করিলে অস্ত্র এবং উদর প্রাচীরে অত্যন্ত টাটানি, হাঁচি দিলে বা উহার উপর চাপ দিলে বাহ্য অস্থিত হয় (বেল্, ব্রাই, নাক্স-বম্); উদর যেন পূর্ণ এবং স্ফীত ও বিস্তৃত হইয়াছে এরূপ অস্থিত হয় (চায়না); পঞ্জবার হাড়ের নীচ হইতে উর্দ্ধদিকে যেন বেদনাদি বিস্তৃত হয়; তলপেটের পার্শ্ব হইতে বেদনা বা যাতনা আরম্ভ হইয়া উপর দিকে বিস্তৃত হয় ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্ক দ্বারে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বাৰ চক্ষ-চড়ানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরামর; মলত্যাগের পূর্বে শুষ্ক দ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণ; প্রচুর পরিমাণে কালচে কটাবর্ণ, সবুজ অথবা সাদাটিয়া তরলভেদ; হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ তরলভেদ; সবুজের আভাযুক্ত বা হরিদ্রাবর্ণের স্লেষ্মা ভেদ (পাল্‌স্, মাক্, সাল্‌ফ্); মল নরম এবং ষোলাটিয়া এবং সিরাম মিশ্রিত; হরিদ্রাবর্ণের তরল ভেদ; প্রত্যেক বার নড়া চড়াতেই মল নির্গত হয়, বাহার দক্ষণ মনে হয় যেন শুষ্কদ্বার অনবরতই খোলা রহিয়াছে; রক্তভেদ এবং অস্ত্রের মধ্যে আগাযুক্ত বেদনা বা যাতনা ও শুষ্ক দ্বারে ছাল উঠা এবং অনবরত কষ্ট দায়ক কোঁপ পাড়া বা বাহ্যের বেগ; অর্শরোগ এবং তদ্রূপ শুষ্কদ্বারে চল ফুটানের জ্বাৰ যাতনা (আর্স্, নাইটি-ক্-আস্, সাল্‌ফ্); শুষ্ক বাহির হইয়া পড়া (ক্যাঙ্ক্-কার্ক্, কেরাম্, মিউর-আস্, পডোফ্)।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র ত্যাগের সময় মূত্র নালীতে ক্রান্ত হওয়ার জ্বাৰ আগা-ভুস্তব (ক্যানাবিন্-সার্ট্); বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে কএক ফোঁটা বাস্ত্র মূত্র নির্গত হয় (একন্, ক্যাঙ্ক্); মূত্র লালবর্ণ এবং পরিমাণে অল্প (একন্); মূত্রাবরোধ (একন্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্); বারম্বার প্রচুর মূত্র ত্যাগ (আপোনাইনাম্, আজেন্টি-মেট্); মূত্রনালীতে জ্বালা এবং চল ফুটানের জ্বাৰ যাতনা অস্থিত হয়; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্র নির্গমন, রাত্রিতে এবং হাঁচি বা কাশিবার সময়ই বাহ্য অধিক হয় (কষ্ট্, পাল্‌স্, বিরেট্-আব্)।

**জননেন্দ্রিয় ।** 'গুরুষের অণ্ডকোষ প্রদাহ (একন্, মাক্) এবং অণ্ডকোষাধারের শোথ বা পোতা ভারি হওয়া (Hydrocele)। ক্রীলোকের ডাইন ডিম্বকোষের প্রদাহ, কঠিনতা, ক্ষীতি এবং শোথ ও উহার কঠিন-বৎ বা হল ফুটানের স্থায় প্রথব বেদনা (বেল্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বার-স্তন ও উহার চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থানে বেদনা বা যাতনা এবং কাশি; জরায়ু এবং ডিম্বকোষ প্রদেশে আলায়ুক্ত বা হল ফুটানের স্থায় বেদনা বা যাতনা; রজঃস্রাবের সময় ডাইন ডিম্বকোষ প্রদেশে বেদনা এবং টনটনানি; ক্ষীতি ডিম্বকোষে কঠিনত্ব, হল ফুটানের ন্যায় প্রথব বেদনা, রজঃ-স্রাবের সময় যাহার বৃদ্ধি হয়; রজঃরোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বকোষে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার প্রদাহ; ডাইন ডিম্বকোষ এবং জরায়ুর শোথ; গর্ভ সঞ্চারে অল্পকাল পরই গর্ভস্রাব।

**শ্বাসযন্ত্র ।** বক্ষাস্থির ঠিক উপরিভাগের উত্তেজনার দরুণ কাশির উদ্রেক হয়; থেঁৎলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে বেক্রপ হয়, বৃকে সেক্রপ বেদনা (আর্গিকা, চায়না, সাইলিসি); স্বরভঙ্গ, প্রাতিঃকালেই যাহা অধিক হয় (কষ্ট, আয়োড্, ফস); শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, কষ্টকর এবং আক্কে-লিক, শয়ন করিয়া থাকিলেই যাহার বৃদ্ধি হয়; শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, যাহার দরুণ গলায় কাপড়াদি রাখিতে পারা যায় না (ল্যাক); বৃকের বাম পার্শ্বে, বক্ষাস্থির অতি নিকটবর্তী স্থানে, ঘুশ্, ঘুশে, কন্কনিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকের মধ্যে পূর্ণবোধ ও হাঁপানি বা শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হওয়া; বৃকের সম্মুখ ভাগের সমুদয় অংশেই আলায়ুক্ত বা হল ফুটানের স্থায় বেদনা; ঘুম ভাঙ্গিলেই কাশির উদ্রেক হয় (ল্যাক)।

**অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি ।** হাতের শোথ; হাত নীলের আভাযুক্ত এবং শীতল হওয়ার স্বভাব বিশিষ্ট; হাতের আঙ্গুল, প্রধানতঃ আঙ্গুলের মাথায় নখের গেড়ার প্রদাহ; নখকোণী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে আলা, হলফুটানের স্থায় বা দপ্পদিয়া বেদনা, যাহা স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায়। পা শীতল (আঙ্গু, নাক্স-বম্, সাইলিসি); পায়ের পাতা এবং আঙ্গুল যেন স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় বলিয়া অনুভূত হয়; পায়ের পাতা, পায়ের পাতার সন্ধি এবং পা ক্ষীত ও শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায়

না ; পা এবং পায়ের পাতা মোমের ছায় শীত এবং শোথের ছায় শ্বীত (অস্মি) ; পায়ের আঙ্গুলে জ্বালাযুক্ত এবং উহা লালবর্ণ হয় (আগা-রিকাশ) ; পায়ের পাতা শীতল ।

**চর্ম** । চর্ম সচরাচর সাদা, প্রায় স্বচ্ছ (ডিষ্টকোবেব শোথে) ; চর্মে হলফুটান, কুট্ কুট্ কবা, চিড়িক বাবা, জ্বালা এবং চুলকানির ছায় অল্পভূত হয় ; আক্রান্ত স্থান সামান্য স্পর্শেই বেদনাতুচ্ছ হয় বা টাটায় ; গোমাছি অথবা অন্য কোন পোকাকব কামড়িলে যেদপ হয়, গায় সেইরূপ আমবাত (Urticaria) ; ঘাত বা চটে অত্যন্ত চুলকায় (আন্টি-ফ্লুইড্, আণিকা, লেডাম্) ; সমুদয় শরীরে আমবাতের ছায় ফুসুঙ্গী বাহির হয় (একন্. পাল্‌ম্) ; চর্ম শুষ্ক এবং বিদর্পে ছাব শ্বীত ও লালবর্ণ ; চান্দক বা বেত মারিলে বেদপ হয়, শরীরেব হাতন স্থানে উন্নত সাদা বেখাব ছায় সেকপ দাগ বা রেখা পড়ে ; ছুঁইয় বা পৃষ্ঠঘাত (Carbuncle) এবং উহাতে হল-ফুটানের ছায় বা জ্বালাযুক্ত বেদনা (অস্মি) ; গায় অত্যন্ত গাঢ় লাল ফুসুঙ্গী প্রকাশ পায় (বেল) ।

**নিদ্রা** । ঘুমাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা ; অত্যন্ত নিদ্রাবেশ (আন্টি-টার্ট্, নাস্-মক্) ; ঘুমেরঘোরে চীৎকার করিয়া হঠাৎ কানিয়া উঠা বা হঠাৎ চমকিয়া উঠা (বেল্, ট্রান্স্) ; রাতি শেষ হওয়ার সময় ঘুম ।

**জ্বর** । সবিসান বা জ্বালাজ্বব ; অপবাক ওটার সময় শীতকম্প বাহা উদ্ভাপে, সামান্য নড়াচড়াতে বৃদ্ধি হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল ও হাতে উষ্ণাত্ব ; শীত শরীরের উষ্ণাংশ হঠাতে পৃষ্ঠদেশ দিয়া নিম্নদিকে বিস্তৃত হয় ; সময় সময় শরীর আগুনের ছায় গরম হয়, নতুবা শরীরের কোন কোন অংশ ক্রমে শীতল হয় এবং কোন কোন অংশ ক্রমে গরম হয় ; শরীর শুষ্ক এবং ঠিক, নতুবা শরীর পর্যায়ক্রমে শুষ্ক এবং আর্দ্র হয় ; উষ্ণাবস্থায় অধিক বা অল্প পরিমাণে শিরশ্চীড়া এবং সচরাচর উষ্ণাবস্থার ক্রমাগত ঘোর নিদ্রা ; হয় চর্ম একবারেই হয় না, নতুবা সামান্য ঘন হয় ; ক্রমাগত বিকাসের লক্ষণ প্রাপ্ত শিশু শিশু জ্বর, কিন্তু পিপাসা থাকে না ; অপবাক ওটার সময় জ্বরের বৃদ্ধি এবং তখন প্রায়ই বেগি নিদ্রাবস্থায় থাকে ; ঘর্মাবস্থায় পিপাসা থাকে না ; উষ্ণাবস্থায় পিপাসা থাকিলেও থাকিলে পারে, বা

পিপাসা না থাকিতেও পারে ; শীতলাবস্থা প্রায়ই পিপাসা থাকে ; জ্বরের সম্পূর্ণ বিবামের সময় বানপাক্ষের খাট পাক্ষের হাড়ের নীচে বেদনা ; পায়ের পাতা ফাট ; মূত্র পরিমাণে অল্প ; অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ এবং উহার সন্ধিতে টাটানি বা বেদনা ; শবীর কম্পন ও মূৰ্ছার পৰ্য্যবসায় এবং তৎপর গায় আম-বাত ( Urticaria ) প্রকাশ পায় ।

ব্যবহার । কীটাদি বহুদুটান, অ্যারোডিন, কোইনাইন, টার্পিন্ তৈল, ক্যাস্‌সারাইডিস্ ইত্যাদি ঔষধের অপব্যবহার জনিত অম্লথ ; চর্ম্ম এবং শৈথিল্যিক কিলার অবনত কণ শোথ ; ভগ্ন বা গুঠাবাত (Carbuncle) ; নিসর্গ ; আঘাত ; হাম-জ্ব ; আবল-জ্ব ; ডিপ্‌থিরিয়া ; মস্তিষ্কের আবরক পর্দার প্রদাহ (Meningitis) ; মস্তিষ্কের শোথ ; শব্দশোথ ; উদরী ; মূত্রাশয় প্রদাহ ; মূত্রাশয়ে অশক্তি বা অনাড়ো মূত্রত্যাগ ; মূত্র ক্রম্ভ ; ডিম্বকোষ এবং জরায়ুতে উত্তেজনা, বক্তাপিকা বা বক্তাবোধ এবং উহার শোথ ; জর বিকার ; সঘিরাম বা পালাজর ; নখচোণী ; কত ইত্যাদি অম্লথ এপিস্ মেলিফিকা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । নোনাহিতে কামড়াইলে বেক্রপ হয়, আক্রান্ত স্থানে সেক্রপ বেদনা বা না হনা ; আক্রান্ত স্থান স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনা যুক্ত হয় বা টাটার (একন, অগারিকান, বেল, লাই) ; আক্রান্ত স্থানে জ্বালা যুক্ত, হলফুটানের তায় বেদনা বা যাতনা ; সর্বাঙ্গে অলসবোধ এবং কম্পন ; গণ্ডমালা ধাতু ; বালক বালিকার অম্লথ , জ্বালোক, বিশেষতঃ বিষবা জ্বালোকের অম্লথ ; প্রাতঃকালে (উদরাময়), উত্তাপে, প্রধানতঃ উষ্ণঘরে, অম্লথের বৃদ্ধি এবং তদন্থ ঠাণ্ডা বাতানে থাকিব ইচ্ছা ; ঠাণ্ডাজলে বেদনা জ্বালা এবং ক্ষতির হ্রাস ; প্রচাপনে মাথা দগার উপনয় হয় (অ্যার্জেট্-নাইটিক্, পাল্‌স্) ইত্যাদি এপিস্ মেলিফিকা শারীরতত্ত্ব জ্ঞান বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । মূত্র বৃদ্ধির উপর এপিসের কার্য্য অনেকটা ক্যাস্‌সারিস্ ও টিরিবিয়নার জ্বাব এবং প্রাতঃকালীয় উদরাময় ও কঠিনাণ্ডব অম্লথ ইহার কার্য্য কমেয় জ্বাব , চর্ম্মের উপর ইহার কার্য্য আনাকাডিয়াম্, বেল্যাডোনা, ক্রোটিন্, রাস্‌উল্ এবং আর্টিকার জ্বাব ;

মাস্ক কিল্লীর (Serous Membranes) উপর ইহার কার্য। আপোনাইনাম্, মার্কিউরিয়াম্ কেরোসাইবাম্ এবং ব্রাইওনিয়ার ত্রায়। সমুদয় বিষয়ে এপিসের কার্য প্রায় আর্সিনিকের ত্রায়। এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে এপিসের কার্যের সঙ্গে আর্বিকা, ইউফ্রেসিয়া, ল্যাকেসিস্, নেটাম্ মিউরিয়াটিকাম্, লেডাম্, পাল্‌মেটিনা, ফক্ষরাস্, মাল্‌ফাবেস্ কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ল্যাকেসিস্ এপিসের প্রতিষেধক ঔষধ। অধিক মাত্রায় এপিস্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে লবণ, জলপাইসেব বা মিটা তৈল, পের্মাইজ ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। ৩৭ এবং ৬৬ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শোধে ৩৭ ডাঃ উপকারী। চর্মরোগে ৩, ৬ এবং ১২ ডাঃ ব্যবহার্য। মূত্রবর্ধের অস্ত্রে ৬৬ ক্রম অপেক্ষা নিম্ন ক্রম ব্যবহার করা উচিত নহে। চক্ষু বোগে ৩০ ক্রম বিশেষ উপকারী বলিয়া অনেক চিকিৎসক বলিয়া গিয়াছেন। লেখক উক্ত রোগে ৬৬ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই ব্যর্থতা ফল পাইয়া থাকেন। শোধে ২য় এবং ৩য় ক্রম ব্যবহার করিয়াই বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

আর্জেন্টাম্ নাইট্রিকাম্, -নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌বার্, -লুনার  
কণ্টিক্, -আর্জেন্ট-নাইট্ ।

(ARGENTUM NITRICUM.—NITRATE OF SILVER;—  
LUNAR CAUSTIC, -ARGENT-NIT.)

কোন এক বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে লুনার কণ্টিক্ ক্রয় করিয়া উহা ১ ভাগ, ৯ ভাগে চূয়ানজলে মিখাটয়া ইহার আদত আরোক প্রস্তুত করিতে হয়। যথানিয়মে চূয়ান জলে ১ম হইতে ৩য় শতভাগিক ক্রম পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। অর্থাৎ শতভাগিক ক্রম ডাউলুট্ স্পিরিটে এবং ৫ম এবং ততোধিক ক্রম যথা নিয়মে বেকটিকাউড স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই ঔষধ চর্মরোগ বন্দন শিশুতে রাখা উচিত। স্তন্যাব অবস্থিক



সহিত মিশাইয়া ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে । কিন্তু ব্রিটিশ্ হোমিও-প্যাথিক ফার্মাকোপিয়াতে এই প্রকার প্রস্তুত করা আর্জেন্টাম্ ব্যবহার নিষিদ্ধ, কারণ, এই প্রকারে প্রস্তুত করা আর্জেন্টাম্ ঔষধের সম্পূর্ণ গুণ থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে ।

**সাধারণ ক্রিয়া ।** রক্তের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার দ্রবণ রক্ত তরল এবং মলিন বা কাল্‌ডে হয়, রক্তের লাল কণার রক্ত কারক পদার্থের অনেক হ্রাস হয় এবং রক্ত বহা নালীতে যথোচিত রূপে রক্ত সঞ্চালিত না হইয়া হ্রাসবে থাকার দ্রবণ পরিপোষণ কার্যের ব্যাঘাত জন্মে । এই প্রকার পরিপোষণ কার্যের ব্যাঘাতের দ্রবণ অস্থি এবং উহার আবদক কঠিন পদা (Periosteum) আক্রান্ত হয়, শৈল্পিক বিলী আক্রান্ত হইয়া প্রদাহযুক্ত হয় এবং অবশেষে ইহা এবং পেশীর অপকৃষ্টতা (Degeneration) উৎপন্ন হয় । নস্তিক এবং কসেরকা মজ্জাও ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, বাহার দ্রবণ উক্ত ঔষধেব নানা প্রকার রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**মন ।** স্মরণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ (আনাকার্ড, ক্রিয়াজ্, ল্যাক্, মার্ক্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-মস্ক্, ফস্‌ সাস্) ; যখন বাগ্ন ইচ্ছা হয় বিশেষ কিছু চিন্তা না করিয়া তখনই তাহা করা হয় ; তাড়াতাড়ি চলিয়া বেড়ান ; পাছে অকৃতকার্য হইতে হয় একপ মনে করিয়া রোগী কোন কার্যের উদ্যোগ করে না এবং সর্বদা নিস্তক ভাবে থাকে (অরাম্) ; চতুর্দিক অন্ধকার দেখা এবং উহার সঙ্গে সাক্ষ অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা ও বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, যাহা ঘরের মধ্যে দ্রব্ধ করিয়া থাকিলেই অধিক হয় ; উপাসনা গৃহে বা কোন প্রকাষ সভাতে যাওয়ার সময় মনে হয় যেন তথায় যাইয়া উদরাময় হইবে ; কথা বলিতে বলিতে যেন কথা আট্‌কিইয়া আইসে, যেন যথার্থোগ্য কথা স্মরণ হয় না ; কোন প্রকারের কার্য করিতে অনিচ্ছা এবং সর্বদা নিস্তক ভাব ও আত্ম হত্যার ইচ্ছা ; সময় যেন কাটে না ; মুচ্ছার ভাব ।

**মস্তক।** মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে বজ্ বজ্ শব্দ হওয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হ্রাসতা এবং কম্পন ও তন্দ্রকণ চলিবার সময় হেলিয়া উলিয়া পড়া; শিরঃপীড়া, মাথা কসিয়া বাধিয়া রাখিলে যাহার উপশম হয় (সাইলিসি) এবং বহির্বায্যতে বাহ্যার বৃদ্ধি হয়; কপালের বাম পার্শ্বের উন্নত স্থানে ছিদ্র করার স্থায় বেদনা (কলোস্); মাথা যেন অনেক বড় হইয়াছে একপ অল্পভূত হয় (বোরাক্স্, সিনিসিক্, স্ট্রোনয়েন্); মস্তিষ্কের এক পার্শ্ব পুনন করার স্থায় বেদনা বা বাতনা; মাথার অত্যন্ত কষ্টদায়ক পূর্ণ এবং ভারিবেদ, মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাববোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রীবাদেশের ধমনির দপ্পনগানি (বেল্); মাথার উপরিভাগ, কপালের ছই পার্শ্ব এবং মুঃনগালের হাড় প্রায় অন-বরত ছিদ্র করার স্থায় বা কঠনবৎ বেদনা; শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীতবেদ ও শবীরের কম্পন; মাথায় হাড় যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে একপ অল্পভূত হয়; কোন প্রকারের কীট হান্না দিয়া গেল যেকপ হয়, মাথায় সেকপ হুড়্ হুড়্ করা বা চুলকানি (কল্, কুপ্রাম্-মেট্); চুল টানিলে যেকপ হয়, চুলের গোড়ায় সেকপ অল্পভূত হয়।

**চক্ষু।** চক্ষুপ্রদাহ এবং তন্দ্রকণ চক্ষে অত্যন্ত বেদনা যাহা উক্ যার বৃদ্ধি হয়, এবং বহির্বায্যতে বাহ্যার উপশম হয় (পাল্‌স্); চক্ষে আনোক্ত নহ হয় না বা লাগে (একন্, বেল্, ইউফেস্, প্রাক্); চক্ষুর সম্মুখে যেন ধূসর বর্ণের দাগ এবং সাপের স্থায় কোন প্রাণী চলিয়া বেড়াইতেছে একপ অল্পভূত হয়; দৃষ্টিহীনতা; চক্ষুর পাতার উপাধিব প্রদাহ (Ciliary Blepharitis), অঙ্গুনের নিকট থাকিলে বাহ্যার বৃদ্ধি হয় এবং ঠাণ্ডা প্রযোগে বা ঠাণ্ডা বাতাসে বাহ্যার উপশম হয়; চক্ষুর পাতা উলটিয়া পড়ে (Ectropion), মধো মধো চক্ষে ঝাপসা দেখা এবং তন্দ্রকণ রোগে অবস্থান চক্ষু হইতে কেতুব মুছিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়; চক্ষুর যোজক ঝিল্লীর তরুণ দান্যাক প্রদাহ; চক্ষুর যোজক ঝিল্লী অত্যন্ত লাল বা গোলাপি বর্ণ বিশিষ্ট; চক্ষু হইতে প্রচুর জল, কেতুব এবং পুঁদের স্থায় পদার্থ নিঃসরণ (মাক্); চক্ষুর কোণ রক্তের স্থায় লালবর্ণ; চক্ষুর নাকের নিকটবর্তী কোণের লাল পেশীর স্থায় পদার্থ ক্ষীত হইয়া লাল মাংসের ডেলার স্থায় হইয়া থাকে; চক্ষুর নাকের নিকট

বর্তী কোণ হইতে চক্ষুর কর্ণিয়া পর্যন্ত শিরাগুলি ঝোপায় ঝোপায় লাল বর্ণ হয় (ক্যালী-আরোড্) ; চক্ষুর কোণ ভয়ানক চুলকায় এবং উহাতে জালা এবং চিড়িক মারে ; চক্ষুব কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea) ; শিশুগণের কর্ণিয়ার ক্ষত (Ulceration of the Cornea) ; চক্ষুর পাতা হইতে পুঁয়ের গ্রাণ প্রচুর ব্রেন নিঃসরণ (মার্ক্-কর) ; চক্ষুর পাতা চুম্বি বা খোসা বিশিষ্ট, ক্ষীত এবং পুত ।

কর্ণ । কানে কন শুনা ; কানে টন্ টন্ শব্দ হওয়া (চারনা) ; কানে কোঁস্ কোঁস্ শব্দ হওয়া এবং কান যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে এরূপ অনুভূত হওয়া ।

নাসিকা । নাক দিয়া থানা থানা বস্তু মিশ্রিত সাদাচিবা পুঁব নির্গমন ; সর্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন কারক মাথা ধরা যাহা চক্ষুর উপরিভাগেই অধিক অনুভূত হয় ও বাহ্যিক দরুণ রোগী বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; হাঁচি, শীত বোধ, চক্ষু দিয়া জল পড়া এবং মুখাকৃতি রুখ ; নাকের মধ্যে অত্যন্ত চুলকায় ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল রুখ (আস্) ; মুখমণ্ডল বসিয়া বায়, শিটা, নীলেন আভাযুক্ত (কার্বো-বেজ্) বা সীসার গ্রাণ হয় ; মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ, মলিন (আরোড্) এবং বয়স অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধ বলিয়া বোধ হয় (ওপিয়াম্) ; গালের স্থানে স্থানে চক্রাকারে লাল দাগ পড়ে ।

মুখ গহ্বর এবং গলার মধ্য । মাড়ি অত্যন্ত তল্ তল্ করে এবং উহা হইতে সহজে বস্তু পড়ে (মার্ক্, নাইট্-ক্-আন্, ফন্), কিন্তু উহা ক্ষীত হয় না বা উহাতে বেদনাত থাকে না, কিংবা অপ্রভাণে লালবর্ণ (আস্) এবং বেদনাবুক্ত ও দানবক্ত জিহ্বার মধ্য দিয়া আগাগোড়া লাল রেখা পড়ে ; মূণে ছগন্ধ (প্রাণিকালে) এবং মুখ দিয়া গাল পড়া (মার্ক্, নাইট্-ক্-আন্) ; জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক এবং উহা সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পিপাসা । গলার মধ্যে গাঢ় চট্ চটিয়া আঠা যেনা লাগিয়া থাকে, বাহ্যিক দরুণ রোগী বারম্বার গলায় থেকুর দিতে বাধ্য হয় ; ছান উঠিলে বা চাঁচিয়া ফেলিলে যেক্রপ হয়, গলার মধ্যে সেক্রপ জালা, টাটানি এবং চড়্ চড়ানি (আর্জেণ্ট্-মেট্) ; একখানি কাঠের চৌচ লাগিয়া থাকিলে যেক্রপ হয়, গিলবার সময়

গলার মধ্যে সেকুপ অল্পভূত হয় (এইলাস্, হিপ্-সাল্‌ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্); নিশ্বাস প্রশ্বাসে এবং গ্রীবা সঞ্চালনে গলার মধ্যে ঐরূপ বেদনা বা যাতনা অল্পভূত হয়; আল্‌জিহ্বা এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ কাল্‌চে লালবর্ণ (এইলাস্, ব্যাপ্ট্, বেল্, মিউর অ্যাস্, ফাইটোল্); মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ এবং আহার বহা গলমাণীৰ উপরিভাগে জ্বালা এবং শুকানুভব (অ্যাস্); আহার বহা গলমাণীতে থাকিয়া থাকিয়া খিলখিলা :

পাকস্থলী এবং উদর । চিনি বা নিষ্টদ্রব্য খাওয়ার অনিবার্য ইচ্ছা; আহারে অকচি; হয় অত্যন্ত পিপাসা, নতুবা পিপাসা একবারেই থাকে না; প্রত্যেকবার আহারের পূর্বে বাবদার প্রবল উদগার উঠা এবং উদগার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে নানা প্রকারের যাতনা; বাবদার কষ্টদায়ক কাঠ উদগার উঠিয়া অবশেষে উল্কারে গলা দিয়া প্রবলবেগে বায়ু নির্গত হয়; প্রত্যেকবার আহারের পর, প্রধানতঃ মধ্যাহ্নে আহারের পূর্বে, বমনোদ্বেগ (ককিউলান্, মার্ক্, প্লাভান্) এবং বমন দ্বারা কাল পদার্থ উঠে; রাত্রি ছুই প্রহরের সময় ঘুম ভাঙিলে মনে হয় যেন পাকস্থলীর মধ্যে কোন একটা ভাবি পদার্থ চাপিয়া রহিয়াছে, বাহার দরুণ বমনের উদ্বেগ হয়; প্রাতঃকালে বমন দ্বারা চক্-চকে স্রোত নির্গত হয় যাহা চিনিতে রসির ভাব দেখায়; অপরাহ্নে বমনের ইচ্ছা, সমুদয় শরীরের তরুলতা এবং কাপনি ও মনে হয় যেন মাথা একটা ধামা মধ্যে বহিয়াছে : আহার বা বরকেব কুন্দী ইত্যাদি খাওয়ার পর পাকস্থলীতে বেদনা, কান্দানি এবং জ্বালাভব, যাহা একস্থানে আরম্ভ হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত হয় ও আহারের পর যাবৎ অব্যাহত থাকি হয়; পাকস্থলীর বাম পার্শ্বে চতুর্দিকের ভাব বা ক্ষত করাব ভাব বেদনা বা যাতনা, স্পর্শনে বা দীর্ঘ নিশ্বাসে যাতনা বৃদ্ধি হয়; পাকস্থলীর মধ্যে কাপনি এবং দণ্ডপানি (পাল্‌স্, মিলিক্); পাকস্থলীর মধ্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ক্ষীতি এবং তন্দ্রকণ অত্যন্ত উদ্বেগ বা যাতনা । উদরে ভারি, পূর্ণ এবং ভারিবেদন ও উদার ক্ষীতি এবং বিবৃতি (অ্যটি-কুড্, অ্যালোজ্, চায়না) এবং তন্দ্রকণ অত্যন্ত উদ্বেগ বা যাতনা; উদরের মধ্য দিয়া স্তম্ভী বিধানের ভাব বেদনা বা যাতনা, যেন বিহাতেব ধাক্কা লাগার ভাব অল্পভূত হয়, যাহা কতকগুলি স্থির ভাবে থাকিয়া নড়িবার সময়ই অধিক হয়; তলপেটের ছুই

পার্শ্বে বেদনা ; উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার ; পেটে ভুট্ ভাট্ বা গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হওয়া ; উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার হেতু অজীর্ণ রোগ।

মল এবং মলদ্বার। মল সবুজের আভাযুক্ত (আমন-মিউর), অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত স্লেয়া (আস্) এবং মলত্যাগের সময় (রাত্রিতে) ফেড়্ ফেড়্ করিয়া গুল্ গুল্ দিয়া দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; মল সবুজ স্লেয়া (আস্, বেল্, ইপিকাক্, পাল্‌স্, মার্ক্, সাল্‌ফ্) এবং উহায সঙ্কে সঙ্কে কাঠবমী ও স্লেয়া বমন ; অন্ন পরিমাণে জলবৎ তরল ভেদ এবং উহায সঙ্কে সঙ্কে রাত্রিতে উদবে দূষিত বায়ু জনিত শূল বেদনাব হায় যাতনা ; মলে ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া পদ্যার হায় পদার্থ থাকে ; গুল্‌র পরিমাণে জলবৎ তরল ভেদ ; জল খাওয়ার পরই উদরাময় (আস্, ফ্রেটিন্, আলোজ্, কলোস্, ফেবাম্) ; সবুজ, কটাবর্ণের, রক্তনিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত স্লেয়া ভেদ, রাত্রি হই প্রহরের পর যাহার বৃদ্ধি হয় এবং তলপেটে টন্‌টনানি ; গুল্‌ দ্বাব দিয়া প্রবল শব্দে দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; বোগীর (ছোট বালক বা বালিকা) চিনি বা মিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু চিনি বা মিষ্ট দ্রব্য খাইলেই উদরাময় হয়।

মূত্রযন্ত্র। মূত্র ত্যাগের সময় ও উহার পর মূত্র নালীতে আলাহুতর (একন্, ক্যাঙ্) ; ক্ষীত হইলে যেরূপ হয়, মূত্রনালী সেক্রপ টন্ টন্ করে (ক্যানাবিস-স্যাট্) ; মূত্র অজ্ঞাতসারে ক্রমাগত এক ভাবে নির্গত হয় (কষ্ট) ; মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা এবং মূত্র সহজে ও পরিষ্কাররূপে নির্গত হয় ; ভাড়াভাড়ি মূত্রের বেগ এবং প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার মূত্র ত্যাগ (আপোসাইনাম্, ফস্-আস্) ; একস্থানি কার্ঠে টোঁচ বিধিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মূত্রনালীর ঠিক মধ্যভাগে সেক্রপ ক্ষতের স্থায় যাতনা বা বেদনা ; মূত্র এক ধারে না পড়িয়া ছিটিয়া অনেক ধারে নির্গত হয় ; অন্ন পরিমাণে কাল্‌চে করি দ্রাবণের মূত্র নির্গমন ; মূত্র কাল্‌চে লাবণ এবং উহাতে ইউরিক্‌ অ্যাসিডেব্‌ ক্রিষ্টাল্‌ (Uric Acid Crystals) তলানি পড়ে ; বাত্রিতে অম্লভে বা অনিচ্ছাপ্রসঙ্গ মূত্র নির্গমন।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের পুরুষাঙ্গ ছোট হয় এবং স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা একেবারেই থাকে না (অগারিকাস্) ; কান্দবা টানিয়া বিস্তৃত করিলে যেরূপ হয়, স্ত্রীসহবাসের সময় মূত্র নালীতে বা উহার মুখে সেক্রপ বেদনা হুত্ব বা যাতনা ; পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চন্দ্রে ক্ষত এবং উহাতে মাছের তৈলের

বাতির (Tallow) জার মাংস চুমটী বা পূর্ব হয়; পুরুষের খেঁয়ালি বা ওয়ার জার বেদনা বা যাতনা এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে ডাইন অথোকোষের বিরুদ্ধি ও কঠিনতা। জ্বীলোকের পুরুষ সহবাস করার সময় অত্যন্ত কষ্টানুভব এবং পুরুষ সহবাসের পরই যোনি ঘাব দিয়া রক্ত পড়া; জরায়ু স্থান দ্রষ্ট হয় (Prolapsus-uteri) এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু মুখ ও উঠার চতুর্পার্শ্ব বর্জী অংশে ক্ষত হইতুষ্টি, অরাম্, ফ্রিগাঙ্, নার্ক, (মিপিরা); অনিয়মিত রূপে বজঃস্রাব, অর্থাৎ নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে, না হয় অনেক পর, প্রচুর বা অল্প বজঃস্রাব, বক্ত বর্জদ্রব্য গাঢ় কান্টে পানী থানা থাকে; স্বপ্নে পুরুষ সহবাসে পরিতুষ্ট হওয়া; শেষ বজঃস্রাব বদ্ধ হওয়ার সময় (Change of life) জরায়ু হইতে অধিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে দায়বিক উত্তেজনা; ষিধবা বা যে সকল দ্রব্যী জ্বীলোকের সন্তানাদি হয় নাই, তাহাদিগের জ্বায়ু হইতে উক্ত প্রকারের রক্তস্রাব পাওয়া বোঝীকে বাবদ্যার আক্রমণ করে এবং বজঃস্রাব সঙ্গে সঙ্গে চিষকোষ প্রদেশে বেদনা বা যাতনা, বাহ্য গুহবারের উপরিভাগে এবং উক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; প্রচুর পরিমাণে হস্তিগ্রাবণে ক্ষতকাবক স্বেত প্রবল নিঃসরণ; গভাবস্থায় যেন হয় যেন বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী ফাটিয়া যাইবে; মাথা যেন বিস্তৃত হইয়াছে একপ অল্পভূত ।

শ্বাসযন্ত্র । কঠিনতা এবং গলার মধ্যে টাটানি বাহ্য প্রান্তকালে বৃদ্ধি হয়; কাশির সময় বায়ুপথের উপরিভাগে ছান উঠিয়া বা ওয়ার জার জালা এবং চড়চড়ানি; গাধকদের কঠিনাবীর প্রবাহন প্রদাহ (Chronic Laryngitis) (অর্জেন্ট-নেট্, অরাম্, ফন); উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে বা গান করিলে কাশির উদ্বেক হয়; এক ঘরে অনেক লোক থাকিলে যাব যেন বদ্ধ হইয়া আইসে; যন যন নিশ্বাস প্রাথন এবং উঠা সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ও তদনন্ত অত্যন্ত যাতনা; শুক আফেপিক হাপানি কাশির আক্রমণ, বাহ্য দরুন রোগী বাদিয়া। এদিক ওদিক চুলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়; অত্যন্ত উত্তেজক কাশি দিয়া সন্ধ্যায় যখন এবং রাত্রিতে অত্যন্ত কষ্ট দেখ; সন্ধ্যায় যখন বাশি, বাহ্য দরুন তানাক পওবা একবারেই বন্ধ হয় না (উপনেম); গলা দিয়া দিকা রক্ত নিশ্বিত পূর্ব নিগমন।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎপিণ্ডের কার্য অনিয়মিত এবং অনিয়ম (Irregular and intermittent) (ভিজিট, নেট্রান্-মিউর) এবং হৃৎপ্রদেশে কঠোরক-পূর্ণবোধ, বাহ্যিক দিকে মনোগেলেই অধিক অল্পভূত হয় এবং বহির্বিষ্মতে, নড়াচড়াতে বাহ্যিক উপশম হয়; প্রবল হৃৎস্পন্দন (একন্, আন্, বৈল্, স্পাইজেল্, বিরেট্-আন্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বগ; হৃৎপ্রদেশে প্রবল বেদনা বা বাতনা, বাহ্যিক দৃশ্যে নিশ্বাস প্রবাসের ব্যাঘাত জন্মে ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবাব গ্রহিণী স্বীতি এবং কঠিনতা, বাহ্যিক দৃশ্যে মনে হয় যেন রোগীর গরমীর ব্যাবাস কইরাছিল; কুঁচকির সন্ধির দুর্বলতা ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । বাহ্যিক পদ, প্রধানতঃ ইটিব সন্ধি, যেন চম্কিয়া উঠে, বাহ্যিক দৃশ্যে মনে ভাঙ্গিয়া যান, পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গের দুর্বলতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা বমী বমী করা ও কোন প্রকারের কার্য করিতে অনিচ্ছা (নাম্-বম); অনেককণ চলিয়া বেড়াইলে যেনকণ হয়, পায়ের ভিমে সেকণ প্রতিবোধ (চাবনা) ।

চর্ম । গায় নীলের আভাষিত কাল ক্ষুণ্ণী, আরক্ত-জব; বিন-পের ঠায় শয্যাক্ত ।

নিদ্রা । অস্থির এবং অবনয় কাণ নিদ্রা এং ভ্রান্তিক স্বপ্ন দেখা; নান্য প্রকারের চিন্তা বা কল্পনা আসিয়া যুগ্মেব ব্যাঘাত কল্পা ।

ব্যবহার । নষ্টিক এবং স্বাভাবিক মস্তিস্কের নান্য প্রকারের পুরাতন অস্থখ; মেলান্চোলিয়া (Melancholia); কটকটক উপদ্রবনা (Spinal irritation); মূণীরোগ; পক্ষাঘাত (Paralysis) এবং নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত (Paraplegia); পাকস্থলীতে বেদনা; হৃৎপিণ্ডে বেদনা; স্বচ্ছাঙ্গীক স্বাভাবিকভাবে পেশী বা অঙ্গচ্যাবনা অস্থখ বা লোকোমোটার আটাক্সিয়া (Locomotor Ataxy); শৈল্পিক বিল্লীর অস্থখ, চক্ষুপ্রদাহ; অজীর্ণ রোগ; উদরাময়; আমাশয়; অস্থির অস্থখ, প্রধানতঃ ক্ষুদ্র অস্থি পোকাব ধরা; কঠিনালীর পুরাতন প্রদাহ এবং হাপানি কাশি; হৃৎস্নায়ুশূল; মূত্রনালীর প্রদাহ; বহুমূত্র; অমেহ রোগ; গরমীর ব্যাবাস; মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) ইত্যাদি অস্থখে আর্জেন্টাম্ নাইটি কাম্ ব্যবহার্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । আক্ষেপের পূর্বে অত্যন্ত অস্থিরতা ; কোন নির্দিষ্ট সময়ে শরীর কম্পন ; ত্বর্কিতকারক কাবণে নিম্ন অঙ্গাঙ্গের পক্ষাঘাত ; মাথা এবং মুখবগল যেন বিস্তৃত হইতেছে একপ অল্পভূত হওয়া ; ভয় পাইয়া বা রক্তস্রাবের সমন্বয় শরীর আক্রমণ ; স্বেচ্ছাপূর্বক অঙ্গ সঞ্চালনে অশক্তি ; শবীরেব নানা স্থানে যেন চোঁচ বিঁধিয়া রহিয়াছে একপ অল্পভূত হওয়া ; পা শুকাইয়া যাওয়া ; উদরানয় বা আমাশয় রোগে দান্তের পূর্বে গুল্মদ্বার দিয়া ফেড় ফেড় শব্দ করিয়া সজোরে দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; স্নাত্তিতে, প্রাতঃকালে, উত্তাপে, ঠাণ্ডা দ্বারা গাইলে, চলিয়া বেড়াইলে বা ঘোড়া গাড়ীতে চাপিলে ও অস্বাভাবিক গল অল্পের ব্রন্ধ এবং বিশুদ্ধ বায়ুতে ও উদ্গার উঠিলে অল্পের উপশমন ইত্যাদি আরজেটাম্ নাইট্রিকামেব কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আরজেটাম্ নাইট্রিকামের কার্যের সঙ্গে আদিনিক্, মার্কিউরিয়াম্, ফসফাস্, হাইড্রোমায়নিক্ তালিড্, পিক্রিক্ অসিড্, আলাম্, হিপার মাল্‌কিউরিন্, নেট্রাম্ মিউরিয়টিকাম্ এবং নাইট্রিক্ অসিডের কার্যের অনেক মিলিত আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আদিনিক্, মার্কিউরিয়াম্, নেট্রাম্ মিউরিয়টিকাম্ এবং নাইট্রিক্ অসিড্, আরজেটাম্ নাইট্রিকামেব প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । অধিক মাত্রায় আরজেটাম্ নাইট্রিকাম্ দ্বারা বিবাক্ত হইলে, তৃষ্ণ এবং লবণের কল দাবহা ।

ডাইলুশন বিচার । ৩৪ এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কখন কখন ১০ এবং ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পুরাতন আকারের চক্ষুপদার্থে ১০০ ডাইলুশন প্রতি সূক্ষ্মে ৩ মাত্রা, একপ ৫৬ সপ্তাহকাল ব্যস্তা করিয়া ৪.৫ টী রোগীর চিকিৎসায় লেখক আশাতিরিক্ত কল পাইয়াছেন ।



## ব্যাপ্টিসিয়া টিংটোরিয়া,—বননীল,—ব্যাপ্‌ট্

(BAPTISIA TINCTORIA,—BAPT.-TINCT.)

উত্তর আমেরিকাহ্ শুক পার্শ্বীয় স্থানে এই গাছ জন্মে। এতদ্ব্যতীত এই গাছ জন্মিয়া থাকে। বসন্তকালে অথবা শরতকালে যখন ইহার পাতা পড়িয়া যায়, তখন এই গাছের মূল বা শিকড়ের বাকল সংগ্রহ করিয়া যথা নিয়মে উহা প্রকৃষ্টপরিষ্কৃত মিশাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ্ হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ায় মতে ব্যাপ্টিসিয়ার মূল আরোক উত্তর আমেরিকা হইতে সংগ্রহ করা কর্তব্য।

সাধারণ ক্রিয়া। রক্তের উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, বাহার দৰ্শন অবিকারে বৈকল্প হয়, এই ঔষধের কার্য দ্বারা রক্ত স্ফেদ গলনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। রক্তের মধ্যদিয়া ইহা মুণ্ডগুরু, গলার মধ্য এবং অঙ্গের শৈথিল্য বিস্তারিত প্রক্রিয়া করে। ইহা গতি এবং স্পর্শজ্ঞান উৎপাদক স্নায়ুগুলি আক্রমণ করিয়া বলক্ষয় এবং পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। সঞ্চালন এবং স্পর্শ জ্ঞান উৎপাদক উভয় প্রকারের শক্তিই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত অঙ্গের সঞ্চালন এবং উহার স্পর্শজ্ঞান উক্ত উভয় শক্তিরই বিনাশ হইতে পারে।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অনিচ্ছা এবং অশক্তি; মন যেন দুর্বল এবং গোলমেলে হইয়া যায় (এথ্রা, জেল্‌স্, ফস্, রাষ্টক্); নেসা করিলে যে রূপ হয়, মনে স্ফেদ গোলমেলে বোধ; কোন বিষয়ে মন স্থির ভাবে থাকে না, অতএব নানা প্রকারের চিন্তা আনিয়া মনকে অধিকার করিয়া ফেলে; শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া নানাদিকে বিভূত হইয়াছে বোঝা একরূপ মনে করিয়া উক্ত খণ্ড গুলি একত্রিত করার জন্ত বারবার বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করে এবং তদ্রূপ তাহার ঘুম হয় না; মস্তিষ্কের উত্তেজনা, রাত্রিতেই যাহা অধিক অল্পভূত হয়; অর্ধজ্ঞানহীনতা (Stupor) এবং প্রলাপ, প্রধানতঃ রাত্রিতে, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক স্বপ্ন দেখা; কোন বিষয়ে চিন্তাকরায় অশক্তি।

**ମୁକ୍ତକ ।** ମାଥାସୋରୀ ଏବଂ ଉହାର ମଞ୍ଜେ ମଞ୍ଜେ ସମୁଦ୍ର ଶରୀରର ହର୍ଷ-  
 ଲତା, ପ୍ରଧାନତଃ ନିମ୍ବାନ୍ନ ଏବଂ ହାଟୁର ; ମାଥାର ଭାରିବୋଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାତେଚାପିୟା  
 ଧ୍ୟାର ଗ୍ରାସ ଘୃଣଘୃଣେ ବେଦନା (କୋନାମ୍, ଜେଲ୍‌ସ୍, ହାଉଡ୍ରାଫ୍ଟି) ; କପାଳେ ବେଦନା  
 ଏବଂ ଉହାର ମଞ୍ଜେ ମଞ୍ଜେ ନାସିକାର ଗୋଡ଼ାର ଚାପାବୋଧ (ଏକନ୍, କ୍ୟାଲି-ବାହି) ;  
 ମାଥା ବଡ଼ ଏବଂ ଭାବି ବାଲିଆ ଅଭୁତ୍ତ ହସ ଏବଂ ଉହାର ମଞ୍ଜେ ମଞ୍ଜେ ମାଥା ଓ  
 ମୁଖମଂଡଳେ ଅବଶବୋଧ ; ମସ୍ତିଷ୍କେ ଟାଟାନି, ମାଥା ଟେଟ କରିଆ ଉପୁଡ଼ ହାଲେ  
 ସାହାର ବୁଦ୍ଧି ହସ ; ମାଥାର ଉପରିଭାଗ ଯେନ ଉଡ଼ିଆ ବାହିବେ ଏକ୍ରମ ଅଭୁତ୍ତ  
 ହସ (ସିମିସିକ୍) ; ମାଥାର ପଶ୍ଚାତ୍ୟାଗେ ଥେଲିଆ ଗାଓରା ବା ଗୋଡ଼ାହାଣି ପଢ଼ାର  
 ଗ୍ରାସ ଘୃଣଘୃଣେ ବେଦନା ; ଅବସର କାରକ ଘୃଣଘୃଣେ ମାଥାଧରୀ (କୋନାମ୍, ଡାଲ୍‌କ୍,  
 ଜେଲ୍‌ସ୍, ହାଉଡ୍ରାଫ୍ଟି) ; ମାଥା ଯେନ ଭାସିଆ ଖଞ୍ଜ ଖଞ୍ଜ ହାଉଡ୍ରା ଉଡ଼ିଆ ଶିଆଛେ ଏକ୍ରମ  
 ଅଭୁତ୍ତ ହସ, ସାହା ରୋଗୀ (ଦ୍ରୌଲୋକ) କୁଡ଼ାହିନୀ ଏକବିତ କରାର ପ୍ରସାସ ପାମ  
 (ଝିଲ୍‌ମନ୍) ।

**ଚକ୍ର ।** ଚକ୍ରବ ମୋଲକ ଟାଟାନି ; ଚକ୍ରବ ମୋଲକେ ଟାଟାନି ଏବଂ ଉହାର  
 ମକାମନେ ଅଗଞ୍ଜି ; (ବାହି, ସିମିସିକ୍) ।

**ମୁଖମଂଡଳ ।** ମୁଖମଂଡଳ ଲାଲବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶୋଷଣ ତାମ୍ର ଟଙ୍ଗୁଲେ, ହାଉ-  
 ଯେର ରକ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଉଷ୍ଣ, କାଳ୍ପିତେ ଗାଳିବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗତାନ୍ତ ଉଦ୍‌ବେଗୁକ୍ତ ।

**ମୁଖଗହ୍ବର ଏବଂ ଗଳାର ମଧ୍ୟ ।** ମାତ ଏବଂ ଓଢ଼ କାଳ୍ପିତେ ଗଳାର  
 ଘାଆ ଆବୃତ (Sordes, (ଏହାହାତ୍, ମାସ୍ ଟିମ୍) ; ଛିଛାର ମଧ୍ୟଭାଗ ହାରିଦାଳ ;  
 ଛିଛା ପ୍ରଥମତଃ ସାଫା ଏବଂ ଉହାର ମଧ୍ୟେ ମାଳ ଗଳାର ଗ୍ରାସ କୁଡ଼ାହିନୀ ଓ  
 ତତ୍ପର ମଧ୍ୟ ଭାଗ କଟାବର୍ଣ୍ଣେ ଲେପବୁକ୍ତ ଏବଂ ଉହାର ମାଧ୍ୟମା ମାଳ କାଳ୍ପିତେ  
 ଲାଲବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ; ଛିଛା ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଉହାର ମଧ୍ୟ ଭାଗ କଟାବର୍ଣ୍ଣ (ପ୍ରୋସାମ୍ ;  
 ଛିଛା କଟା ଏବଂ କତୟୁକ୍ତ ଏପିମ୍, ଅମ୍, ବାସ୍ ଟିମ୍) ; ମୁଖେ ଗ୍ରହଣ, କତୟ  
 ପରିମାଣେ ଆଟାଳ, ଶାବ ଶୁକ୍ର, ଲାଳ ଉଠା, ମାଳ ଗହ୍ବରେ ପଞ୍ଜୁକ୍ତ କତୟ ଏବଂ  
 ଉହାର ମଞ୍ଜେ ମଞ୍ଜେ ମୁଖେ ଲାଳ ଉଠା (ବାକ୍, ନାଉଟିକ୍-ଆମ୍) ; ଶର ଗୋଷ୍ଠେ ଛିଛା  
 ଏବଂ ମୁଖଗହ୍ବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର (ଏକନ୍, ଆମ୍, ବାହି) ; ମୁଖେ ପଞ୍ଜାହର୍ଷକ୍, (ହାରିକା,  
 ହିପ୍-ମାଲ୍‌କ୍, ଆଗୋଡ଼, ଛିଛାଜ୍, ନାଉଟିକ୍-ଆମ୍, ପାମ୍) ; ମୁଖେ ମେଶର  
 ଗ୍ରାସ ଗହ୍ବ ; ମୁଖେ ଛିଛା ଶାବ ଅଥବା କୋମ୍ ଅଦି ଥାକେ ନା (ଗୋରାଜ୍, ବାହି, ହିପ୍-  
 ମାଲ୍‌କ୍) ; ଚାଞ୍ଚିଲେ ସେକ୍ରମ ହସ, ଛିଛାସ୍ତେ ସେକ୍ରମ ଅଭୁତ୍ତ ହସ ; ଗହ୍ବର ମଧ୍ୟେ

সঙ্কোচন বা উহাতে অঁটাঁবোধ, বাহার দক্ষণ বারম্বার ঢোক গিলিবার ইচ্ছা হয় (অস্, বেগ্, হায়োস্) ; মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ কাল্‌চ লালবর্ণ (নেজা) এবং উহাতে কাল্‌চ পড়া ক্ষত (মিউর-অস্, ক্যালী-বাই) ; টনসিল্‌স্ (Tonsils) এবং কর্ণমূগস্থ গ্রন্থির স্ফীতি; কিন্তু উহাতে বেদনা থাকে না ও উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বলক্ষম ; ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria), বাহার দক্ষণ অক্রান্ত স্থানে পড়ানুক ঘা হইবা কাল্‌চ এবং হুর্গক্ষুজ্জ হয় (ক্যালী-বাই) ।

পাকস্থলী এবং উদর । পাকস্থলী যেন পড়িয়া নেতা পানা হয় (মিমিসিক্, হাইড্রাঠ্, ইথুনেস, মিসিয়া, সাল্‌ফ্) ; ক্ষুধাশূন্যতা । যকৃতে বেদনা এবং তদক্ষণ যকৃতের পিত্তাবরে এত প্রবল বেদনা হয়, যে উহার দক্ষণ রোগী চিনিত পারে না ; যকৃতের পিত্তাবরে অনবরত বেদনা (বার্কে-রিস্) ; ডাইন প্রোবী প্রদেশে (Right Iliac Region) অত্যন্ত বেদনা এবং টাটানি (ব্রাই, চারনা, ক্যাপ্প্), এবং চাপিলে উহাতে ঘড়্, ঘড়্ শব্দ হয় ; চাপিলে উদর প্রদেশস্থ পেশীতে অত্যন্ত বেদনা এবং টাটানির উদ্বেক হয় ।

মল এবং মলবার । বারম্বার অল্পপরিমাণ, তরল, কাল্‌চে এবং ক্ষত কারক, হুর্গক্ষুজ্জ মলত্যাগ (অস্) ; অত্যন্ত হুর্গক্ষুজ্জ, হুর্গলকারক উদগায় (অস্) ; বোলাটিনা এবং প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা মিশ্রিত মল ত্যাগ, কিন্তু উহার সঙ্গে বেদনা যন্ত্রণাদি কিছুই থাকে না ; কাল্‌চে কটাবর্ণ, রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার কঠিনায়ক কোঁথপাড়া এবং বিকারের লক্ষণ (অস্) ; আর্মাণশ এবং টাট্‌কা রক্ত বা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ ; দান্তের পূর্বে পেটে অত্যন্ত বেদনা, দান্তের সময় এবং উহার পর অত্যন্ত কঠিনায়ক কোঁথপাড়া (মাক্) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রত্যাগের সময় মূত্র নানীতে জ্ঞানাত্তব (একন্, অস্ ক্যাহ্) ; মূত্র পরিমাণে অল্প এবং কাল্‌চে লালবর্ণ (একন্) ।

শ্বাসযন্ত্র । হুক্ষুমে রক্তাধিক্য বা রক্তাববোধ এবং উহার সঙ্গে শ্বাস কষ্ট, বিছানায় ঘনিয়া থাকিলেও বাহার উপশম হয় না ও বাহার দক্ষণ বিশুদ্ধ বায়ু সেৎনের আশাব বোণী ঘরের জানালার নিকট ফাইতে বাধ্য হয় (সাল্‌ফ্) ; পূর্ণ নিশ্বাস টানিতে অশক্তি এবং শ্বাস যন্ত্রের শক্তির অভাব বা হ্রাস ; শ্বাস কষ্টের দক্ষণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং রোগী কুক্ষুমে

অত্যন্ত আঁটা অম্লভব করে, বাগার দরুন বিস্তৃত বায়ু সেবন করার অত্যন্ত ইচ্ছা হয় (আস', কার্বো-বেজ', সাল্ফ') ; বৃকে সঙ্কোচন এবং কষ্টান্নভব ও ডাইন ফুফুসে বেদনা ।

**নাড়ী ।** নাড়ী প্রথমতঃ অত্যন্ত দ্রুতগামী এবং তৎপর যুগতি বিশিষ্ট এবং লুপ্ত প্রায় হয় ।

**গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ ।** গ্রীবাদেশস্থ পেশী শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং উহাতে সঞ্চালন শক্তি থাকে না ; পৃষ্ঠদেশ এবং কুঁচকি অত্যন্ত শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ও উহা অত্যন্ত কন্ কন্ করে ; অনেকক্ষণ চলিয়া বেড়ানের পর বা অনেকক্ষণ মাথা হেটু করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে ঘেঁরুপ হয়, শুষ্কতারের ঠিক উপরিভাগে সেরুপ ক্রান্তি, চাপা এবং ঘূর্ণঘূর্ণে বেদনামুভব, যাহা অতি শীঘ্রই কুঁচকির চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান এবং ডাইন পা পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

**অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি ।** সন্ধিতে মোচড় ইয়া পড়া বা খেঁচলিয়া বা ওয়ার জ্বায় বেদনা বা যাতনা এবং তদ্রূপ উহার সঞ্চালনে অশক্তি (আর্পিকা, রডোড, কটী) ; হাত স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া অনুভূত হয় ; বাহু এবং পায় কসিয়া ধরার জ্বায় বেদনা বা যাতনা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কন্ কন্ নানি ; বাম বাহু এবং হাতে অবশবোধ ও উহাতে কুটকুটানি ; পায়ের ডিমে কসিয়া ধরার জ্বায় অত্যন্ত প্রবল বেদনা বা যাতনা ; হাত পা ইত্যাদি অত্যন্ত দুর্বল হয় এবং কাঁপে ।

**জ্বর ।** বহির্বিষ্মৃত হাতবোধ ; পৃষ্ঠদেশ এবং নিম্নাঙ্গে শীতবোধ ; সমুদয় শরীর উষ্ণ ও শুষ্ক এবং উগাণ সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে শীত, যাহা পৃষ্ঠদেশের উপরি এবং নিম্নভাগে অধিক অনুভূত হইয়া থাকে ; আঙ্গিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার, বা যে প্রকার জ্বরে ম শুষ্ক অধিক আক্রান্ত হয় এবং রোগী ব্যৱস্থার প্রলাপ বলে ও মধ্যে মধ্যে অচেতন হওয়ার জ্বায় ঘুমটীরা পড়ে ; যাতনার দরুন যন্ত্র হইয়া যাতনাদির কতক উপশমন হয় ; যুগ্মমণ্ডল এবং কপালে দুমিত ঘর্ম ; কপা বাগতে বলিতে বা কোন প্রকার উত্তর দিতে দিতে গভীর নিদ্রা আসিবে ; মাথা ঘেঁষ ভাঙ্গিয়া থণ্ড থণ্ড হইয়া উড়িয়া গিয়াছে এরূপ অনুভূত হওয়ার দরুন পোষ্টে উহা কুড়াইয়া একত্রিত করার প্রয়াস

পায় ; মুখমণ্ডল কাল্‌চেনালবর্ণ এবং অত্যন্ত উদ্বেগযুক্ত ; পেশীতে টাটানি এবং বিছানার কঠিন স্পর্শভূত হওয়া (বাস্টাঙ্ক, আর্নিকা) ; বিকারের লক্ষণাক্রান্ত আরক্ত-জ্বর এবং উষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে ক্ষত, মুখে দুর্গন্ধ, জিহ্বা শুষ্ক ও ক্ষতযুক্ত এবং বমন ।

নিদ্রা । সামান্য রকমের অচেতনতা এবং উষ্ণার সঙ্গে প্রলাপ বলা ; রোগীর নিকট কথা বলিলে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে (হার্যোম) ; রাত্রি ২টা বা ৩টা পর্য্যন্ত ঘুম ভাল হয় এবং তৎপরে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রোগীর ঘুম হয় না, ঘাইবা দ্রুত সে ক্রমাগত ছটফট করে ; সর্বদা ক্রিমান এবং তদ্রূপ অবসন্ন বা ক্লান্তিবোধ ; চক্ষু অন্ধ খোলা রাখিয়া ঘুমানের ভাব ; নিদ্রাশূন্যতা বা অস্থির নিদ্রা এবং তদ্রূপ ঘুমেরবোধে ভয়ানক স্বপ্ন দেখা ।

চর্ম । চর্ম অত্যন্ত উষ্ণ এবং উহাতে অত্যন্ত জ্বালাহুতব (আর্স) ; গায় হাম বা আমবাতের স্থায়ী ফুস্ফুসী (একন্, আণ্টি-ফ্লু, ককিয়া, পাল্‌স) ।

বাবহার । আণ্ডিক-জ্বর বা জ্বর-বিকারের প্রথমাবস্থা এবং সকল প্রকারের বিকারের লক্ষণাক্রান্ত ও দুর্বলকারণ জ্বর এবং অন্তান্ত রোগের প্রথমাবস্থা ; শৈল্পিক বিষার ক্ষত, প্রধানতঃ মুখগহ্বরে ; ডিপ্‌থিরিয়া ; মুখে ঘা ; পাকস্থলীর প্রদাহ এবং উহাতে বেদনা ; মুখে পচাযুক্ত ঘা (Cancrum oris) ; সামান্য এবং বিকারের লক্ষণাক্রান্ত রক্তমাশয় ; একজ্বর ; পিত্ত-জ্বর ; যক্ষা কাশে পূর্ব নিঃসরণ হেতু জ্বর বা হেক্টিক ফিবার (Hectic Fever) ; উদরাময় ; রক্তমাশয় ; মস্তিষ্ক ও কসেঁককা মজ্জাবিরক বিষার প্রদাহ (Cerebro-Spinal Meningitis) ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অস্থিরতা, ভাল ঘুম না হওয়া (একন্, আর্স, বাস্টাঙ্ক), অগ্ন্যবোধ এবং শয়ন করিয়া থাকিব ইচ্ছা ; সমুদয় শরীরেই মোঁচড়াইয়া পড়া বা খেঁতলিয়া যাওয়ার স্থায় বেদনা বা যাতনা ও ক্লান্তিবোধ (আর্নিকা, চায়না) ; দুর্বলতা এবং শরীর কম্পন ; নিম্নজের দুর্বলতা ; গায় চাপিয়া বা কসিয়া ধবার স্থায় বেদনা বা যাতনা (বেল্, মেক্‌জিরিয়াম, নাক্স-বম্, বাস্টাঙ্ক) ; সমুদয় অংশের শৈল্পিকবিষার ইহাতে নিঃসরণই অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (কার্কো-বেজ্) ; ডাইন অংশই অধিক

আক্রান্ত হর (বেল, আইরিস্, লাইকোপ্); নড়া চড়াতে অস্থির বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে অস্থির উপশম (একন্, ব্রাই, মার্ক্) ইত্যাদি ব্যাপ্তিসিয়ার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। অর-বিকার এবং বিকাবের লক্ষণাক্রান্ত শিশুগণের স্বল্প বিরাম্য অরে ব্যাপ্তিসিয়ার কার্যের সঙ্গে জেল্‌সিমিষামের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। অব রোগে ব্যাপ্তিসিয়ার কার্যের সঙ্গে ব্রাইওনিয়া, ডিউরিয়াটিক্‌ অসিড্‌ এবং রাস্‌ট্রেন্‌ব সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ব্যাপ্তিসিয়ার কার্যের সঙ্গে আদিমিক্‌, আর্গিকা, হায়োসায়িনাস্‌, মার্কিউব্রিয়াস্‌, নাইট্রিক্‌ অসিড্‌ এবং ওপিয়ামের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার। ১ম দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক সময় মূল আরোক দ্বারা মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়। অনেক চিকিৎসক এই ঔষধের ৩, ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। লেখক কখনও উক্ত ক্রমগুলি ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। অতএব উহার গুণাগুণ সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না।

### বারাইটা কার্বোনিকা,—বারাইটা কার্ব্

(BARYTA CARBONICA,—BARYT-CARB.)

ইহাকে কার্বোনেট্‌ অব্‌ বেরিয়াম্‌ও (Carbonate of Barium) বলিয়া পাকে। কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত কার্বোনেট্‌ অব্‌ বেরিয়াম্‌ ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে স্ফাপি অব্‌ নিক্‌ এর সহিত মিশ্রিত করিয়া ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত ইহার শুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক ক্রমের শুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া পাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহা মস্তিষ্ক এবং গ্যাংলিয়োনিক্‌ স্নায়ুগুলকে (Ganglionic system of nerves) উত্তেজিত এবং অবসন্ন করিয়া শারীরিক এবং মানসিক তুর্লভতা উৎপাদন করে, যাহার দরুণ অকালে শরীর ক্লান্ত এবং বৃদ্ধ বহুসংখ্যক ত্রাস চল্‌ ডলে বা শিথিল হয়। লিম্ফেটিক্‌

গ্রন্থির (Lymphatic glands) উপরও ইহার বিশেষ কার্য আছে। এই কার্যের ফল গলার মধ্যের লিম্ফেটিক গ্রন্থিতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তালুকার পার্শ্বস্থিত গ্রন্থিবয় (Tonsils) অতিক্রান্ত হওয়া উক্ত কার্যের এক বিশেষ উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। কোন বিষয়ে স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়াতে অশক্তি এবং তদ্রূপ অনবরত মত পরিবর্তন করা (ইগ্‌নেস); ভয়, বা অরণ শক্তির অত্যন্ত হ্রাস বা বিনাশ, বাহার দরুণ কথ্য বলিয়া তৎক্ষণাৎ উহা ভুলিয়া যাইতে হয় (হার্ণিকা)। অত্যন্ত শারীরিক এবং মানসিক দুর্বলতা ও ছেলে মানুষের জায় স্বভাব; বৃদ্ধ বয়সে অত্যন্ত শারীরিক এবং মানসিক দুর্বলতা; অরণ শক্তির অত্যন্ত হ্রাস; শিশুকে কোন কথা শিখাইলে তাহার সে কথা অরণ থাকে না (ক্যাক্স-কস); আপনার উপর বিশ্বাস থাকে না; অপরিচিত লোকের ভয়; রোগী (স্ত্রীলোক) মনে করে যেন অত্রে তাহার কার্য দেখিয়া দোষ গুণ বিচার করিবে এবং হাসিবে; রোগী (শিশু) খেলা করিতে চাহে না; রাগের উদ্বেক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভীকতা।

মস্তক। সংজ্ঞাশ রোগ, মাথা ঘোরা; শিশুর জায় স্বভাব বিশিষ্ট বৃদ্ধের উক্তবোগ; স্বর্ষ্যে উত্তাপে দাঁড়াইলেই মাথার উপরিভাগে চাপিয়া বা কসিয়া ধরার জায় বেদনা বা বাতনা যাহা সমুদয় মাথায় বিস্তৃত হয়; মাথায় টাক পড়া বা মাথার তালু চুল পড়িয়া যাওয়া (জিক্স); যে পার্শ্বে শয়ন করা যায় মাথার সে পার্শ্বে বেদনা বা বাতনা এবং টাটানি, চুলকাইলে বাহার বৃদ্ধি হয়; শিশুগণের মুখমণ্ডলে কল্‌তানি বিশিষ্ট বা মরা চর্ম বিশিষ্ট ফুসুড়ী (ক্যাক্স-কার্ল, গ্রাফ, হিশ-সাল্‌ফ, লাইকোপ); মাথায় জল পূর্ণ আব (Tumour)।

চক্ষু। দৃষ্টিহীনতা; একখানি পাতলা বা সরু কাপড়ের মধ্য দিয়া তাকাইলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ বাত্যা দেখা (কষ্ট, কস); চক্ষু প্রদাহ এবং তদ্রূপ চক্ষে শুষ্ক বোধ; চক্ষুর তারা ক্রমাগত একবার সঙ্কুচিত হয় এবং একবার বিস্তৃত হয়।

কর্ণ। ডাইন কর্ণ মূলস্থিত গ্রন্থি ক্ষীণ এবং স্পর্শনে বেদনায়ুক্ত হয়;

কানের মধ্যে কসিয়া ধরা বা স্ফু স্ফু কবার জ্বাষ যাতনা ; কানে ছিড়িয়া ফেলার জ্বাষ বেদনা এবং উহার সঙ্গে ডাইন কানের সম্মুখ ভাগস্থিত হাড়ে ছিদ্র করা বা কসিয়া ধরা জ্বাষ বেদনা বা যাতনা ; কানের মধ্যে চুলকানি ; হাঁচিবার সময়, গিলিবাব সময় অথবা তাড়াতাড়ি চলিবার সময় কানের মধ্যে কেঙ্ কেঙ্ শব্দ হওয়া (গ্রাক্) ; প্রবলবেগে নাক ঝাড়িবার সময় কানে শব্দের প্রতিধ্বনিত শ্রুতিতে পাওয়া যায় ।

নাসিকা । নাকেব মধোব অনিবার্য শুষ্কতা ; নাক দিয়া গাঢ় হরিদ্রা বর্ণের স্লেয়া নির্গমন (এইলাস্) ; সন্ধি এবং উপবেশ ওঠ ক্ষীত : শিশুগণের মোটা পেট (ক্যাস্-কার্প্) ; বায়বার নাক দিয়া রক্ত পড়া ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা কিকি এবং শোথের জ্বা টল্টলে ও ক্ষীত (আস্) ; নাকের জ্বাষ পড়িয়া থাকিলে যেকূপ হয়, মুখমণ্ডলে সেকূপ কসিয়া ধরা জ্বাষ অন্তর্ভূত হয় (আলান্, রোমিন্, গ্রাক্) ; মুখ বুজিবার সময় মাড়িব হাড়ের সন্ধিতে বেদনানুভব ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে । জিহ্বা আবদ্ধ থাকিলে পেশুয়ক ; জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা এবং চিড়িক মাথা ; জিহ্বা ক্ষত এবং ফাটায়ুক্ত ; জিহ্বার পক্ষাঘাত এবং তদ্বৎ কণা বলিতে অশক্তি (কষ্ট্, জেন্স) ; মুখগহ্বরের মধ্যে কোষ্ঠাব জ্বাষ কুৎস্তা যাহা গলার মধ্যে এবং তালুকায়িত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় ; মুখের মধ্যে প্রচুর কঠিন তন তলে স্লেয়ার সদ্য ; মুখগহ্বর অত্যন্ত শুষ্ক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা (একন্, আস্, ব্রাট) । কোন দ্রব্য বা ডোহ গিলিবাব সময় গলার মধ্যে জ্বালা এবং চিড়িক মাথা , প্রত্যেকবার ঠাণ্ডা বা স্নেহ উন্মিল (Toussils) প্রদাহ যুক্ত হইয়া উঠতে পূর্ব হওয়া উচিত হয় (হপ্, দাবক্) ; উন্মিলের পূর্বাতন আকালের বিরক্তি এবং কঠিনতা (ক্যাক্, কার্প্) ; গলার মধ্যের সন্ধোতন ; ডেবার জ্বাষ কোন পদার্থ যেন গিলিয়া বহিবাহে গিলিবাব সময় গলার মধ্যে একপ অন্তর্ভূত হয় (বেল্, ক্যানী-বাট, হিপ্-সালক্) ; হস্তাঙ্ঘ্রির নিম্নভাগান্ত গ্রন্থি অত্যন্ত কষ্টদায়ক ক্ষতি এবং কঠিনতা (এরান্, ক্যাক্-কার্প্, আমোড, পান্-ডম্, নোঁদাম-কার্প) ।

পাকস্থলী এবং উদর । জ্বাষাব ৩৬ বটে, কিন্তু কোন দ্রব্য



বাইতে রুচি থাকে না ; পাকস্থলীতে দুর্বলবোধ, আহার কবিলে যাহা দ্রুত হয় ; এক খানি পাথর চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেক্রপ ভারি বোধ (অসি, ব্রাই, মার্ক, পাল্‌স), উষ্ণাব উঠিলে যাহার উপ-শম হয় ; পাকস্থলীতে অত্যন্ত টাটানি, প্রত্যেকবার পা বাড়াইলেই যাহা অধিক বেদনায়ুক্ত হয় ; পাকস্থলীতে অত্যন্ত টাটানি, বাহ্যিক দক্ষণ আহার সময় মনে হয় যেন আহার দ্রব্য ক্ষতযুক্ত স্থানের উপর দিবা চলিয়া যাইতেছে ; উদর ক্ষীত, বিস্তৃত এবং কঠিন (অসি, মার্ক, ল্যাক্) ; বিজ্ঞানায় পাশ ফিরিবার সময় মনে হয় যেন অল্প উদরের মধ্যে এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব ধপ্ করিয়া হঠাৎ পড়িয়া যায় ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের স্ত্রী সহবাসের শক্তির হ্রাস (অগ্নাশ) ; স্ত্রীসহবাসের শক্তির বৃদ্ধি (অগ্নারিকাশ) ।

শ্বাসযন্ত্র । নাক দিয়া ধূম টানিলে যেরূপ হয়, কণ্ঠনালীতে সেক্রপ অনুভূত হয় (নেটাম্-অসি, ব্রোগিন), অথবা আকাতরার গন্ধ প্রবেশ করিয়া কণ্ঠনালীতে এই প্রকার অনুভূত হয় ; বন্ধ বয়সে শ্বাসরোধক শৈথিল্যকরোগ ; ফুফুনের পক্ষাঘাত হওয়ার উপক্রম হওয়া ; গলার মধ্যে খশ্‌খশে এবং হুড়্‌ হুড়্‌ করার দক্ষণ আক্কেপিক কাশি (নাল্‌বম), সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত যাহার বৃদ্ধি হয় ; কাশিবার সময় বৃকের মধ্যে টাটানি (অগ্নিকা) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় এবং মাথার পশ্চাৎভাগের গ্রন্থির ক্ষীতি (ক্যাক্স-কার্স, কার্ভো-বেজ্, আরোড্) ; ঘাড়ের শক্ত বোধ বা উহা নোয়ানে অশক্তি ; কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । বাহ্যে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বোগলের গ্রন্থির ক্ষীতি এবং কঠিনতা (সাইলিসি) ; বাম পায়ে আগা গোড়া কনিয়া ধরার ভার বেদনা ; হাটের সন্ধিতে হাতী বন্ধানের ভার বেদনা ; পায়ের পাতায় ঘর্ষকযুক্ত ঘর্ম (নাইট্রিক্-অসি, সিপিয়া) ।

নিদ্রা । রাত্রিতে বারংবার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া ; রোগী অত্যন্ত গরম বোধ কবে ; পায়ের পাতায় মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁতলিয়া যাওয়ার প্রায় বেদনা অনুভূত হয় ।

চর্ম । গ্রীবাদেশে চর্বি বিশিষ্ট আঘ (Fatty tumours) ; শরীরের

স্থানে স্থানে জালা এবং কুটুটানি ; গ্রন্থির ক্ষীতি এবং কঠিনতা (কার্ক-কার্ক, আরোড, হিপ-সাল্‌ফ্‌, গ্রাক্‌); শরীরের স্থানে স্থানে কল্‌তানি বিশিষ্ট ক্ষত ; গায় আঁচিল (Warts) (খুজা) ।

ব্যবহার । তালুকার পার্শ্বস্থিত গ্রন্থি দ্বয়ের প্রদাহ (Tonsillitis) ; উহাদের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা ; গ্রন্থির প্রদাহ, ক্ষীতি এবং ক্ষত ; শরীর অকালে বৃদ্ধের ছায় চল্‌তলে হয় ; বৃদ্ধ বয়সে সার্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত ; ধ্বজ-ভঙ্গ ; হিষ্টিরিয়া ; হাপানি কাশি ; চর্নিবিশিষ্ট আঁচিল (Fatty Tumours) ; আঁচিল (Warts) ইত্যাদি অস্থ্যে ব্যারাইটা কার্‌পোনিকা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শরীরে ক্রান্তি এবং তারিবেদ ; বৃদ্ধ বয়সে মানসিক এবং শারীরিক দুর্বলতা , ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য না হওয়া (ককিউলাম্‌, সিপিয়া, সাইলিসি) ; শরীরের এক (বাণী) পার্শ্বে জগ্‌জগ্‌ত ঘর্ষ ; শরীর খাট (বামনের ছায়) ; মানসিক এবং শারীরিক পরিপোষণের বিবৃদ্ধি বা অভাব ; বৃদ্ধবয়সে বামনদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী ; গণ্ডমালা খাটু বিশিষ্ট শিশু বা ছোট বাগলক বালিকাগণের অস্থ্য, প্রদানতঃ যে সকল রোগীর সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই উন্‌দিল্‌ প্রদাহযুক্ত এবং ক্ষীত হয় ; বাম নিকই অধিক আক্রান্ত হয় ; প্রাতঃকালে, বসিয়া থাকিলে, রোগের লক্ষ-ণাদি সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, আক্রান্ত স্থান পুঁলে বা ভিজাইলে, বেদনাকৃত পার্শ্বে শয়ন করিলে অস্থ্যের টুকি এবং বাহ্যিকভাবে চলিয়া বেড়াইলে অস্থ্যে উপশম ইত্যাদি ব্যারাইটা কার্‌পোনিকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ব্যারাইটা কার্‌পোনিকার কার্য্যের সঙ্গে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্‌পোনিক, ম্যাকউরিয়াস্‌, সাইনিসিয়া, আনাম, বেলা-ডোনা, ক্যাল্‌কেরিয়া আয়োডাইড্‌, কষ্টিকাম্‌, চাপনা, জেন্‌বিসিয়াস্‌, আরোডিন্‌, ফফাস্‌, সিপিয়া এবং মাল্‌কালের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । অ্যান্টিমোনিয়াম্‌ টাটারিকাম্‌, বেলেডোনা, ক্যাল্‌ফার, ডাল্‌কেমেরা, জিঙ্কাম্‌ ইত্যাদি ব্যারাইটা কার্‌পোনিকার প্রতি-ষেধক ঔষধ মন্দো পরিগণিত । অধিক মাত্রায় কার্‌পোনেট অব্‌ বেরিয়াম্‌ দ্বারা বিধাক্ত হইলে সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ সোডা অথবা ম্যাগ্‌নেসিয়া ব্যবস্থা ।

ডাইগ্‌নসন বিচার । ৬ এবং ১২ ডাইগ্‌নসনই সচরাচর ব্যবহৃত

হইয়া থাকে । টন্সিলের পুরাতন আকারের প্রদাহ এবং কঠিনতাতে ৬ষ্ঠ শতাব্দিক ক্রিমের আরোক বিশেষ উপকারী । টন্সিল প্রদাহযুক্ত এবং ক্ষীণ হইয়া উঠাতে পুঁথ এবং ক্ষত হইলে, ১২ ডাইলুশন অপেক্ষাকৃত অধিক উপকারী । টন্সিলের পুরাতন আকারের প্রদাহ এবং বিবৃদ্ধিতে একটী ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক বালকের চিকিৎসা ৩০ ডাইলুশন, প্রতি দিন প্রাতে ১ মাত্রা, এবং তৎপর ২০০ ডাইলুশন ১ দিন অন্তর এক দিন এক মাত্রা, এই প্রকার ৩ সপ্তাহকাল ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে ।

### ক্যাক্টাস গ্রাণ্ডিফ্লোরাস,—ক্যাক্ট্

(*Cactus Grandiflorus*,—*Cact. Grand*)

মেম্ব্রিকো এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দীপে এই গাছ স্বভাবতঃ অধিক জন্মিয়া থাকে । ফুল ফুটিলে এই গাছেব ফুল এবং ফুলের নিকটবর্তী কোমল পাতা এবং ডাঁটা সংগ্রহ করিয়া বথানিয়মে প্রক্স্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । নেপোল্‌স্ নিবাসী ডাক্তার রুবিনী (*Dr. Rubini*), যিনি এই ঔষধ প্রথম পরীক্ষা করেন, তাঁহার মতে এই গাছ যে স্থানে জন্মে সে স্থানে প্রস্তুত করা মূল আরোকই আনাদিগের ব্যবহার করা উচিত ।

সাধারণ ক্রিয়া । রূপিণ্ড এবং ধমনির চক্রাকারের স্তরের উপর উচ্চাৰ কার্য্য অতি প্রবল, তাহার দরুন উক্ত স্তরাদির উত্তেজনা, অতিরিক্ত স্পর্শজ্ঞান, স্নায়ুশূল, আক্ষেপ এবং সংস্পন্দন হইয়া থাকে । নিউমোগ্যাস্ট্রিক্ স্নায়ু (*Pneumogastric nerve*) দিয়া রূপিণ্ড, কুক্ষুস এবং পাকস্থলীর উপর কার্য্য করিয়া ইহা অজীর্ণ বোগ, পাকস্থলীর অস্বরোগ এবং কুক্ষুসের সঙ্কোচন হ্রাসপানি কাশি উৎপাদন করে । এক খানি লোহের পাতা দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সেকপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে, প্রধানতঃ হৃৎপ্রদেশে, সেকপ আঁটারোধ হওয়া কাল্কটাসের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা কার্য্যের ফল মধ্যে পরিগণিত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । বিমর্ষ ভাব ; নিস্তব্ধতা এবং মনবোগ বা হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস্

(Hypochondriasis); কঁদিবার অনিবার্য ইচ্ছা (লাইকোপ্, নেট্রাশ্, নাক্স-মফ্, প্রাটিনা, পাল্‌স্); সর্বদা কঁাদা, রোগী জানে না সে কেন কঁাদে ।

**মস্তক ।** একটী ভারি বস্ত্র চাপিয়া থাকিলে যেক্রপ হয়, মাথার উপরিভাগে সেক্রপ ভারি এবং চাপিয়াধরাব জায় অল্পভূত হয় (আলোজ্), চাপিয়া ধরিলে যাহাব উপশম হয় এবং গোলমাল ও আগোক্রে যাহার বৃদ্ধি হয় (বেল্); মাথার দগ্‌দগিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ডাইন পার্শ্বে অত্যন্ত চাপা বোধ ।

**নাসিকা ।** নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে বজ্রস্রাব (বেল্, হামামেনিস্); ভরল'সদি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে ক্ষতকাবক তরল স্লেয়া নির্গমন (এরাম্, লাইকোপ্, কান্‌সী-বাই) ।

**মুখমণ্ডল ।** মুখমণ্ডল শিউ বা ফিকা; মুখমণ্ডলের ডাইন অংশের পুরাতন আকারের স্নায়ুশূল, নড়াচড়াতে যাহাব বৃদ্ধি হয় ।

**গলারমধ্য ।** আহার বহা গলনালীর ঠিক উপরিভাগের সংকোচন, যাহার দরুণ গিলিবার ব্যাঘাত জন্মে (আলমি, বেল্, হামোস্, ষ্ট্রাইম্); ঘারঘার চোক বা লাল গিলা (বেল্) ।

**পাকস্থলী ।** পাকস্থলীর সংকোচন এবং উহাতে ভারিবোধ ও দগ্‌দগপান (পাল্‌স্); রোগী (স্ত্রীলোক) মনে করে যেন তাহার পেটে এক গাছি রসি কসিয়া বাধিতেছে (নাক্স-বম, প্রাটিনা); প্রচুর পরিমাণে রক্ত বমন; গলার মধ্য এবং মুখে টক জল উঠে, যাহার দরুণ আহার দ্রব্য টক লাগে; পাকস্থলীতে জ্বালা এবং দগ্‌দগপান ।

**মল ।** মল কঠিন এবং কাল; প্রাতঃকালে উদরাময়, মল স্লেয়া এবং পিত্তমিশ্রিত, জলবৎতরল; প্রচুর পরিমাণে রক্ত ভেদ (ক্যাক্স-কার্স্, ক্যাক্কেরিলা, হামামেনিস্); গুহ দ্বারে অত্যন্ত ভারি এবং চাপা বোধ (সিপিয়া); গুহদ্বারে অত্যন্ত বেদনামুক্ত অর্শেব বলী ।

**মূত্রবস্ত্র ।** মূত্রাশয়ের গ্রীবা সংকোচন (ক্রিমেন্টিস্, পিটোল্); মূত্রনালীতে জ্বালা, ঘরঘার দরুণ বাবধাব মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়; কোঁটায় কোঁটায় মূত্র নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রনালীতে জ্বালাভূত (কোনারাম্); মূত্র দাসেন রঙ্গের জ্বাব এবং উহাতে লাগ বাসিব জ্বাব

তলানি পড়ে (লাইকোপ্, সাইলিনি); বক্ত মূত্রত্যাগ (ইপিকাক্, মিলি-ফোলিয়াম্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, সিকেল্) ।

জননেন্দ্রিয় । স্বালোকের জরায়ু এবং ডিম্বকোষে দণ্ডপরিমাণ বেদনা; জরায়ু প্রদেশে সঙ্কোচন; অত্যন্ত কষ্টকর রক্তস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful menstruation) (ক্যান্, কুপ্রাস্, নাক্স-বম্, নিমিনিক্); নিয়মিত সময়ের অসমক পুরো রক্তস্রাব ।

শ্বাসযন্ত্র । আকস্মিক কাশি এবং গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমন; দি'ড়ি ভাঙ্গিয়া উপবেশন করে উঠিবার সময় শ্বাস কষ্ট (একন্, আমন্-কার্, অ্যাস্, ক্যান্ড-ক্যান্ড); শ্বাসরোধ কাল এবং তদ্রূপ গলা দিয়া আটাল শ্লেষ্মা নির্গমন, বৃকের মধ্যে শ্লেষ্মা অত্যন্ত পড়্‌বড়ী (আর্টি-টাট্, ইপিকাক্); বোকা বিড়ানাম স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসন করিয়া থাকিতে পারেনা; বাধিয়া রাখিলে বক্রপন্ন হয়, বৃকে যেকোন আটী বোধ, বাহ্যিক দরুন শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে (অ্যাস্, ফম্); শ্বাসকষ্ট, বাহ্যিক দরুন মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধ হইয়া রোগী ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয়, মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ষ হয় এবং নাকী লুপ্ত হয় (পিরেট্-অ্যাল্‌ব্); শ্বাসকষ্ট: সঙ্কচিত হইলে বা ষাটিয়া ধরিলে ক্ষেপণ হয়, বৃকে ক্রমাগত যেকোন ব্যতনা (গ্যাস্, লিলিয়াম্ টাইগ্রি, ফম্), বাহ্যিক দরুন মনে হয় যেন বৃক একখানি লৌহের পাত দিয়া কসিয়া বাধা রহিয়াছে; বৃকে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, বাহ্যিক দরুন শ্বাসন করিয়া থাকার ব্যাঘাত জন্মে; হৃৎস্পন্দন এবং হৃৎপিণ্ডে ষাটিয়া ধরার স্থায় অন্তত্ব হয়; বক্ষাধিক্য মধ্যভাগে অত্যন্ত ষাটিয়া ধরার স্থায় অন্তত্ব হয়, বাহ্যিক দরুন মনে হয় যেন বৃক কোন একটা দৌহ নির্মিত চাপা দেওয়ার যন্ত্র দিয়া চাপা দেওয়া হইয়াছে, বাহ্যিক দরুন শ্বাসকষ্ট হয় এবং নড়াচড়াতে শ্বাস কষ্টাদির বৃদ্ধি হয় ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাকী । হৃৎপিণ্ডে আটাবোধ, বাহ্যিক দরুন মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ড এক খানি লৌহের পাত দ্বারা কসিয়া বাধা রহিয়াছে এবং বাহ্যিক দরুন হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দনের ব্যাঘাত জন্মে (আর্বিকা); হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত প্রথর বেদনা এবং সূচী বঁগানের স্থায় অন্তত্ব হয় (একন্, আর্বিকা, ব্রাই, ক্যালী-কার্, নেট্রাম্-মউর); হৃৎস্পন্দন (একন্, অ্যাস্,

স্পাইকেল, সাল্ফ), দিবা রাত্রি স্থঃস্পন্দন, চলিয়া বেড়াইলে, রাত্রিতে এবং বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে ঘাণার বৃদ্ধি হয়; হৃৎপিণ্ডের উর্দ্ধাংশে (Apex) বেদনা যাহা সরিয়া যাইয়া বাম হাতের অঙ্গুলার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; নাড়ী দ্রুত; শ্বাসকষ্ট; হৃৎপিণ্ডের মধ্যপ্রদেশে মড়মড় শব্দ হয় (Endocardial Murmurs); হৃৎপিণ্ডের বেগের অত্যন্ত আধিক্য; হৃৎ অগ্র প্রদেশে চপ্ চপ্ শব্দের (Precordial dullness) অতিবিক্ত বৃদ্ধি; বেষ্ট্রিকেলের (Ventricle) অত্যন্ত বিবৃদ্ধি; হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত দপ্পদপানি, যাহার দরুন হৃৎপিণ্ড কখন কখন অত্যন্ত ঘনঘন দপ্পদপ্ করে, কখন কখন বিলম্বে বিলম্বে দপ্পদপ্ করে।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। হাতের শোথ এবং ক্ষীতি, বাম হাতেই যাহা অধিক হয়; পায়ের পাতায় শোথ যাহা ইটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (এপিস্)।

নিদ্রা। শরীরেব নানা ভানে দপ্পদপানির দরুন ঘুম হয় না; রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিলে প্রলাপ (ব্রাউ); নিদ্রাশূন্যতা, যাহাব কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

জ্বর। পৃষ্ঠদেশে শীতবোধ এবং হাত বরফের জায় শীতল; ঐকান্তিক আকারের সঘিরাম বা পালাজ্বর, অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন যাহা এক সময়ে অটীসে (সুনা); পূর্ব্বাহ্ন ১০ টার সময় মানান্ত শীত বোধ এবং দাঁত দাঁত খট্ খট্, খট্ খট্ শব্দ করা; শরীর অত্যন্ত উষ্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রস্থান ঘন ঘন; পালাজ্বর যাহাতে শীত প্রতিদিন এক সময়ে (অপরাহ্ন ১ টার সময়) আনন্ত হইয়া তৎপর শরীর অত্যন্ত উষ্ণ হয়, শ্বাসকষ্ট এবং করাস্থ প্রদেশে দপ্পদপানি বেদনা হয়, ঘর্ম্ম হয় না এবং অত্যন্ত পিপাসা বর্জনান থাকে।

ব্যবহার। হৃৎপিণ্ডের তরুণ এবং পুরাতন আকারেব অমুখ; তরুণ এবং পুরাতন বায়ুনল প্রদাহ, ফুফুস প্রদাহ (Pneumonia); ফুফুসাবরক বিষী প্রদাহ (Pleurisy); রক্তাংকাশ; বৃকে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; যকৃত প্রদাহ; ঐকান্তিক সঘিরাম বা পালাজ্বর; কষ্টকর রজঃ-স্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful menstruation); তরুণ কর্ণ প্রদাহ

(Acute otitis); রক্ত বমন; পাকস্থলী এবং অন্ত্র প্রদাহ; (Gastritis and Enteritis); রক্ত মূত্রত্যাগ (Hæmaturia); হৃৎস্পন্দন; হৃদাহারক কিল্লীর তরুণ প্রদাহ (Acute Pericarditis); হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি জনিত অমুখ; হৃৎ কপাটের অমুখ জনিত বাতনা; হৃৎস্নায়ুশূল বা হৃৎবেদনা (Angina Pectoris) ইত্যাদি অমুখে ক্যাক্টাস্‌ ব্যবহার্য্য। আভ্যন্তরিক ধমনির প্রদাহ এবং বিস্তৃতিতেও (Aneurism) ক্যাক্টাস্‌ বিশেষ উপকারী বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক বলেন। ডাক্তার লিপে (Dr. Lippe) বলেন যে অতিরিক্ত রক্তজীব জনিত শিরঃ পীড়াই চিকিৎসায় ক্যাক্টাস্‌ ব্যবহারে তিনি বিশেষ ফল পাষ্টয়াছেন। মোনি দ্যবের আক্ষেপ এবং বক্ষ ও উদর কৌণ্টেরের মধ্যবর্তী গোল পেশীর (Diaphragm) বাত বোগে ক্যাক্টাস্‌ ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। শরীরের স্থানে স্থানে আঁটাবোধ, বিশেষতঃ হৃৎপ্রদেশে, বাহ্যিক দর্শন মনে হয় যেন আক্রান্ত স্থান একখানি লৌহ নির্মিত হাত বা পাত দ্বারা কসিয়া বাঁধা রহিয়াছে। পূর্বাঙ্কে (উদরাময়), রাত্রিতে (হৃৎস্পন্দন, মাথা ধরা), বান পার্শ্বে শয়ন করিলে (হৃৎস্পন্দন), আহাবের পর (পাকস্থলীতে ভারি বোধ) অমুখের চুক্তি ইত্যাদি ক্যাক্টাসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। আক্রান্ত স্থান একখানি লৌহনির্মিত হাত বা পাত দিয়া কসিয়া বাঁধা থাকার জায় অল্পভূত হওয়া ক্যাক্টাসের একটা সর্বাপেক্ষা প্রধান বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। ক্যাক্টাসের কার্য্যের সঙ্গে একোনাইটের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। হৃৎপিণ্ডের উপর ইহার কার্য্য নেজার জায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে ক্যাম্ফার, ডিজিটালিস্‌, স্পাইজেলিয়া ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট্‌, ক্যাম্ফার, চায়না ইত্যাদি ক্যাক্টাসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। নেপেল্‌স্‌ নিবাসী ডাক্তার রুবিনী (Dr. Rubini) যিনি ক্যাক্টাস্‌ প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মতে হৃৎপিণ্ডের তরুণ প্রদাহ এবং উহার দাহিত্বক অন্ত্রথে এই ঔষধের মূল

আরেক ব্যবহার্য। দায়বিক অল্পে ৬, ১০ এবং ৩০ ডাইলুশন উপকারী। কৃৎপিণ্ডের তরুণ এবং পুরাতন উভয় প্রকার অল্পেই লেখক ১ম দশমিক ক্রম এক কোটা মাত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। উক্ত প্রকারের অল্পে তিনি ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমও কখন কখন ব্যবহার করিয়া থাকেন। দায়বিক অল্পে কোন কোন চিকিৎসকের মতে ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশন নিম্ন ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকারী। লেখক এই ঔষধের ১০০ বা ২০০ ডাইলুশন কখনও ব্যবহার করেন নাই, অতএব উহার উপকারীতা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না।

### ক্যাল্কেবিয়া ফস্ফরিকা, -ফস্ফেট্ অব্ লাইম্, -ক্যাল্ক-ফস্ (CALCAREA PHOSPHORICA, -PHOSPHATE OF LIME, -CALC-PROB.)

কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত ফস্ফেট্ অব্ লাইম্ ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে সুগন্ধ অর্শ্বিকের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৩য় শততমিক ক্রম পর্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হয়। ৩য় শততমিক ক্রম হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমেব আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রকৃতি। এই পদার্থ সফদ্র প্রাণী শরীরেই উৎপন্ন হয়, শরীরের যে যে অংশে ইহা পাওয়া যায়, তথ্যের অতি, মস্তিষ্ক এবং গ্রন্থিতেই ইহা অধিক থাকে। ইহা উক্ত অংশের পরিপাক্য কার্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া উহার ক্ষয় বা বিনাশ সংঘটন করে। গ্রন্থি এবং পাত্তি ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। শিশু বা ছোট বালক নাটকানন্দ অত্যন্ত চিড়্ চিড়্ এবং খিট্ খিট্ করে (ক্যান্ দিনা); সমুদয় বিষয় ভুলিয়া যাওয়া; কোন প্রকারের মানসিক পরিশ্রম বা চিন্তাতে অশক্তি।

মস্তক। মাথার উপরিভাগ দিয়া যেন কোন শ্রাণী হায়া দিয়া বাই-তেছে একরূপ অগ্রভূত হয়, বাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথার পশ্চাৎভাগে স্বল্প লাগিয়া বসিয়াছে (বিব্রেট্ট অগ্ন্ ; মাথা গরম, চুলের গোড়ায় যেন



চিড়িক মারে; মাথার হাড়ের জোড় বন্ধ হইতে গৌণ হওয়া বা জোড় এক  
কয় বন্ধ হইয়া, পুনরায় খুলিয়া যাওয়া (Open fontanelles) (ক্যাক্-  
কার্ক); মাথার হাড় কোমল এবং পাতলা; কাগজ চাপিলে ঘেঁসেপ হয়,  
মাথা চাপিলেও স্বেচ্ছাপ শব্দ হয়, যাহা মাথার পশ্চাৎ ভাগেই অধিক হয়।

চক্ষু । আলোক, প্রধানতঃ মোমবাতি বা গ্যাসের আলোক চক্ষে  
নয় হয় না বা চক্ষে লাগে।

কর্ণ । কানে গান করা বা অন্তঃশব্দ রকমের শব্দ হয় (ক্যাক্-কার্ক);  
কানের মধ্য এবং বহির্দেশে ক্ষীত, লালবর্ণ, ক্ষতযুক্ত, চুলকানি বিশিষ্ট এবং  
উষ্ণ; কান দিয়া ক্ষতকারক নিঃসরণ।

নাসিকা । সন্ধি; শীতল ঘরে নাক দিয়া প্রচুর তরল স্লেয়া নির্গমন  
(পাল্‌স); উষ্ণ বাতাসে এবং বহির্বায়ুতে নাক দিয়া স্লেয়া নির্গমন এক হয়;  
অপরাক্ষ নাক দিয়া রক্ত পড়া; বড় খাড়া রকমের নাসা বা নাকড়া।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলে বেদনা, উপরের মাড়ির হাড়েই বাহা অধিক  
অনুভূত হয় এবং যাহা ডাইন হইতে বাম দিকে বিস্তৃত হয়; উপরের ওষ্ঠ  
ক্ষীত (বেল, ক্যাক্-কার্ক, সোরিনাম), কঠিন, বেদনা এবং জ্বালাযুক্ত।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । শিশুগণের দাঁত উঠিতে গৌণ  
হওয়া (ক্যাক্-কার্ক) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর জীর্ণ শীর্ণ হওয়া; জিহ্বার  
অগ্রভাগ ক্ষত এবং জ্বালাযুক্ত (ক্যাক্-কার্ক, কার্কো-আনিমেল, কনোস্,  
ক্যালী-কার্ক) এবং উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোকার স্তায় ফুসুড়ী; প্রাতঃকালে  
মুখে তিক্ত স্বাদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরা (ব্রাই, নাক্স-বম্, কার্কো-  
আনিমেল, পাল্‌স, সাল্‌ফ্‌)। গলার মধ্যে টাটানি এবং কনুকনানি,  
গিলিবার সময় যাহা অধিক অনুভূত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর । অপরাক্ষ বটার সময় অস্বাভাবিক  
ক্ষুধা; শিশু সমস্ত দিন স্তন হৃৎ পান করিতে চাহে; প্রত্যেকবার খাওয়ার  
সময়ই পেটে বেদনা বা যাতনার উদ্রেক হয়; মধ্যাহ্নে বাহারের পর বুক  
জ্বালা এবং পাকস্থলীর অন্তঃপ্রকারের অস্বাভাবিক (কার্কো-আনিমেল); উহার  
উঠার পর উদরোৰ্ক প্রদেশে জ্বালাহুতব; উদরোৰ্ক প্রদেশে পালি খালিবোধ  
(ইম্পেন্স); গলার খেকুর দিয়া স্লেয়া তুলিবার সময় বমন; পাকস্থলীতে জ্বালা

এবং মুখে জল উঠা ; পাকস্থলী যেন বিস্তৃত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় । নাভির চতুর্দিকস্থিত স্থানে বেদনা বা যাতনা এবং টাটানি বা কনকনানি, গুহ দ্বার দিয়া হর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণে যাহার উপশম হয় ; উদরে জ্বালা-  
হুত্ব (একন্, আস্. ক্যাস্) ; উদরে কঠিনবৎ, চিন্চিনে বা প্রবল শূল  
বেদনার স্তায় বেদনা এবং তৎপর উদরাময় ।

মল এবং মলদ্বার । অত্যন্ত হর্গন্ধযুক্ত উদরাময় (আস্) ; রসাল  
ফলাদি খাইলেই উদরাময় ; গুহদ্বার দিয়া প্রচুর হর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু  
নিঃসরণ ; গুহ দ্বারে টাটানি বা চড়্‌চড়ানি যাহা গুহ দ্বারের বাহির্দিকেই  
অধিক অনুভূত হয় এবং উহা বসন্তে সস্রং গুহ দ্বারে স্রুতী বিশ্রান্তের স্তায়,  
জ্বালাযুক্ত এবং দপ্পদপিয়া বেদনা বা যাতনা ; গুহ দ্বারে চুলকানি (সাল্. ফ্) ;  
গুহ দ্বারে নালী বা যাহা শুকাইলে বৃকে নানা প্রকারের অসুখ প্রকাশ পায়  
(পর্যায়ক্রমে গুহদ্বারে নালী বা এবং বৃকের অসুখ) ।

মূত্রযন্ত্র । কোন ভারি দ্রব্য উঠাইবার সময় বা নাক ঝাড়িবার সময়  
মূত্রকোষ প্রদেশে প্রবল বেদনা ; অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ এবং তদ্রূপ  
অত্যন্ত দুর্বলতা ।

জননেন্দ্রিয় । গাড়ীতে চাপিয়া বেড়াইবার সময় পুরুষাঙ্গ পাড়া  
হয়, কিন্তু তদ্রূপ স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা হয় না ; গুহ দ্বার এবং অণ্ডকোষাধারের  
মধ্যবর্তী স্থান (Perineum) হইতে পুরুষাঙ্গ পর্য্যন্ত আগাগোড়া বেদনাযুক্ত  
তব ; অণ্ডকোষের স্ফীতি ; অণ্ডকোষাধারে (পোতাঘ) ক্ষত এবং উহা হইতে  
কল্‌তানি পড়া । স্ত্রীলোকের জবাযু প্রদেশে দুর্বল বোধ এবং কষ্টানুভব,  
মল মূত্রত্যাগের সময়ই যাহা অধিক অনুভূত হয় ; যোনির লোমযুক্ত স্থানে  
উপর দিকে চাপাবোধ ; যোনির সমুদয় অংশই স্ফুটন্ত এবং দপ্পদপানি  
ও তদ্রূপ পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা ; বালিকাগণের নিয়মিত  
সময়ের অনেক পূর্বে উজ্জল লালবর্ণ রক্তস্রাব ; যুবতীগণের নিয়মিত  
সময়ের অনেক পর কাল্‌চে, অথবা প্রথমতঃ উজ্জল লালবর্ণ এবং তৎপর  
কাল্‌চে রক্তস্রাব ; ত্বনের দুগ্ধ লোন্‌তা হওয়ার দরুন শিশু পান করিতে  
চাহে না ; ডিমের লালের স্তায় খেত প্রদর নিঃসরণ (আমন্‌-বিউর,  
বোরাস্), তন স্রবনে অত্যন্ত টাটানি (ব্রাই) ।

**শ্বাসযন্ত্র ।** শ্বস্ভক (একন, হিপ-সাল্‌ফ, কস), বাহা দুরীভূত করার জন্য রোগী ব্যৱহার গলার খেঁকুব দেয় ; অনিচ্ছাপূর্বক দীর্ঘ নিশ্বাস ভাগ (ইগ্নেস্‌, সিকেল্‌) ; শ্বাস প্রাশ্বাস ঘন ঘন এবং কষ্টকর ; কষ্টে মীত উত্তিবার সময় কাশি ; স্ক্কাইহিতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত বুকেব সঙ্কোচন এবং শ্বাস কষ্ট, শ্বয়ন করিলে বাহার উপশম হয় এবং উত্তিয়া বসিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ।

**গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ ।** ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান ব্যৱনা এবং উগতে বাতের বেদনার জ্বার বেদনা বা যাতনা (রাস্‌-টঙ্গ) ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় চিম্বাবোধ ; সামান্ত বাতাস লাগিলেই ঐ রকম হয় ; ঘাড়ে খিল ধরার জ্বার বেদনা বাহা প্রথমতঃ এক পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া অপর পার্শ্বে বিস্তৃত হয় ; পৃষ্ঠদেশ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে কনকনানি বা বেদনা (সিমিসিফ, পাল্‌স্‌) ; ভাজিলে বেক্রপ হয়, কুঁচকির শক্তির পশ্চাৎ এবং নিম্নভাগে সেক্রপ বেদনা বা যাতনা ।

**অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি ।** বৃষ্টিতে ভিজিয়া পাছা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমুদয় অংশে বেদনা বাহা আক্রান্ত অঙ্গে যেন সর্সদা চলিয়া বেড়ার (রাস্‌টঙ্গ) ; সমুদয় অঙ্গে কনকনানি এবং উহাতে শ্রান্তিবোধ । ফর্ক এবং বাহুতে বাতের বেদনা ; ক্ষত হইলে বেক্রপ হয়, হাতের নথের চতুর্দিকে সেক্রপ বেদনা, ডাইন হাতেই বাহা অধিক হয় । হাত পা নিম্নাঙ্গ অসাড়, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতা, উদ্বেগ, বাহার দরুণ রোগী আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু অঙ্গ সঞ্চালন করার পর ক্রান্তিবোধ, দুর্বলতা, অস্থিরতা এবং উহাতে হুড়্‌হুড়্‌ এবং কুট্‌ কুট্‌ করা ; হাঁটুর উপরিভাগে বেদনা ; চলিবার সময় পায়ের ডিমে খিল ধরার জ্বার বেদনা বা যাতনা (একন, ক্যাক্‌-কার্ক, নাক্স-নয়) ।

**নিদ্রা ।** অনবরত হাইতোলা এবং সমস্ত দিন ঘুমের অনিবার্য্য ইচ্ছা বা ঝিমান (নাক্স-মক্‌) ; প্রাতঃকালে সহজে ঘুম ভাঙ্গে না ।

**জ্বর ।** শীতবোধ এবং শরীরের স্থানে স্থানে হামা দেওয়ার জ্বার অল্পকৃত হয় ; রাত্রিতে শরীরের কোন কোন অংশে প্রচুর ঘর্ম্ম ।

**ব্যবহার ।** যে সকল অল্পে ক্যালেকেরিয়া কার্কেনিকা ব্যবহৃত

হইয়া থাকে, ক্যাল্কেরিয়া কক্ষরিকাও প্রায় সে সকল অস্থবৈ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; গণ্ডমালা দ্বাৰা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অস্থি এবং গ্রন্থির অস্থ্য ; অভ্যন্তরিক বস্তুর স্কেটিক রোগ (Tuberculosis) এবং অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশ হেতু রোগ (Rachitis) ; হাড় ভাঙ্গিলে উহা পুনরায় জোড়া না লাগা ; মস্তিষ্কের পুৰাতন গোধ (Chronic Hydrocephalus) ; স্নুলের বালিকাগণের মাথা ধরা ; শিশুগণের কণ্ঠে দাঁত উঠা ; বাতরোগ ; অস্ত্রীর্ণ রোগ ; শ্বেতপ্রদর ; ঘৰ্শকাশ ; মেরুদণ্ড দুই ভাগ হওয়া (Spina bifida) ; ফোড়া ; মেরুদণ্ডের বক্রতা (Spinal Curvature) ; বৃদ্ধবয়সে মাথা ঘোরা ; অস্থ্যকরের প্রথমাবস্থা (Incipient Tabes Mesenterica) ; উরুর সন্ধির অস্থ্য ; শরীরে গণ্ডমালা জনিত ক্ষত ; সোয়াস ফোড়া (Psoas abscess) ; টনুসিলের পুৰাতন বিবৃদ্ধি ; মানসিক শক্তির তেজের হ্রাস বা বিনাশ ; ঘৰ্শকাশ (Phthisis) বা অস্থ্যকর (Tabes mesenterica) জনিত শিরামর বা পেটের অস্থ্য ; স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর অত্যন্ত দুৰ্বলতা ইত্যাদি অস্থ্যে ক্যাল্কেরিয়া কক্ষরিকা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । উপরের ঘরে দাঁড়ি জাঙ্গিয়া উঠিতে অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ ; সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই (স্ত্রীলোকের) অস্থ্যের বৃদ্ধি ; শিশু, বালক, বালিকাগণের জ্ঞান শীর্ণ হওয়া ; তলুতলে কৌচকান চৰ্ম্ম বিশিষ্ট, শীর্ণ বালক বালিকাগণের অস্থ্য ; হাত পা শুটানের সময় পেশীর অগ্রভাগে টাটানি ; বালিকাগণের যৌবনাবস্থা বাউহার নিকটবর্তী সময়ের অস্থ্য ; শিশুগণের দাঁত উঠার সময় অস্থ্য ; বৃদ্ধ বয়সের অস্থ্য । প্রাণতঃকালে, লঙ্কার সময়, নড়াচড়াতে, মোম বাতি বা গ্যাসের আলোকে, ঠাণ্ডা লাগিলে, আহারের পর, বসন্ত ফল থাইলে, বায়ুর পরিবর্তনে অথবা বৃষ্টিতে ভিজিলে অস্থ্যের বৃদ্ধি এবং শয়ন করিয়া থাকিলে অস্থ্যের উপশম ইত্যাদি ক্যাল্কেরিয়া কক্ষরিকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ব্যারাইটা কার্ব, ক্যাল্কেরিয়া কার্বো-নিকা, ক্লোরোয়িক্ আক্সিড্, আয়োডিড্, ফ্লুরাস্, সাইজিসিয়া, বার্কেরিস্, নাইট্রিক্ আক্সিড্, কটা এবং সাগ্ফারের কার্বোয় সবে ক্যাল্কেরিয়া কক্ষরিকার কার্যের মাদুত আছে ।

ডাইলুশন বিচার। অহির অল্পে ১ম, ২য়, ৩য় দশমিক ক্রমের শুঁড়া উপকারী। বন্ধাকালেও উক্ত তিন ক্রমের শুঁড়া উপকারী। বন্ধাকালে বা অহির অসম্পূর্ণ বিকাশ জনিত অল্পে অনেক চিকিৎসক আদত কফেট্ অব লাইন্ (Phosphate of lime) ২৩ গ্রেইন মাত্রার ব্যবহার করিয়া থাকেন। অত্যন্ত অল্পে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমের আরোক ব্যবহার্য। ১২ একক ৩০ ডাইলুশনও কোন কোন চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

## ক্যাম্ফোরা, - ক্যাম্ফার, - (কপূর), - ক্যাম্ফ

(CAMPHORA, - CAMPHOR, - CAMPH.)

বর্তন এবং জাপান দেশ হইতে কাচের ছাত্র চক্কে পরিষ্কৃত যে কপূর আইসে উহা বথানিয়মে রেক্টিফাইড্ (৩০ ওয়াশ প্রকৃ) স্পিরিটে (Rectified spirit, - 60° Over proof) মিশাইয়া কপূরের মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্রিটন্ হোমিওপ্যাথিক কর্মাকোপিয়ার নতুনসাবে ওলাউঠার ব্যবহার্য কপূরের মূল আরোক তিন প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। (১) হোমিওপ্যাথির আনিক্তা: মূল নহাওয়া সামুয়ল জানিমানের মতে ১ ভাগ পরিষ্কৃত কপূর ১২ ভাগ রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত করিতে হয়। ডাক্তার কুইনের (Dr. Quin) মতে ১ ভাগ পরিষ্কৃত কপূর ৬ ভাগ রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হয়। ইটালী দেশীয় ডাক্তার রুবীনি (Dr. Rubini's) মতে বহু পরিমাণ পরিষ্কৃত কপূর উহাতে তত পরিমাণ (ওজন করিয়া) রেক্টিফাইড্ স্পিরিট মিশাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত করিতে হয়। এই প্রকার প্রস্তুত করা মূল আরোককেই ডাক্তার রুবীনি ওলাউঠা ক্যাম্ফার (Dr. Rubini's "Saturated Spirits of Camphor") বলে। এই প্রকার কপূরের আরোকই সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লেখক এত দিন রুবীনির ক্যাম্ফারই সর্বদা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ইং ১৮৩০-৩১ সনে আন্তর্জাতীয় মেলায় (International Exhibition of 1883-84) পর কলিকাতার

গুল্লাউঠায় বে এক ভয়ানক আকারের মহামারী উপস্থিত হইরাছিল, সেই মহামারীতে কবিত্তীর ক্যান্সার ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল না পাইয়া, ১ ভাগ পরিষ্কৃত কপূর, ২ ভাগ রেঙ্কাইড্ স্পিরিট্ এই নিয়মে কপূরের আরোহ প্রস্তুত করিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহার করিয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন । সেই অবধি তিনি গুল্লাউঠা রোগের চিকিৎসায় এই প্রকারে প্রস্তুত করা কপূরের আরোকেই সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেফকা মজ্জা লব্ধীয় বায়ু মণ্ডলের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল । উহার গতি এবং জ্ঞান উৎপাদক শক্তি এবং সমুদয় হারবিক মণ্ডলীকে অবসন্ন এবং দুর্বল করার দক্ষণ মাথা ঘোরা, এবং মস্তিষ্কের অবসন্নতা উৎপন্ন হইয়া থাকে । মৈত্রিক কিল্লী উত্তেজিত হইয়া সদি, উদরানয় হয় । পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মৈত্রিক কিল্লী এবং চর্ম্মের শীতলাবস্থা এবং জড়তা উৎপাদন করা কপূরের এক মুখ্য কার্য বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত । মূত্র এবং জননেজ্রিয় আক্রান্ত হইয়া জননেজ্রিয় শীতল এবং শিথিল হয় এবং মূত্র কৃষ্ণতা উৎপন্ন হইয়া থাকে । সম্ভব দেখে কপূরের কার্য অতি শীঘ্র শীঘ্র বা অবিলম্বে প্রকাশ পায় এবং অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় না ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

● মন । মনের অভ্যাস উদ্বেগ এবং অস্থিরতা (একন্, আস্, রাস্-টক); অচেতনতা (আস্, বেল্, ওপিহাম); একাকি থাকিলে ভয়, প্রধা-নতঃ রাজিতে ।

মস্তক । মাথাঘোরা এবং মাথায় ভারিবোধ, মাথা হেঁট করিলেই বাহা অধিক হয় (একন্, বেল্, পাল্, সাল্); মস্তিষ্ক আঁটিয়া ধরিলে বেদন হয়, সেরূপ মাথা ধরা; কপালের হাড়ের উপরিভাগে ঘূর্ণ্-ঘূর্ণে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ; চক্ষুর কর্ণ মধ্যবর্তী লোম শূন্য স্থানে এবং ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে (Cerebellum) একগাছি কিতা দিয়া কসিয়া রাখিলে বেদন হয়, মাথায় সেরূপ সংকোচক বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীর শীতল; ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে দপ্পদপানি (মেনিঙ্গেন্, আই) ।

চক্ষু । চক্ষু স্থির ভাব বিশিষ্ট এবং বিকৃত ও এক দৃষ্টে জাকান (বেল, হায়োস্, ট্রায়ন) এবং চক্ষু বেন উহার কোটরের মধ্যে জ্বিলা রাই ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান বেন অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং চক্চকে হয়।

নাসিকা । শ্বাসের হঠাৎ পরিবর্তনে সর্দিলাগা এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল স্রোতা নির্গমন ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা, নীলবর্ণ এবং ক্রুর বা শুকনো; মুখমণ্ডল শিটা এবং উদেগ বা অত্যন্ত যন্ত্রণার চিহ্নযুক্ত (আর্স, প্রাথম); মুখাকৃতি বিকৃত, নীলের আভাযুক্ত, শীতল (বিরেট্-আল্‌ব)।

মুখগহ্বর । জিহ্বা শীতল (নেজা, বিরেট্-আল্‌ব); স্বর অত্যন্ত মৃদু এবং স্বরভঙ্গ।

পাকস্থলী এবং উদর । সকল আহার দ্রব্যেই অতিরিক্ত স্থান অর্থাৎ আহার দ্রব্য সামান্য মিষ্ট হইলে অধিক নিষ্ট বলিয়া বোধ হয় বা সামান্য টক হইলেও অধিক টক বলিয়া অনুভূত হয় ইত্যাদি; আহার বহা পলনালী এবং পাকস্থলীতে জালা (আর্স, ক্যান্স); পাকস্থলীতে ঠাণ্ডাবোধ (কল্‌চ); পাকস্থলীর মধ্যে চাপিয়া ধরার দ্বারা বেদনা। বকৃতের সম্মুখ অংশের কন্‌কনানি; কুত্র পাঁজরের হাড়ের নীচে সঙ্কোচক বেদনা যাহা কোমরের পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; উদরের উপর এবং নিম্নভাগে ঠাণ্ডাবোধ হইয়া তৎপর উক্ত প্রদেশে ভয়ানক জ্বালা অনুভব।

মল । ঠাণ্ডা লাগিয়া শূলবেদনা এবং উদরাসয় (কলোস্, ডাল্‌ক্); ওলাউঠা, যাহাতে ভেদ বা বমন কিছুই হয় না (“ওক ওলাউঠা”) (আর্স, কুপ্রাম্, বিরেট্-আল্‌ব); গুলের জড়তা বদরুণ কোষ্ঠবন্ধ (আলাম)।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র পরিমাণে স্বাভাবিক অপেক্ষা অত্যন্ত কম; মূত্র-বিরোধ (একন্, হায়োস্, বিরেট্-আল্‌ব); মূত্র কুচ্ছ; জালা উৎপাদক মূত্র ত্যাগ (একন্, এশিস্, আর্স, ক্যান্স)।

জননেদ্রিয় । পুরুষের স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা একবারেই থাকে না; অণুকোষ উপর দিকে আকৃষ্ট হয় (আগ্‌নাশ্, আর্জেট্‌ নাইট্রিক্, কোনা-রাম্, সাল্‌ফ্); ধ্বজভঙ্গ (আগ্‌নাশ্, ফন্‌ আম্)।

শ্বাসযন্ত্র । বায়ুনলের মধ্যে স্রোতার সঞ্চারণ (আন্টি টাট্, ইপি-

কাক) ; খাদ্য প্রাথমিক প্রায়বদ্ধ হইয়া আইসে ; চাপ পড়িলে বেরাপ হয় পাক-  
হইবার মধ্যে সেক্ষণ ফাঁপড় হওয়ার জ্বার স্থান কষ্ট ।

হুংপিণ্ড এবং নাদী ! হুং প্রদেশে অভ্যন্ত ব্যতনা বা আঁটাবোধ  
একন্. আস্), অত্যন্ত ঠাণ্ডাবোধ এবং খুঁয়াইবার অনিবার্য ইচ্ছা ; নাকী  
দত্যন্ত ক্ষুদ্র, তর্জন এবং মূত্র না (একন্. অসে) ।

ব্যবহার । ওনাউট ; সান্দ্র (প্রমাণবহারা) ; মূত্রকক্ক ; আক্ষেপ বা  
বিলম্বনা ; আদর্শিক উত্তেজনা ; মূত্রবোধ ; তিষ্টিরসা ; উগ্র বিষাক্ত উদ্ভিদ  
পদার্থ দ্বারা বিষাক্ত হইলে বাসন্ত । ওনাউঠাতে 'কপূর' ব্যবহার সম্বন্ধে  
চিকিৎসকগণের ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায় । উক্ত মতগুলি লেখক  
প্রণীত হোমিওপ্যাথিক মতে ওনাউঠার চাকৎনা ; ২য় সংস্করণের ১১ পৃষ্ঠায়  
উষ্টব্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । হাত পা ঠাণ্ডা (আস্, কুপ্রাম্, বিরেট-  
আল্.ব) ; পারোবাতনে শিল ধরা (একন্, ক্যাক্স-কার্স, নাইটিক্ আস্,  
নাক্স-এন্. সাইনিস, সান্দ্র) ; অত্যন্ত বলক্ষয় এবং নিস্তেজতা ; হঠাৎ  
অত্যন্ত বলক্ষা (আস্, নিসেক্স) ; সমুদয় শরীর বরফের জ্বার শীতল ; মূত্রী  
এবং হিষ্টিরিয়া রোগের জ্বার আক্ষেপ ; শীতল চট্‌চট্টা এবং অভ্যন্ত দুর্দল-  
কারক ঘর্ম (আস্, তিষ্টিবন্ত) ; শব্দবোধ বাতীক এবং আভ্যন্তরিক অংশে  
শিল ধরা ; গণ্ডনাল, দাতু ; রাসিক, অক্ষমাপে, নড়াচড়াতে, ঠাণ্ডা বা ঠাণ্ডা  
বাতাসে অস্থিরতা বৃদ্ধি এবং বতিবাতাসে অস্থিরতা উপশম ; যন্ত্রণাদির বিষয়  
স্মরণ হইলেই বস্তুনিদ্রা দূরীভূত হয় ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । বস্তুর উপর ক্যান্ফারের কার্য একো-  
নাইট, অসিনিক্ এবং ব্রোমাইন্ অলোবানেব জ্বায় । ব্যক্তক্ষে ইহার  
কার্য ক্যান্ফারিন্ ও ট্রিনিট্রিনা এবং কঙ্ক কখন বেলাডোনার জ্বায় ।  
ককিউলাম্ এবং ওপিথামের কার্যের সঙ্গেও ক্যান্ফারের কার্যের কতক  
সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ওপিথাম্ ক্যান্ফারের প্রতিষেধক ।

ডাইলুশন বিচার । ইহার আদ্যত আরোকই সংশয় বাবদ  
হইয়া থাকে । মূত্রী এবং হিষ্টিরিয়ার আক্রমণে কবিরীর ক্যান্ফার অধিক



উপকারী । অত্যন্ত অল্পবে হানিধান, কুইন এবং লেথকের বতাহুসীরে যে ক্যান্ধার প্রস্তুত হয় তাহাই ব্যবহার্য্য । ওগাউঠাতে লেথকের মতে কুবিণীর ক্যান্ধার অপেক্ষা অত্যন্ত প্রণালীতে প্রস্তুত করা ক্যান্ধার ব্যবহার করা উচিত । কুবিণীর ক্যান্ধারে অনেক সময় পেট কাঁপিয়া উঠে, অত্যন্ত প্রকা-  
রের ক্যান্ধারে পেরুপ হইতে দেখা যায় না । লেথকের মতে শিশুর পক্ষে অর্দ্ধ বা এক ফোঁটা, ছোট বালক বালিকার পক্ষে ২ ফোঁটা, এবং যুবা যুবতীর পক্ষে ৫ ফোঁটার অধিক মাত্রায় কুবিণীর ক্যান্ধার সেবন করণ, অনিষ্টকর :

### ক্যান্থারাইডিস্,—ক্যান্থারিস্,—ক্যান্থ্

(CANTHARIDES,—CANTHARIS,—CANTH.)

ইহা এক মাছি বিশেষ । মরা শুকনা মাছির সমুদয় অংশ একত্রে শুঁড়া করিয়া প্রক্ স্পিরিটে ঝিশাহয়া যথা নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । চর্ম্ম এবং শৈল্পিক কিল্লীর উপরই ইহার কার্য্য অতি প্রবল । \* মুহুঃস্থর সমুদয় অংশের শৈল্পিক কিল্লীর উপরই ইহার কার্য্য সর্ক্যাপেক্ষা প্রবল, বাহার দক্ষণ উক্ক যন্ত্রের প্রবল উত্তেজনা এবং তৎপর বিনাশকারক প্রবল প্রদাহ উপর হইয়া থাকে । পাকস্থলীর শৈল্পিক কিল্লীও প্রদাহযুক্ত হইয়া থাকে । চর্ম্মের উপর ইহা বিনশ্পের জ্বার (Erysipelatous) প্রদাহ এবং ফোঁদার জ্বার ফুঙ্কু ডী উৎপাদন করে । আনো-  
প্যাধিক চিকিৎসকগণ শরীরে ফোঁদা উৎপাদন করার জন্য চর্ম্মের উপর ইহার বাহ্যিক প্রয়োগ করিয়া থাকেন । বারম্বার মুহুঃস্থানের ইচ্ছা, অল্প পরিমাণে মুহুঃ নির্গমন এবং মুহুঃস্থানের সময়, উহার পূর্বে এবং উহার পর, মূত্রনাশীতে প্রবল কঠনবৎ বা আণাবৃক বেদনা ক্যান্থারিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ বোধো পরিগণিত ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অত্যন্ত অস্থিরতা ; উগ্র প্রলাপ ; মনের উত্তেজনা এবং অস্থি-

রতা বাহা প্রকৃত ক্রোধে পরিণত হয়; অনবরত উগ্র বা সম্পূর্ণ পাগলের  
 ভায় প্রলাপ (বেল, হায়োস্, ট্রামন্); বারবার থাকিয়া থাকিয়া বাগের  
 উজ্জেক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাদা এবং কুঙ্করের ডাক ডাকা, কঠিনালী  
 স্পর্শ করিলে বা জল পান করিলেই বাহার উজ্জেক বা পুনরাক্রমণ হয়  
 (বেল); বাচলানী এবং প্রতিবাদ করার স্বভাব (ব্রাই, নাক্স-বম্)।

মস্তক । মাথার পশ্চাৎভাগে স্ট্রট বিধানের ভায় বেদনা বা বাতনা;  
 দৃষ্টিকে জালা এবং টাটানি (একন্, আর্নিকা); মাথার পাশে জালা-বাহা  
 গ্রীবাদেশ হইতে আরম্ভ হয়; কপালের দুই পাশে দন্দপানি (একন্,  
 বেল); মাথায় অধিক পরিমাণে মড়া চাম এবং খুসকি পড়ে (মেজিরিয়াম);  
 আঁচড়াইবার সময় মাথার চুল উঠিয়া বা পড়িয়া যায় (ক্যাক্-কার্ক, গ্রাফ,  
 নেটাম-মিউর, নাইটিক্-আস্, সিপিগা, সাল্-ক্)।

চক্ষু । চক্ষুর আক্ষেপিক সঞ্চালন; চক্ষু আগুনের ভায় উজ্জল এবং  
 স্থিরভাবে বিশিষ্ট (বেল, হায়োস্, ট্রামন্); চক্ষু জালা এবং টাটানি; চক্ষু  
 হরিদ্রাবর্ণ (চায়না, চেলিডন্, পডোক্, আয়োড্, স্লাষাম্) এবং সমুদয় বস্তু  
 যেন হরিদ্রা বর্ণের ভায় দেখায়।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল অত্যন্ত যন্ত্রণার চিহ্নযুক্ত (আস্); বেদনা  
 যন্ত্রণাদি ভোগের সময় এবং উঠার পর মুখমণ্ডল মৃতবৎ (বিরেট্-আল্-ব্)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখগহ্বর, আহার বহা গলনালীর  
 উপরিভাগ, আহারবহা গলনালী এবং পাকস্থনীতে জালাগ্ৰস্তব (আস্,  
 আইরিস্, নাক্স-বম্); মুখগহ্বর এবং আহার বহা গলনালীর উপরিভাগের  
 প্রদাহ (আস্, বেল্); জিহ্বা গাঢ় ফাদযুক্ত (Furred) এবং উহার ধার  
 লালবর্ণ; জিহ্বার নীচের গ্রন্থি স্ফীত এবং লালবর্ণ; জিহ্বা এবং মুখগহ্বরের  
 পশ্চাৎভাগের কতক অংশে ছাল উঠিয়া যায় এবং কতক অংশে কোঁকরা  
 ভায় ফুসুড়ী; মুখগহ্বর শুষ্ক; মুখগহ্বরে জালাযুক্ত বেদনা (একন্, আস্,  
 ক্যাপ্); দাঁত লাগা (Lock-jaw) এবং দাঁত দিয়া কড়মড় শব্দ  
 করা। গলার মধ্যে জালাগ্ৰস্তব (আস্, ক্যাপ্, মাক্-কর), বাহার দমন  
 মনে হয় যেন গলা আগুনের উপর রহিয়াছে; গলার মধ্য প্রদাহযুক্ত এবং  
 গাঢ় স্লেষ্মার ভায় পদার্থ দ্বারা আবৃত; গলার মধ্য স্ফীত (বেল্, মাক্,

কালী-বাই); গলার মধ্যের পশ্চাৎভাগের সঙ্কোচন এবং উহাতে প্রবল বেদনা; টন্সিলের প্রদাহ এবং তদ্রূপ তরল পদার্থ গিলিতে কষ্টানুভব (বেল, হায়োস, ট্রান্ন); মুখগহ্বরে কোষ্কার জ্বর ফুসুড়ী; মুখগহ্বরের পশ্চাৎ ভাগে এবং ডাইন টন্সিলে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বর ক্ষত ।

পাকস্থলী এবং উদর । আহারে অকুচি; অত্যন্ত প্রবল লিপাসী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকারের তরল পদার্থে অকুচি ও গলার মধ্য এবং পাকস্থলীতে জ্বালাযুক্ত বেদনা (আস্, আইরিস, কন্স, মেজিরিয়াম্, বিরেট্-আল্‌ব্); পাকস্থলী প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে জ্বালাযুক্ত বেদনা (আস্, নাক্স-বন্স, কন্স); পাকস্থলী অত্যন্ত টাটায় (ব্রাই, নাক্স-বন্স, মার্ক্); বমন এবং বমনোদ্বেগ (আন্টি-টার্ট, ইপি-কাক্); পাকস্থলী এবং মূত্রাধারে এত বেদনা হয় যে উহাতে সামান্য চাপ দিলেই যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া রোগীর আক্ষেপ হয় । উদরের ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি ও প্রচাপনে উহাতে অত্যন্ত বেদনানুভব (বেল্); গলা হইতে মল দ্বার পর্যন্ত আহার বহা নালীতে আগা গোড়া প্রবল জ্বালাযুক্ত (আস্); উদরে কর্তনবৎ বেদনা (একন্স, আস্); যকৃত প্রদাহ ।

মল এবং মলদ্বার । তরল ভেদের পর শুষ্ক দ্বারে জ্বালাযুক্ত বেদনা (আস্, ব্রাই); শুষ্ক দ্বার এবং অভ্যন্তরীণ মধ্যবর্তি স্থানে বেদনা বা যাতনা, মূত্রাধারের গ্রীবা হইতে বাহ্যিক উৎপত্তি বলিয়া অনুভূত হয়; দান্তের সময় উদরে কর্তনবৎ বেদনা; দান্তের পর শীত এবং কন্স (মার্ক্); রক্তমাশর; অল্প টাচিয়া কেলিলে ঘেরূপ হয়, সাদা, লালচে কাঁচা মাছ মাংস ধোয়া জলের জ্বায়, ছেকড়া ছেকড়া পর্দার জ্বর পদার্থযুক্ত সেকরূপ স্লেয়া ভেদ (কলোস, কল্‌চ); মল রক্ত মিশ্রিত স্লেয়া (মার্ক্); চট্‌চটিয়া, রক্তমিশ্রিত, সাদা বা রক্তমিশ্রিত স্লেয়া (মার্ক্-কন্স); টাট্‌কা রক্ত মলজ্যাগ; সবুজ বা রক্তমিশ্রিত স্লেয়া ভেদ; দান্তের পূর্বে পেটে প্রবল মূল বেদনা; দান্তের সময় শুষ্কদ্বারে জ্বালাযুক্ত; দান্তের পর কষ্টদানক কৌষ্ঠ পাকড়া এবং শুষ্ক দ্বারে জ্বালাযুক্ত, কামড়ানীর জ্বায় বা হল ফুটানের জ্বর প্রবল বেদনা বা যাতনা ।

মূত্রাশয় । মূত্রকোষের প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রকোষে

ছিড়িয়া কেলা, হলফুটান বা আলাবুক বেদনা বা বাতনা (টিরিবিছ) ;  
 মূত্রকোষ হইতে মূত্র নিঃসারক নালী (Ureters) দিয়া মূত্রাধার পর্য্যন্ত  
 আগাগোড়া চাপিয়া ধরার জার বেদনা বা বাতনা; অনবরত মূত্র ত্যাগের  
 ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে একবারে কএক কোঁটার অধিক মূত্র নির্গত হয় না  
 এবং মূত্রের সঙ্গে কখন কখন রক্তও মিশ্রিত থাকে (ক্যানাবিস্-স্যাট্,  
 ক্যান্স, টিরিবিছ); মূত্র ত্যাগের পর মূত্র নালীতে অত্যন্ত আগা এবং  
 কর্তনবৎ বেদনা (ক্যান্স, নাইটিক্-অ্যাস); প্রমেহ রোগ এবং মূত্র নালীতে  
 টাটানি, ক্ষত এবং উহা হইতে রক্ত পড়া; মূত্র নিঃসারক নালী (Ureters)  
 হইতে পুরুষাঙ্গ পর্য্যন্ত কর্তনবৎ বা সঙ্কোচক বেদনা, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ  
 চাপিলে যাতার কতক উপশম হয়; মূত্রকোষ প্রদেশে চাপিয়া ধরার  
 জার ঘৃণা বেদনা; মূত্রাধারে প্রবল বেদনা বা কীতনা এবং উহার  
 সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা ও বারম্বার কোঁথপাড়া; মূত্রাধারে  
 পুলানি (মার্ক্-ত্র); মূত্রাধারের গ্রীবাৎ কর্তনবৎ প্রবল বেদনা, মূত্র-  
 নালীর শেষ পর্য্যন্ত বাগ বিস্তৃত হয়; মূত্রনালী দিয়া রক্তপড়া; মূত্রত্যাগের  
 সময়, উহার পূর্বে এবং পরে মূত্রনালীতে কর্তনবৎ এবং আলাবুক বেদনা  
 (আন্টি টার্ট, ক্যানাবিস্-স্যাট্); বারম্বার মূত্র ত্যাগের চেষ্টা, কিন্তু বেগ  
 দিলে মূত্র নির্গত হয় না এবং মূত্রনালীতে আলাবুকৃত হয় (নাইল্-বন্স);  
 মূত্র একধারে নির্গত না হইয়া বহুধারে নির্গত হয় (ক্যানাবিস্-স্যাট্); মূত্রা-  
 বরোধ এবং তদ্রূপ অত্যন্ত কষ্টানুভব; রক্তমিশ্রিত হইলে বেরূপ হয়, মূত্র  
 সেরূপ লালবর্ণ (একন্, কার্কো-বেজ্); মূত্র কাল্চে (একন্); মূত্র রক্ত  
 মিশ্রিত (অ্যাস্, মিলিকলিয়াম্), ঘোলাটরা, পরিমাণে অল্প (ভিকিট্);  
 রাক্তিতে ভাতের পাতলা ফেনের জায় মূত্র ত্যাগ এবং মূত্রে সাদা শুকানী  
 পড়ে (ক্যাক্-কার্ক, কলচ্)।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষাঙ্গের মাথার অত্যন্ত কষ্টদারক স্থিতি; পুরু-  
 ষাঙ্গ অনবরত খাড়া হয় এবং তদ্রূপ অত্যন্ত কষ্টানুভব (প্রমেহ রোগে) ও  
 জীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা (ফস্); পুরুষাঙ্গ অনবরত ক্রমাগত খাড়া হইয়া  
 থাকে, কিন্তু উহার দরূপ জীসহবাসের ইচ্ছার উল্লেখ হয় না বটে, কিন্তু  
 মূত্রনালীতে আগা গোড়া আলাবুক বেদনা বা বাতনা অনুভূত হয়;

জীৱনহাসের ইচ্ছা এত বৃদ্ধি হয় যে উহার দরুণ রাহিতে যুগের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মে। জীলোকের যোনি অত্যন্ত ক্ষীণ এবং উহাতে উত্তেজনা বা টাটানি (আসফিটিডা); ডিম্বকোষ প্রদাহ এবং তদরূপ ডিম্বকোষে কর্তনবৎ এবং জালাযুক্ত বেদনা; যোনিতে অত্যন্ত চুলকানি এবং তদরূপ পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা; যোনিদ্বারে ভয়ানক চুলকানি (কোনারিস্, মার্ক্); নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং অতিরিক্ত রক্তঃস্রাব (ক্যাক্-কার্ক্, নাক্স-বন্স); অল্প পরিমাণে কাল্‌চের রক্তঃস্রাব (পাল্‌স্)।

খাসযন্ত্র । স্বরভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে খাসবহ্নে অত্যন্ত দুর্বল বোধ; বৃকে হৃদী বিধানের জাঘ বাতনা (ব্রাই, ফন্স্, ক্যালী-কার্ক্), ডাইন পার্বেই বাহা অধিক অমুভূত হয়; ফুফুসাববক কিল্লীর মধ্যে দূষিত জন্মের সন্ধ্যা; খাস কষ্ট; হৃৎস্পন্দন; মূত্র পরিমাণে অল্প এবং মুচ্ছার ভাব।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎস্পন্দন; হৃদযন্ত্রাববক কিল্লী প্রদাহ (Pericarditis) এবং হৃদযন্ত্রাববক কিল্লীতে দূষিত জলীয় পদার্থের সন্ধ্যা; নাড়ী দুর্বল, এবং অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে; মুচ্ছার ভাব।

পৃষ্ঠদেশ । কোমর, মূত্রকোষ এবং উদরে বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র ত্যাগের সময় এত জালা যন্ত্রণাব উদ্বেগ হয় যে উহার দরুণ এক কোঁটা মূত্র ত্যাগ করিতেও বোগী অত্যন্ত কৌণার বা কৌকার এবং চীংকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । শায়ের পাতার তলার কত হওয়ার ভার জালাযন্ত্রণ, ঘাঘার দরুণ এক বাপও চলিতে পারা যায় না; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছিড়িয়া ফেলার ভার বেদনা, হাত ঝাড়া ঘর্ষণে ঘাঘার উপ-শম হয়।

চর্ম্ম । চর্ম্মে বিসর্পের ভার (Erysipelatous) প্রদাহ এবং আক্রান্ত স্থানে ফোকার ভার ফুসুড়ী (বাস্‌টগ্); শরীরের স্থানে স্থানে কত হওয়া বা ছিড়িয়া ফেলার ভার বেদনা; ফোকা পড়ার পূর্বে আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত জালাযন্ত্রণ (পুড়িলে ঘেরুপ হয়)।

বাবহার । মূত্রাধারের তরুণ প্রদাহ (Acute Cystitis); মূত্রকোষের তরুণ প্রদাহ (Nephritis) এবং প্রদাহ সম্বলিত মূত্র কৃচ্ছ; রক্ত মূত্রঃ

(Haematuria) : মূত্র কোষের রাইট্‌স্ ডিক্‌জ্ (Bright's Disease) ; মূত্রাবরোধ ; ওলাউঠা রোগের মূত্রাবরোধে বিশেষ উপকারী ; শুক্রকরণ (Spermatorrhoea) ; প্রমেহ বোগ (তরুণ ও পুরাতন আকারের) ; পুরুষ বা স্ত্রীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা ; ডিম্বকোষ প্রদাহ (Ovaritis) ; ধবজভঙ্গ এবং বক্ষ্যাহ ; পাকস্থলী প্রদাহ ; অগ্ন প্রদাহ ; মল্লুস্ত্রাবেন জায় আক্ষেপ ; বিদর্প ; ক্ষত ; পোড়া ঘা ; হুঠেত্রণ বা পৃষ্ঠাঘাত (Carbuncle) ; পচন বিশিষ্ট ঘা বা গ্যাংগ্রিন্ (Gangrene) ; মাস্তক ঝিল্লী (Serous membranes) প্রদাহ ; হৃদযন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহ ; ফুফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Pleurisy) ; (একো-নাইট্‌ এবং ত্রাইওনিয়াস পর) ; আভ্যন্তরিক অংশের ছাল উঠা এবং ক্ষত হওয়া ও উহার সঙ্গে সঙ্গে পতনাবস্থাব লক্ষণ ইত্যাদি রোগে ক্যান্সারিস্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । জননেত্রির এবং মূত্র যন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল ; শরীরের নানা কোটরে জ্বালানুক বেদনা এবং ক্ষত ও তন্দ্রকণ টাটানি ; ডাইন অংশই অধিক আক্রান্ত হয়, (ব্যাপ্ট্‌, বেল্‌, আইরিস্) ; অত্যন্ত হর্ষতা, নিস্তেজতা এবং অবসন্নতা বা মূর্ছার ভাব ; সমুদয় শরীরেই জ্বালা এবং টাটানি ; আক্ষেপ এবং উদার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র-কৃচ্ছ বা মূত্রাবরোধ এবং জলভয় (Hydrophobia) লক্ষণ ; কাকি খাইলে অম্বুধের বৃদ্ধি এবং শবন করিয়া থাকিলে অম্বুধের উপশমন ইত্যাদি ক্যান্সারি-সের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । মূত্র যন্ত্রের উপর ক্যান্সারিসের কার্য্য ট্রিবিছিনার জায় । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্য অগ্নিনিক্‌, মার্কিউরিয়াম্‌ কেরোসাইবাস্‌, সিলা, সাবাইনা, ক্যালী-বাইক্রনিকাম্‌, এপিস্‌, ক্যান্ফার, ক্যানাবিস্‌ সাটাটোবা, কোপেইবা, একোনাইট্‌, বেলাডোনা, ক্যান্সিকাম্‌, ফক্ষরাস্‌ এবং পাল্‌ফাংগের কার্য্যের জায় ।

প্রতিমেধক ঔষধ । একোনাইট্‌, ক্যান্ফাব, লরোসিরেগাস্‌, পাল্‌সেটোলা, ক্যান্সারিসের প্রতিমেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ওয় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনট সচরাচর অধিক ব্যব-  
হৃত হইয়া থাকে । পুরাতন রোগে কোন কোন সময় ৩০ ডাইলুশন দ্বারা  
অপেক্ষাকৃত অধিক ফল পাওয়া যায় । বাহ্য প্রয়োগে মূল আরোক্ত ১ভাগ

৫০ ভাগ জলে মিশাইয়া লোশন (Lotion) প্রস্তুত করিয়া আক্রান্ত স্থানে লাগান যাইতে পারে। ১ ভাগ মূল আবেক ৯৯ ভাগ জলে মিশাইয়া লেখক সচরাচর বাহ্য প্রয়োগে লোশন ব্যবহার করিয়া থাকেন।

## কষ্টিকাম্,—কন্ট্ ।

(CAUSTICUM,—CAUST.)

কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধান্থ হইতে আদত কষ্টিকাম্ বা মূল আরোক জর করিয়া উহার ১ ভাগ ৯ ভাগ বেকটিকাউড্ স্পিরিটে মিশাইয়া ১ম দশমিক ক্রমেণ্ আবেক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকাৰে ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ততোধিক ক্রমেণ্ আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হয় না। যাহা মূল আবেক বলিয়া বিক্রী হইয়া থাকে উহাকে প্রকৃত পক্ষে মূল আরোক বলা যাইতে পারে না।

সাধারণ ক্রিয়া । মেডেলা অব লঙ্গেটা (Medella oblongata) এবং নিউমোগাস্ট্রিক্ নার্ভ্ (Pneumogastric nerve) নিম্ন শাখার উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দ্বারা স্বউৎপাদক যন্ত্রের পক্ষাঘাত এবং কণ্ঠনালী ও বায়ুনলের বোজক শৈল্পিক ক্লম্বী প্রদাহযুক্ত হয়। ইহা মুখ-মণ্ডলের পেশী এবং গ্ৰহস্থানের স্ফোটক যন্ত্রের কার্যের সমাপকারী পেশীর পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। অতএব পক্ষাঘাত এবং কণ্ঠনালী ও বায়ুনলের স্বেদা জনিত বোগেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বেদা জনিত রোগ, স্বরভঙ্গ এবং স্বরশূন্যতা উৎপাদন করা কষ্টিকমেব এক বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । স্বরন শক্তির দুর্বলতা ; সমস্তা নিস্তব্ধতা, ভয় এবং নিরাশী ও উহার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধতা ; সমস্তা চিন্তামুক্ত, অস্থির এবং কোন প্রকার কাজ করিতে অশক্তি ; সমস্তা রাগ করা এবং খিট্ খিট্ করা (ক্যাণ্‌ক্-ফন্স্, কাম্, সিনা) ; সমস্তা বিষয়ে অমনযোগ বা কোন বিষয়েই মন নিবিষ্ট না হওয়া ; কোনও কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না।

মস্তক । মাথা ঘোরা এবং তদ্রূপ সমুদ্রপানে বা পার্শ্বের দিকে টলিয়া পড়ার উপক্রম হওয়া ; রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে মাথা ঘোরা ; বিছানা হইতে একবার উঠিয়া পুনরায় শয়ন করিলে মাথা ঘোরা ; কোন বস্তু দিকে এক দৃষ্টে তাকাইবা থাকিলে মাথানোরা ; মাথার সমুদয় অংশেই খনন করার জায় যাতনা অল্পভূত হয় ; মাথার উপরিভাগে দপ্পদপানি বা স্ফীতি বিধানের জায় বেদনা বা যাতনা ; কপালের ডাইন পার্শ্বের উচ্চ স্থানে চাপিয়া ধরার জায় বেদনা বা যাতনা ; মাথার উপরিভাগের কোন এক নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র স্থানে মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁতলিয়া যাওয়ার জায় বেদনা, স্পর্শ করিলেই যাহা কেবল অল্পভূত হয় ; কপালের দুই পার্শ্বে স্ফীতি বিধানের জায় বেদনা ; মাথার চুলকানি (গ্রাফ, নাইটিউক-আস, ফস, সিপিয়া, সাল্ফ্) ; মাথার হাড়ে কসিবা ধরা (আসেবাম্, ফস) ।

চক্ষু । চক্ষু প্রদাহ এবং তদ্রূপ চক্ষে আলায়ুক্ত এবং হল ফুটানের জায় বেদনা ; চক্ষে শুষ্কভাব এবং চক্ষে আলোক সহ্য হয় না ; বালি প্রবেশ করিলে যেক্রপ হয়, চক্ষে সেক্রপ চাপাবোধ (আস্, ইয়েস্, নেট্রাম্-মিউর, সাল্ফ্) ; চক্ষু, প্রধানতঃ চক্ষুর পাতা চুলকায় (ক্যাক্স-কার্ক, সাল্ফ্) ; চক্ষুর পাতায় ভারিবেদ, যাহার দরুন চক্ষু বুজিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় (কোনায়াম্) বা চক্ষুর উপরে পাতার পক্ষাবাত (জেলস্, প্রাথম, সিপিয়া, জিকাম্) ; চক্ষুর বেবুটাই নামক পেশীর দুর্বলতা ; চক্ষুর নাকের নিকটবর্তী কোণে ছালা এবং চুলকানি (আস্) ; চক্ষুর সম্মুখ পাখার ডানা বাড়ার জায় ধড়্ ফড়্ করা বা আগুণের কণা জায় কণা ভাসে (সাই-ক্রোমন্, ফস, মার্ক্) ; আলোক স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, চক্ষুর সম্মুখে একখানি পাতলা বা সফ কাপড় থাকিলে যেক্রপ হয়, চক্ষে সেক্রপ ব্যাপ্সা দেখা (ব্যারাইটা, ক্রোকাশ, বাস্টুজ্, সাল্ফ্) ; পক্ষ মেঘ বা কুয়াশার মধ্য দিয়া তাকাইলে যেক্রপ হয়, চক্ষে সেক্রপ দেখায় (নাক্স-বম্, ফস, পাগল্) ; নাক বাড়িয়া কক্ষ ফেলিবার সময় কক্ষকালের জন্ত চক্ষে ব্যাপ্সা দেখা ।

কর্ণ । কানে সোঁ সোঁ, বজ্ বজ্ শব্দ হওয়া (বেল্, চায়না) ; কথা বলার সময় এবং চলিবার সময় পায়ে শব্দ কানে প্রতিধ্বনিত হয় (মার্ক্, ফস) । ডাইন কানে গুড়ী বিধানের জায় যাতনা ।



নাসিকা । শুকনা সর্দি এবং তদ্রূপ নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া থাকা (নাস-বন্ধ) ; বারম্বার হাঁচি দেওয়া ; নাকের আগায় ত্রণ ; নাক দিয়া প্রচুর রক্তস্রাব ; নাকে অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া আঁচিল (Warts) ।

মুখমণ্ডল । ডাইন গালে কসিয়া ধরার জ্বার ক্ষণস্থায়ী প্রবল বেদনা, যাহা কানে বিস্তৃত হয় ; মাড়িতে কসিয়া ধরার জ্বার বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ রোগী (স্ট্রীলোক) হা করিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে এবং একটী দাঁত লম্বা হওয়ার জ্বার অনুভূত হওয়ার দরুণ সে চিবাইতে পারে না (মার্ক) ; মুখ মণ্ডলের এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত ; নিম্ন মাড়িতে বাতব বেদনা ; মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ ; মুখমণ্ডলে আগাযুক্ত চুলকানি বিশিষ্ট কুসুড়ী যাহা হইতে কল-তানি পড়িয়া শুকাইয়া থোলা (চুমটী) পড়ে ।

মুখ গহ্বর এবং গলার মধ্য । কোন দ্রব্য চিবাইবার সময় গালে কামড় পড়ে ; দাঁত নড়িয়া লম্বা হয় এবং তদ্রূপ অত্যন্ত বেদনার উদ্বেগ হয় (লাইকোপ্, নাইট্রিক-অ্যাম্), দাঁতের গোড়ায় ছিড়িয়া ফেলা বা ফুটী ঝাঁপানের জ্বার বেদনা (পাল্‌স্) ; মাড়ি অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটার (কার্কো-বেজ্, মার্ক) ; জিহ্বার অগ্রভাগে কষ্টদায়ক ফোঁসার জ্বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুড়ী ; মুখে তৈল বা চর্নির জ্বার বা পচা স্বাদ (কাম্, পাল্‌স্) ; গলা কাপাইয়া অতি কষ্টে অস্পষ্টরূপে কথা বলা (হায়োস্, ট্রায়ন্) ; কথা বলার সহায়কারী যন্ত্রের পক্ষাঘাত হওয়ার দরুণ কথা বলিতে অশক্তি (ডাল্‌ক্, জেল্‌স্, হায়োস্, নেজা, নাস-বন্ধ) । গলার মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় যাহা কাশি দ্বাবাও তোলা যায় না এবং যাহার দরুণ রোগী উহা গিলিয়া ফেলিতে বাধ্য হয় ; গলার মধ্যে শুষ্ক, ছাল উঠিয়া যাওয়া, টাচিয়া ফেলা অথবা ফুড়-ফুড়ীর জ্বার অনুভূত হয় (আমন্-কার্ক্, কার্কো-বেজ্, ফন্, পাল্‌স্) ; নিম্নদিক হইতে উপরের দিকে কোন ঠাণ্ডা পদার্থ ঠেলিয়া উঠিতেছে গলার মধ্যে এরূপ অনুভূত হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । মিষ্ট দ্রব্যে অকচি ; মুখে চর্নির জ্বার স্বাদ ; চুল পোড়াইলে ধেকুপ হয়, পাকস্থলীর মধ্যে সেকুপ অনুভূত হয় ; অত্যন্ত উষ্ণ উল্কার উঠা (লাইকোপ্) ; কাঠ উল্কার বা স্বাদশূন্য উল্কার উঠা ; পাক-স্থলীতে বেদনা, শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার উপশম হয় ; দীর্ঘ নিশ্বাস

প্রাণসের সময় পাকস্থলীর মধ্যে আকড়াইয়া ধরার জ্বা, চিন্তিনে বেদনা ; পাকস্থলীর মধ্যে চাপিয়া ধরার জ্বা বেদনা ; ক্ষীত প্রদেশে স্ত্রীবিধানের জ্বা বেদনা বা যাতনা ; উদরে বেদনা যাহার দরুণ বোণী (স্ত্রীলোক) হাঁটু জুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় (আলোজ্, কলোস্, আইরিস্)। আহার করিলে বা কোমরে কসিয়া কাপড় পরিলে যাহার বুদ্ধি হয় ; শূল-বেদনা এবং উদার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় উষ্ণাত্তব, সমুদয় শরীরে শীত বোধ, শয়ন করিয়া থাকিলে যাতাব উপশম হয় ।

মল এবং মলদ্বার । অশ্রোণ এবং গুহ দ্বাবে বড় কঠিন এবং হলফুটানের জ্বা বা আলস্যক বেদনা বিশিষ্ট কুলী, স্পর্শ করিলে যাহা অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটার, যাহার দরুণ রোগী চলিতে অত্যন্ত অসহ বেদনা বা যাতনা অনুভব করে ; গুহ দ্বাব ফাটা (Fissure in the anus), যাহার দরুণ চলিবার সময় অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয় ; গুহদ্বার দিয়া বারম্বার অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ুনিঃসরণ, গুহে চাপাবোধ, গুহে বাবম্বার হঠাৎ ছুরী বিধানের জ্বা প্রবল বেদনা ; গুহে খাটিয়া ধরা এবং চুলকানি ; গুহ দ্বাবে চুলকানি (ক্যাম্, সাল্ফ্) ; বাবম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না ; দাঁড়াইলে মল অপেক্ষাকৃত ভালরূপে নির্গত হয় ; কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন, তলতলে নেড় এবং চকচকে চর্কিয়া জ্বা স্নেহা দ্বারা আবৃত ; মল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সফ নেড় (ফস্) ; রক্ত মিশ্রিত মলত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহের মধ্যে জ্বালা এবং টাটানি, ভগন্দর (Fistula in ano)।

মূত্রাশ্রয় । মূত্রাধারে অনেককণ মূত্র সংকীর্ণ থাকি বা মূত্রকোষের দরুণ মূত্রাধারের পক্ষাঘাত ; যুরেরদ্বারে অসাড় বা অনিচ্ছা পূর্বক মূত্র ত্যাগ (আস্, কুপ্রাম্) ; কাশিবার সময় অসাড় বা অনিচ্ছা পূর্বক মূত্র নির্গমন (কল্, চ) ; হাঁচি দেওয়া বা নাচ কাড়িয়া কফ ফেলিবার সময় অনিচ্ছা পূর্বক মূত্র নির্গমন (নেট্রাম্, মিউর, পাল্, স্, জিকাম্) ; মূত্রনালীতে জ্বালা (এপিস্, একন্, অ্যান্টি ক্রুড, ক্যাস্) ; মূত্রাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র ত্যাগের বারম্বার চেষ্টা, এবং কখন কখন মাত্র কএক ফোঁটা বা অল্প পরিমাণ মূত্র বহিয়া পড়ে (একন্) ; মূত্র এত অনায়াসে নির্গত হয়, যে মূত্র যে অসাড় নির্গত হইয়াছে তাহা রোগী কিছুই টের পায় না (আজেন্ট্-

নাইট্রিক) : মূত্র কাল্‌চে কটাবর্ণ (ব্রাই), বোলাটিয়া এবং মূত্র কোন পাत्रে ধরিয়া রাখিলে অস্বচ্ছ বা বোলাটিয়ার জায় দেখায় ; দিবা রাত্রি অনন্তরত অসাড়ে মূত্র নির্গমন।

জননেন্দ্রিয়। কোন কঠিন পদার্থ দিয়া প্রবল বেগে চাপিয়া ধরিলে যেরূপ হয়, ডাইন অতিক্রমে সেক্রপ চাপিয়া ধরার জায় বেদনা (একন্, অার্জেন্ট-নাইট্রিক) ; স্রীবহবাসের সময় মূত্রনালী দিয়া ধাতুর সঙ্গে রক্ত পড়ে। স্রীলোকের পুরুষ সহবাসে অত্যন্ত অনিচ্ছা ; নিয়মিত সময়ের অনেক পর এবং প্রচুর পরিমানে রজঃস্রাব ; কেবল দিনের বেলা থানা থানা দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরের পশ্চাৎ ভাগে থেঁতলিয়া যাওয়া বা নোচড়াইয়া পড়ার জায় বেদনা এবং যোনিতে অত্যন্ত চুলকানি ; রাত্রিতে রক্তস্রাব একবাবে বদ্ধ হয় ; বালিকাগণের অতিকষ্টকর প্রথম রজঃস্রাব (পাল্‌স্) ; রজঃস্রাবের সময় তলপেটে কঠিনবৎ প্রবল বেদনা বা যাতনা এবং উদরাময়, রাত্রিতে দুর্গন্ধযুক্ত স্বেতপ্রদর (আম্বা) বাহা রজঃস্রাবের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয় ; শুনের বোঁটা ফাটা এবং ক্ষত-যুক্ত ও উহা দাঁদের জায় ফুসুড়ী দ্বারা পরিবেষ্টিত ; শুনে বধোচিত্ত পরিমাণে দুগ্ধ থাকে না।

শ্বাসযন্ত্র। কঠিনালীস্থ পেশীর জড়তার দরুণ রোগী সজোরে কথা বলিতে পারে না (এরাম্, ফন্) ; স্বরভঙ্গ, প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময়ই বাহা অধিক হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে চাচিয়া ফেলার জায় অহুত হয় (নাস্, বম্) ; অনেক দিন ধরিয়া সজোরে কথা বলিবার অশক্তি (পাল্‌স্) ; বায়ুনের মধ্যে শুষ্কভব ; প্রবল কাশি, কখন কখন শুষ্ক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকেব ডাইন পার্শ্বে বেদনা ; রাত্রি এবং প্রাতঃকালে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকের মধ্যে ঘেন শ্লেষ্মা আঁটিয়া লাগিয়া থাকে ; বৃকে টাটানি, ফড়্‌ফড়ী, থাকিয়া থাকিয়া বাহার উদ্রেক হয় এবং বাহা বায়ুনের মধ্যে আগা গোড়া অহুত হয় ; কাশিবার সময় বায়ুনে বেদনা বা টানানি, বাহার দরুণ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ; গলার মধ্যে হামা দেওয়ার জায় অহুত হওয়ার দরুণ বা মাথা ছেট্‌ করিয়া উপুড় হইলে কাশির উদ্রেক ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কুচ্‌কিতে

বেদনা ও যাতনা ও অসাড়ে মূত্র নির্গমন (আলাম); এক চোক ঠাণ্ডা জল গিলিলেই কাশির উপশম হয়; কাশির উদ্বেকের পূর্বেই খাস প্রখাস ঘন ঘন হয়; কথা বলা বা চলিবার সময় হঠাৎ খাসরোধ হয়; কাশিবার সময় বুকের মধ্যে প্রহার ঘড় ঘড়ি; বুকে আঁটিবোধ, বাহার দরুণ রোগী বারবার দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে বাধ্য হয়; বুকের মধ্যে টাটানি (খালিকা, ব্যারাইটা-কাক্স); বক্ষান্তির নিচ দিয়া আগাগোড়া এক লাইন ধরিয়া আলায়ুক্ত টাটানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশি, স্থিতিভাবে বা শয়ন করিয়া থাকিলে বাহার অধিক উদ্বেক হয়; কেবল রাত্রিতে কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া প্রহ্না উঠে; সন্ধ্যা হইতে রাত্রি চই ক্রমব পৰ্য্যন্ত কাশির বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা জল খাইলে বাহার উপশম হয়; খাস টানিবান সময় বুকে স্থলী বিধানের জায় বেদনা; কংস্পন্দন; কংস্পন্দে স্থলী বিধানের জায় বেদনা।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। ঘাড় এবং চই বক্রাস্থি মধ্যবর্তী স্থানে অত্যন্ত বেদনা, বাহার দরুণ ঘাড়াদি নোয়ান যায় না; খেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে সেরূপ হয়, ঘাড় সেরূপ বেদনা; গলার গলগণ্ডের জায় ক্ষীতি; কোমরের বাম দিকে স্থলী বিধানের জায় বেদনা বা যাতনা; মূত্রকোষ প্রদেশে চাপিয়া ধরা বা খিল ধবার জায় বেদনা বা যাতনা; ওহু ঘাবের উপরিভাগে কসিয়া ধরা, বা খেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার জায় ঘুশ্ ঘুশে বেদনা।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, প, ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাতের জায় চূর্ণলতা এবং উহার কাঁপন; সন্ধার সময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অসহ্য ক্রান্তিবোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমুদয় অংশেই সন্ধি বাতের জায় বেদনা। হাত এবং বাহুতে ছিড়িয়া ফেলার জায় ঘুশ্ ঘুশে বেদনা; বাহুতে অত্যন্ত ভারি এবং চূর্ণল বোধ; ডাইন মণিবন্ধে ছিড়িয়া ফেলার জায় প্রবল বেদনা; হাতের কাঁপনি এবং হাতের আঙ্গুলের সন্ধিতে কসিয়া ধরার জায় বেদনা বা যাতনা। শিশুর সময় হাঁটুর সন্ধিতে কেড় কেড় শব্দ হওয়া; উরু এবং পায়ের সন্ধিতে কেড় কেড় শব্দ হওয়া; খেঁতলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; চলিবার সময় হাঁটুর সন্ধিতে কেড় কেড় শব্দ হওয়া এবং তদরূপ উহা নোয়ানে অশক্তি; প্রত্যঙ্গের পাদে পাদে বেদনা; পাদে বক্রাস্থির মাথার হাড় হাড়

করা, হানাদেওরা, আলায়ুক্ত এবং চাপিরা ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা এবং উহাতে আলায়ুক্ত স্থী বিধানের ন্যায় যাতনা।

চন্দ্র। সমুদয় শরীরে চুলকানি; শিশুর দাঁত উঠার সময় শরীরের স্থানে স্থানের চন্দ্র ফাটিয়া যাইয়া ক্ষত হওয়া; শরীর অত্যন্ত চুলকায়; প্রীবাদেশে কল্‌তানি বিশিষ্ট ফুসুড়ী; নাকের আগায় ব্রণের ন্যায় ফুসুড়ী; গায় ঘা হইলে শুকাইয়া সামান্য আঘাতেই উক্ত স্থানে পুনরায় ঘা হয়।

নিদ্রা। নিদ্রা ভাল হয় না বা ঘুম হইলেও উহা দ্বারা রোগী আপনাকে আপনি সুস্থ মনে কুণে না; বারম্বার হাইতোলা এবং গা ভাঙ্গা; ঘুমেরঘোরে হাত পাখের স্নেনেকবাব সঞ্চালন; অত্যন্ত নিদ্রাবেশ বা স্নিমান বাহা কোন মতেই শিবারণ করা যায় না এবং বাহ্যর দরুণ রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়; ঘুমেরঘোরে চমকিয়া উঠা।

জ্বর। নাড়ী কেবল সক্ষার সময়ই দ্রুতগামী হয়; বাম অংশেই কেবল শীত অনুভূত হয়; বারম্বার পার্শ্বে শীতবোধ; আভ্যন্তরিক শীতবোধ এবং তৎপর ঘর্ম, কিন্তু শরীর উষ্ণ হয় না; বারম্বার দমকা উষ্ণানুভব হইয়া তৎপর শীতবোধ।

ব্যবহার। পেশী এবং সন্ধিবাভেব ন্যায় প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুটীনের সহায়কারী পেশীর সংকোচন এবং সন্ধির সঞ্চালনে অশক্তি; হৃগীরোগ; কোরিয়া (Chorea); আক্ষেপ; পক্ষাঘাত, বাহা মুখ মণ্ডল এবং মূত্রাধারই অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে; নাসুশূল; স্বরভঙ্গ এবং স্বরশূন্যতা; কাশি; ইপানি কাশি ইত্যাদি অনুরূপ কটিকাম্ব ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। দুর্বল, গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ঐস্থির কঠিনতা; স্নেহের ছুঁবাধিতে অত্যন্ত সহ্য-হুত্ব; ঘুমেরঘোরে হৃগীরোগের আক্রমণ (ক্যাক্‌কান্স্‌, কুপ্রাম্‌); স্নাক্রিতে এক মিনিটের জন্তও স্থির ও নিস্তব্ধ ভাবে থাকিবার অশক্তি; যে পার্শ্বে শয়ন করা যায় তাহাতে ঘেঁহুনিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার জ্বায় বেদনা; অস্থি এবং সন্ধিতে ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বায় বেদনা; সন্ধ্যায় শরীরে টক গন্ধযুক্ত ঘর্ম হয় (সাইপিসি); মস্তিষ্কের রক্তপ্রাব বা মস্তিষ্কের কোমলতার দরুণ শরীরের এক অর্দ্ধাংশের পক্ষাঘাত (Hemiplegia);

আক্ষেপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত পায়ের অভ্যন্তর দপ্পনানি ; পায়ের পাতা শুকাইয়া যায় ; সচরাচর প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যার সময় এবং বহির্বা-  
হুতেই অশ্রুধের বৃদ্ধি ইত্যাদি কটিকামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক  
লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। পক্ষাঘাতে কটিকামের কার্য অনেকটা  
জেলসিমিয়ানের জায়। কণ্ঠনালীর উপর ইহার কার্য ব্রোমিন্ এবং  
স্পঞ্জিয়ার জায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আমো-  
নিয়াম্ মিউরিয়টিকাম্, ক্যালকেরিয় কার্বোনিফা, ইগ্নেসিয়া, ল্যাক-  
সিস্, নাক্স, বমিকা, ফক্ষরান্, প্যাগ্‌মেটিনা, রাস্টক্, টোনা, সিপিরা  
এবং সাল্‌ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। আসাকিটিডা, কলোশিছ্, কক্ষিয়া, নায়-  
বমিকা ইত্যাদি কটিকামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। এতদ্দেশে চিকিৎসকগণ ৬ এবং ১২ ডাইলু-  
শনই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাক্তার ব্লাক্ (Dr. Black)  
এই ঔষধের ১ম এবং ২য় দশমিক ডাইলুশন ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।  
ডাক্তার হিউজের (Dr. Hughes) মতে ১ম এবং ২য় দশমিক ডাইলুশনই  
পক্ষাঘাতের পক্ষে বিশেষ উপকারী। পুরাতন আকারের বাত রোগে ১২  
এবং ৩০ ডাইলুশন অধিক উপকারী। পুরাতন আকারের স্বরভঙ্গ এবং  
স্বরশূন্যতাকে ২০০ ডাইলুশন ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। পক্ষাঘাত  
রোগে বাকরোধে এবং গিলিবার অশক্তির প্রতিকারের জন্ত ২০০ ডাইলুশন  
ব্যবহার করিয়া ২টী রোগীর চিকিৎসায় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে।

## চেলিডোনিয়ায় মেজাস্,—চেলিডন্ ।

(CHELIDONIUM MAJUS,—CHELIDON.)

ইউরোপ, আমেরিকা এবং আসিয়ার নগর এবং পল্লির নিকটবর্তী পতিত জনীতে এই গাছ জন্মে । ফুল ফুটার সময় এই গাছ সংগ্রহ করিয়া কাঁচা অবস্থায় ইহার সমুদয় অংশ দিয়া ডাইলুট্ স্পিরিটে ইহার মূল আরোক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে । ব্রিটিশ্ হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ার মতে ইহার শুকনা গাছ দ্বারা যথা নিয়মে সুগার অব্ মিস্কেব সঙ্গে মিশাইয়া ইহার শুঁড়িও প্রস্তুত হইতে পারে ।

**সাধারণ ক্রিয়া ।** যকৃতের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ উক্ত যন্ত্রের রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, প্রদাহ, কামল রোগ এবং যকৃতের প্রবল অস্থিরতার লক্ষণাদি প্রকাশ পায় । চক্ষুসের উপরও ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ উক্তযন্ত্রে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, প্রদাহ এবং উহার যকৃতবৎ কঠিনতার (Hepaticization) লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে । মেরুদণ্ডের দিকের ডাইন বৃদ্ধান্তির নিম্ন কোণের নিম্ন ভাগে অনবরত বেদনা এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**মন ।** মনের অত্যন্ত উদ্বেগ ।

**মস্তক ।** মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের কার্যের বৈলক্ষণ্য (পেডোফ্); মাথার ভারিবোধ যাহা ঐবার ডাইন পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; কপালে চাপাবোধ যাহা চক্ষুর কোটির পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং যাহা চক্ষু সঞ্চালনে অধিক হয় (ব্রাই); মাথার ডাইন পার্শ্বে চাপিয়া ধরার ক্ষয় বেদনা; চক্ষুর উপরিভাগে একগাছি ফিতা বাধিয়া রাখিলে বক্রপ হয়, কপালে লেঙ্গপ কসিয়া ধরার ছায় বেদনা (অ্যাণ্টি-টার্ট্, জেল্‌স্, মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, সাল্‌ফ্); মাথার পশ্চাৎভাগে ভারিবোধ (লাক্); মাথার পশ্চাৎভাগের বামদিকে চাপিয়া বা কসিয়া ধরায় ছায় বেদনা ।

**চক্ষু ।** চক্ষু এক উহাব উপরিভাগে ছিড়িয়া ফেলা বা স্নায়ুশূলের ছায় বেদনা; চক্ষুর খেতাংশ মলিন হরিদ্রাবর্ণ (কাস্, ক্রোটন্, অ্যারোজিন্, স্নায়াম্); চক্ষুর গোলকে কনকনানি, চক্ষু সঞ্চালনে যাহা অধিক অস্থিত

হয় (বাই, সিমিসিফ্); চক্ষে কম দেখা; কোন বস্তুর দিকে তাকহিলে চক্ষু দিয়া জল পড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে কখন কখন কম দেখা।

**কর্ণ।** কান দিয়া যেন বেগে বাতাস বাহির হইতেছে এরূপ অস্থূত হয়; কান যেন বন্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ অস্থূত হয় (কার্বো-বেজ্); কান এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে স্নায়ুশুলের জ্বাশ বেদনা (বেল্, মার্ক্); কানের মধ্যে প্রবল সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া বাহা অনেক দূর হইতে যেন আইসে বলিয়া অস্থূত হয়।

**মুখমণ্ডল।** মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ (অস্কি পিয়াস্, হিপ্-সাল্ফ্, মিরিকা, নেট্রাম-নিউব, সিপিয়া), কপাল, নাক, গাল এবং চক্ষুর স্বেতাংশেই বাহা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; গাল মণিন বা লালিচে হরিদ্রাবর্ণ (ব্যাণ্ট্, জেল্‌স্); ডাইন গালের হাড়ে বেদনা বা বাতনা, বাহার দক্ষণ মনে হয় যেন উহা ফুলিয়াছে; ইয়াস্‌বিব সন্ধিতে ছিড়িয়া ফেলাব জ্বাশ ভয়ানক বেদনা।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে।** অপবাছে ডাইন কান হইতে ডাইন পার্শ্বের মাড়ি পর্য্যন্ত ছিড়িয়া ফেলার জ্বাশ বেদনা; জিহ্বা শুষ্ক, এবং গাঢ়ি হরিদ্রা লেপযুক্ত (চাশনা, আয়োড্, কন্, কমেয়া), সাদা এবং চট্‌চটিয়া অঁঠা, যুগ্ম ত্তিক স্বাদ বিশিষ্ট জ্বালৈব সঞ্চা; খালি মুখে, মুখে ত্তিক স্বাদ (বাই, নাস্-বম, পাল্‌স্, সাগ্‌ফ্)। বড় কোন কঠিন পদার্থ গিলিবার সময় ঘেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেকপ অঁঠা বোধ হইয়া ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়া।

**পাকস্থলী এবং উদর।** উদ্রার উঠা; দমন; পাকস্থলীর মধ্যে সূচী বিধানের জ্বাশ বেদনা বাহা পৃথদেশ পর্য্যন্ত ও বিস্তৃত হয়। যকৃতপ্রদেশে বেদনা বা বাতনা আরম্ভ হইয়া পৃথদেশকিঞ্চ দিয়া পড়ে; যকৃত প্রদেশে সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা বা বাতনা (আস্, বাই, চায়না, কালী-কার্ক্, মার্ক্, নাস্-বম, সিপিয়া); যকৃত প্রদেশে বেদনা; চাপিলে যকৃত প্রদেশে বেদনা অস্থূত হয়; এক গাঢ় রসি দিয়া উদর কসিয়া বাধিয়া রাখিলে ঘেরূপ হয়, নাস্‌প্রদেশের মধ্যে দিয়া ঘেরূপ কসিয়া ধবার জ্বাশ বেদনা প্রাশাম, পডোফ্, টেবেকাম্); উদর কঠিন এবং স্কীত ও বিস্তৃত; অজ্ঞের



মধ্যে কামড়ানি বা কর্তনবৎ বেদনা (ব্রাই, কলোস্) ; উভয় কুঁচকিতে কসিয়া ধরার ভ্রায় বা আক্ষেপিক বেদনা ।

মল এবং মলদ্বার । গুহের মধ্যে জালাযুক্ত এবং কর্তনবৎ বেদনা এবং উহাতে স্ফুঁ স্ফুঁ করা বা চুল্কানি ; গুহ দ্বারের সঙ্কোচন এবং উহাতে চুল্কানি (সাল্ফ) । মল তরল, কাইয়ের ভ্রায়, উজ্জল হরিদ্রাবর্ণ, (এথুজা, বোরাফ্) ; ফিকা ধূসর বর্ণ, চট্চটিয়া, শ্লেয়া ; ভেড়ার মলের ভ্রায় কঠিন মলভাগ ।

মূত্রযন্ত্র । ডাইন মূত্রকোষ এবং যকুতে আক্ষেপিক বেদনা ; মূত্রাধারে টানিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকি প্রদেশে কাঁপনির সহিত আক্ষেপিক বেদনা বা যাতনা ; ঘোলাটিয়া মূত্রভাগের পূর্বে মূত্র নিঃসারক নালীর দিকে প্রবল বেদনা ; মূত্র কাল্চে হরিদ্রাবর্ণ ; মূত্র ভাগের পর মূত্র ঘোলাটিয়া এবং কাল্চে কটা বর্ণের আভাযুক্ত লালবর্ণ হয় (আণ্টি-টার্ট্) ; মূত্র লাগিলে কাপড়ে কাল্চে হরিদ্রা বর্ণের দাগ পড়ে ।

জননেদ্রিয়া । স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পর, অস্ত্রি-রিক্ত পরিমাণে এবং অনেক দিন ধরিয়া রজঃস্রাব (ফেরাম্) ; যোনিদ্বারে জালা যাহা প্রতিদিন ঠিক এক সময়ে অগ্নুভূত হয় ।

শ্বাসযন্ত্র । স্বরভঙ্গ (একন্, কারো বৈজ্, কষ্ট্) ; ঘুম ভাঙিলে, ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানা হইতে উঠিলে কাশি এবং বক্ষাশ্বির নীচে ধূলা রহিয়াছে একপ অগ্নুভূত হয় ; বক্ষাকেশের ভ্রায় সর্দিয়া গলা খুণ্ খুশ কাশি এবং গলা দিয়া প্রচুর শ্লেয়া নির্গমন ; কতকটা আক্ষেপিক আকার বিশিষ্ট কাশি যাহা ক্রমাগত বর্তমান না থাকিয়া, থাকিয়া থাকিয়া রোগীকে আক্রমণ করে (ড্রিসিয়া) ; শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং কষ্টকর উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে আঁটবোধ ; বৃক এবং গৃষ্ঠদেশে বেদনা, বৃকে কষ্টানুভব, যাহার দক্ষণ মনে হয় ঘেন গায়ের কাপড় কসিয়া পরা রহিয়াছে ; বক্ষাশ্বির মধ্যভাগের পশ্চাৎদেশে আক্ষেপিক বা চাপিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা যাহা বায়ুনল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তদ্রূপ বায়ুনলের সঙ্কোচন ; বৃকে স্রুতী বিধানের ভ্রায় যাতনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্ক্) যাহা ডাইন পার্শ্বে অধিক অগ্নুভূত হয় ; ডাইন দিকের পীজরার হাড়ের নীচে স্রুতী বিধানের ভ্রায় বেদনা ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোরান বায় না (রাস্টক্স, লাইকোপ) ; গ্রীবাদেশের ডাইন দিকের পেশী এবং ডাইন স্কন্ধ-প্রদেশে বেদনা ; পৃষ্ঠদেশ এবং হৃই স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা ও তদ-রূপ উক্ত স্থান সঞ্চালনে অশক্তি ; গ্রীবাদেশ হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত কসিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা ; ডাইন স্কন্ধ এবং উহার নিম্নভাগে বেদনা (আবিস্-ক্যান্, পডোফ্) এবং উক্ত প্রদেশে সূচীবিধানের ভ্রায় যাতনা ; ডাইন স্কন্ধে বেদনা ; ডাইন স্কন্ধস্থির নিম্ন কোণে অনবরত বেদনা (ইস্কুলাম্-হিপ্) যাহা বৃক এবং পাকস্থলী পর্য্যন্ত ও বিস্তৃত হইতে পারে ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভাবি এবং অবশবোধ বা ঝোঁড়া হওয়ার ভ্রায় অল্পভূত হয় ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতের ভ্রায় অল্পভূত হয় ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠাণ্ডা ; বাত রোগ, কোন অঙ্গ স্পর্শ করিলেই অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয় ; ঘর্ম্ম হয় ; কিন্তু উহার দরুণ কোনও উপশম অল্পভূত হয় না ; বাতরোগ, নিম্নাঙ্গেই যাহা অধিক অল্পভূত হয়, প্রধানতঃ পায়ের পাতার সন্ধিতে, চলিয়া বেড়াইলে যাহার বৃদ্ধি হয় ।

নিদ্রা । বারম্বার হাইতোলা ; দিনের বেলা নিদ্রাবেশ এবং কিমান্নাঙ্ক-মক্)।

জ্বর । শীত বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ঠাণ্ডা, হাত পায়ের পাতারই যাহা অধিক অল্পভূত হয় ; সন্ধার সময় শয়ন করিলে শরীর অত্যন্ত গরম হয় ; শেব রাত্রি বা প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম (কাক্-কার্ক)।

ব্যবহার । যকৃত প্রদাহ ; কামল রোগ ; পিত্তশিলা (Gall-stones) ; পিত্তাধিক্য ; যকৃতের অযুগ জনিত শোথ ; উদরাময় ; স্নায়ুশূল ; কুক্ষ্ণ-প্রদাহ ; হুপিং কক ; ঠাপানি কাশি ইত্যাদি অনুলে চেলিডোনিয়াম ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । আহারের পব এবং প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিলে অত্যন্ত অলসবোধ এবং হর্দলতা ; শরীরের কোন কোন অংশে পক্ষাঘাতের ভ্রায় অবশবোধ এবং কসিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা ; প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্নে অনুলে বৃদ্ধি ; বায়ুর পরিবর্তনে অনুলে পুনরা-ক্রমণ ; সন্ধার সময় অনুলে উপশম ইত্যাদি চেলিডোনিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ।** চেলিডোনিয়ামের কার্যের সঙ্গে ব্রাই-  
শুনিয়া এবং ফক্ষরাসের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন  
বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে সিমিসিফিউগা, চায়না, জেল্‌নিমিয়াম্, মাকিউ-  
রিয়াম্, নাক্স-বমিকা, পডোফিলাম্ এবং সাল্‌ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

**প্রতিষেধক ঔষধ।** একোনাইট্, ক্যাম্ফার, অম্লোষধ, মল্য বা  
কাকি চেলিডোনিয়ামের প্রতিষেধক মধ্যে পরিগণিত।

**ডাইলুশন বিচার।** যুবা যুবতীর পক্ষে ১ম হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক  
ডাইলুশন এবং শিশু বা ছোট্ট বালক বালিকার পক্ষে ৬ হইতে ১২ ক্রম  
পর্যন্ত বিশেষ উপযোগী। কখন কখন মাতালদিগের যকৃতের অস্থখে মূল  
আরোক ২।১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহারে মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক উপ-  
কার দর্শিতে দেখা যায়। যকৃত সম্বন্ধীয় সকল প্রকারের অস্থখেই মূল  
আরোক ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া লেখক মিশ্র আরোক  
অপেক্ষা অধিক উপকার পাইয়া থাকেন।

## সিনা,—সিনা

(CINA,—CINA)

আসিয়া মাইনার, লিবান্ট্, আফ্রিকা এবং পারস্য দেশে এই গাছ  
জন্মে। ইহার বিচি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ দ্বারা রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে যথা  
নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আল্‌কেলয়েড্‌কে  
( Alkaloid ) সান্টোনাইন্ ( Santonine ) বলে। যথা নিয়মে সুগার অব  
মিক্‌সের সঙ্গে মিশাইয়া সান্টোনাইনের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

**সাধারণ ক্রিয়া।** অস্ত্রের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। ইহা  
অস্ত্র উত্তেজিত করিয়া অস্ত্রের পুরাতন আকারের উত্তেজনা, প্রদাহ এবং  
ক্লমির লক্ষণাদির দ্বায় লক্ষণগুলি উৎপাদন করে। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হও-  
য়ার লক্ষণাদিও প্রকাশ পায়; কিন্তু উহা অস্ত্র আক্রান্ত হইয়া উত্তেজিত  
হওয়ার কেবল গৌণ ফল মাত্র, মুখ্য লক্ষণ নহে। সিনাব কার্য অনেকটা  
সান্টোনাইনের দ্বায় বলিয়া সিনার পক্ষির্বর্তে অনেকে সান্টোনাইন্ ব্যবহার

করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, সিনার কার্য অপেক্ষা সাটোনাইনের কার্য অধিক প্রবল এবং সর্ষদা একতর বিশিষ্ট। সর্ষদা চিড়্‌চিড়্‌ করা সিনার একটী বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ

**মন।** প্রলাপ এবং চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠা; কোলে করিয়া বেড়াইলে বা কেহ তাহাকে ধরিলে রোগী (শিশু) করুণ স্বরে কান্দে; শিশু সর্ষদা কান্দে এবং ক্রমাগত মায়ের স্তনের দুধ না দিলে কোন মতেই তাহার কান্না থামে না; রোগী সর্ষদা চিড়্‌চিড়্‌ কবে (ব্রাই, ক্যাম) এবং কোন মতেই তাহাকে শান্ত করা যায় না; রোগী তুযান বুযান ভাল বাসে না এবং তাহাকে বাহাই দেওয়া বাউক না কেন সে কিছুই লইতে চাহে না (ক্যাম); রোগী কাহাকেও তাহার শরীর স্পর্শ করিতে দেব না (আণ্ট-টার্ট, আণ্ট-জুড)।

**মস্তক।** বহির্বাযুতে চলিয়া বেড়াইলে অবসন্নকারক শিরঃপীড়া যাহা কপালেই অধিক অল্পভূত হইয়া তৎপর মাথার পশ্চাত্তাণে অল্পভূত হয়; কপালের বান পার্শ্বে উচ্চ স্থান হইতে নাকের গোড়া পর্যন্ত কসিয়া ধরে, যাহার দরুণ মাথার গোলমলে বোধ হয়; একটী ভারি বস্ত্র চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মাথার উপরি ভাগের ঠিক মধ্যভাগে সেরূপ চাপিয়া ধরারস্ত্রায় সবিরাম বেদনা; শিশু সর্ষদাই মাথা পার্শ্বে দিকে হেলাইয়া রাখে।

**চক্ষু।** চক্ষু তারা বিস্তৃত (বেল্, হায়োস্, ওপিয়াম্, ষ্ট্রামন্); টেরা চক্ষু (বেল্); একখানি পাতলা কাপড় দ্বারা চক্ষু ঢাকা থাকিলে যেরূপ হয়, কোন বস্তুর পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে সেরূপ কান্না দেখায়, চক্ষু মুছিয়া কেলিলে বাহা সারিয়া যায় (কন্, পাল্‌স্); চক্ষুর কোটরের উপরিভাগ হইতে মস্তিষ্কের গভীরতম অংশে স্থলী বিধানের স্ত্রায় যুগ্মবেদনা বা যাতনা; বিছানা হইতে উঠিলে চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ ভাসে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা কিম কিম করা এবং মুচ্ছার ভাব, বারম্বার এদিকে ওদিকে টলিয়া পড়া, শরন করিলে যাহার উপশম হয় (ডাক্)।

**কর্ণ।** কানের সম্মুখভাগের নিম্ন প্রদেশে স্থলী বিধানের স্ত্রায় যুগ্মবেদনা বা যাতনা; কর্ণশূলে যেরূপ হয়, কানের বহির্দেশে সেরূপ ঝিল ধরা বা চিড়িক মারার স্ত্রায় বেদনা; কানে কম শুনা।

নাসিকা । সর্কদা প্রবল হাঁচি (একন্, জেল্‌স্, সাদুনেরিয়া) ; অনবরত নাক ঝোঁটা এক নাক ঘষা বা আঙ্গুল নাকের মধ্যে খুঁদা রাখা (ফস্-আস্, সেলিন্, এরাম্) ; নাক দিয়া রক্ত পড়া (একন্, বেল্) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা এবং রুগ্ন, শোণের ভায় টল্‌টলে এবং চক্ষু নীল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ; মুখমণ্ডল শিটা, শীতল এবং শীতল বর্ণ দ্বারা আবৃত (ক্যাম্‌ফ্‌র, বিবেরেট্-আস্) ; মুখের চতুর্স্পার্শ্ববর্তী হান সাদা এবং নীলের আভাযুক্ত ; গালের মেলার নামক অস্থিতে (Malar bone) চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, চাপিয়া ধরিলে ঘাটার বৃদ্ধি হয় ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে । দাঁত দ্বারা সর্কদা কড়্‌ মড়্‌ শব্দ করা, প্রধানতঃ রাত্রিতে ঘুমেরবোরে (আস্, দিকুটা, হেলিবোরাস্, পডোক্) ; মুখের মধ্যে শুকাইয়া উঠে ; জিহ্বা সামান্য সাদা লেপযুক্ত এবং উহাতে ক্ষুদ্রীকৃত ন্যায় পদার্থ দৃষ্ট হয় ও উহার পার্শ্ব লালবর্ণ, যাহা চাপিলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় । গলার মধ্যে শুকাইয়া উঠে ; গিলিবার সময় বেক্রপ হয়, গলার মধ্যে সেক্রপ অনবরত সঞ্চালন ; গিলিতে অশক্তি, তরল পদার্থ গিলিবার সময়ই এই অশক্তি অধিক অল্পভূত হয় । (বেল্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । হয় ক্ষুধা একবারেই থাকে না, নতুবা দ্রুত ক্ষুধা ; পেট পুরিয়া খাওয়ার অনতিকাল বিলম্বেই অত্যন্ত ক্ষুধা (মার্ক্, ষ্টাকিস্, লাইকোপ্) ; শিশু মাতৃস্তন দ্রুত পান করিতে চাহে না ; জলাদি পানের পর বমন এবং উদরাময় ; নানাপ্রকারের দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা ; (পিপাসা একন্, আস্, ব্রাই, রাস্টল্) ; ক্রমি, উদরস্থ আহাতি দ্রব্য, স্নেহা এবং পিত্তবমন ; ক্ষুধা লাগিলে বেক্রপ হয়, পাকস্থলীতে সেক্রপ চর্কণবৎ অল্পখ-বোধ (ইগ্‌নেস্) । ক্রমি থাকিলে বেক্রপ হয়, নাভিপ্রদেশে সেক্রপ চিন্‌চিনে বেদনা (স্পাইডেল্) ; নাভিপ্রদেশে মোচড়াইয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা বাতনা (কলোস্) ; আহাতির পর উদরোচ্চ প্রদেশের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত স্থলধরার ন্যায় বা চিন্‌ চিনে বেদনা ; উদর ক্ষীণ, বিস্তৃত এবং কঠিন (শিশুগণের) (আস্, ক্যাকেরিয়া কার্স্, কলোস্) ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্কভাবে চুলকানি বা কুট্‌ কুট্‌ করা (আলান্, আস্, গ্রাফ্, সাল্ফ্) ; জলবন্তরল উদরাময় (একন্, আস্,

চারণা, পডোফ্); কৃমি সঞ্চগিত সাদা জলবন্তরগ ভেদ (চারণা, কস্-আল, রাসটম্) ।

মূত্রযন্ত্র । বারবার মূত্র ত্যাগের চেষ্টা এবং অধিক পরিমাণে মূত্র ত্যাগ (এপিস্); মূত্র ত্যাগের অনতিকাল বিলম্বেই মূত্র খোলাটিয়া হয়; (চেলিডন্, কনোস্); মূত্র ত্যাগের পর মূত্র কলকান পাত্রে হরিয়া রাখিলে মূত্রে সাদা তলানি পড়ে; রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে বা স্বপ্নে অসাড় বা অনি-  
জ্ঞাপূর্বক মূত্র ত্যাগ (অল্পে কৃমি থাকিলেই একপ সচরাচর ঘটনা থাকে) ।

শ্বাসযন্ত্র । ক্ষণস্থায়ী খুশ্ খুশে কাশি দৃ শুক আক্কেসিক কাশি, বাহার আক্রমণের পূর্বে শরীর একবারে শক্ত হয় বা উঠা নোয়ান যায় না এবং জ্ঞান থাকে না; হৃপিংকক, প্রাতঃকালে বাহার আক্রমণ অভ্যস্ত প্রবল হয় এবং গলাদিয়া শ্লেষ্মাদি কিছুই উঠে না; সন্ধার সময় অতি কষ্টে গলা-  
দিয়া শ্লেষ্মাদি উঠে; সন্ধার সময় অতি কষ্টে গলাদিয়া সাদা, এবং কখন কখন রক্তের ছিটযুক্ত শ্লেষ্মা উঠে; প্রাতঃকাল এবং সন্ধার সময় কাশির বৃদ্ধি এবং রাত্রিতে কাশির উপশম; জ্বলাদি পান, বহির্বাযুতে চলিয়া বেড়াইলে এবং কঠনানীতে চাপ পড়িলে কাশির উদ্রেক হয় (ল্যাক্); শ্বাস শ্রোত্র ঘন ঘন এবং শ্বাস শ্রোত্রে বাঁধ বাঁধ বোধ; গলার মধ্যে ধূলা প্রবেশ করিলে ঘেরূপ হয়, প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলে সেরূপ খুশ্ খুশে কাশির উদ্রেক হয়; সন্ধ্যার সময় স্বরভঙ্গাবিশিষ্ট খুশ্ খুশে কাশি; থাকিয়া থাকিয়া হৃপিং কাশির প্রবল আক্রমণ (ডুনিয়া), বায়ুনলের নিম্নভাগে শ্লেষ্মা জমিয়া লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হইয়া যাচার উদ্রেক হয় ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । মেরুদণ্ডের উরুদেশ হইতে নিম্ন দেশ পর্যন্ত আগাগোড়া কসিয়া ধবা বা ছিড়িয়া ফেলার ভ্রায় বেদনা; মেরুদণ্ডের ঠিক মধ্য ভাগে ছিড়িয়া ফেলা বা চিড়িক মারার ভ্রায় বেদনা; অনেককণ দাঁড়াইয়া থাকিলে ঘেরূপ হয়, কোমরে সেরূপ শ্রান্তি জনক বেদনা ।

নিন্দ্রা । ঘুমেরঘোরে বারবার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করা এবং বারবার কানদিয়া ওঠা ও ক্রমাগত করণ স্বরে কান (একন্) ।

জ্বর । শীত কম্প এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল শীতল এবং শিটা ও হাত উষ্ণ; সন্ধার সময়ই শীত অধিক অনুভূত হয়, বাহ্যিক উত্তাপ

প্রয়োগে বাহার কোনও হাস বা উপশম হয় না; মাথা এবং মুখমণ্ডলেই অধিক উষ্ণ অনুভূত হয়; বর্ষা সচরাচর শীতল এবং কপাল, নাসিকার চকুশাখাবর্ত্তী স্থান এবং হাতেই উষ্ণ অধিক হয় (বিবেট্-মার্); জরের আক্রমণের সময় বমল এবং অত্যন্ত ক্ষুধা; কেবল শীতলাবস্থা বা উষ্ণাবস্থাই পিপাসা থাকে; হৃৎপিণ্ডের কম্পমান স্পন্দন; মুখমণ্ডল অত্যন্ত উষ্ণ এবং গাল উজ্জ্বল লালবর্ণ; শীতল জলদি পানের ইচ্ছা (বেল্); প্রতিদিন ঠিক এক নির্দিষ্ট সময়ে জর আইসে (ক্যাক্টাস)।

ব্যবহার । ক্রিমি ক্রিমি জনিত অস্থ; আক্কেপ (Convulsions), বিশেষতঃ ক্রিমি জনিত; কোরিয়া (Chorea); মূগীরোগ, ক্রিমির দরুণ বা অন্য কোন কারণে অঙ্গের উত্তেজনজনিত হইলে, ক্রিমির দরুণ আট্‌কান দরিদ্রাম এবং স্বল্প বিরাম জর (Intermittent and Remittent Fevers), উদরাময়; ছাপংকফ বা কাশি; অসাড় হুতাগ; ক্রিমির দরুণ রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে বা স্বপ্নে বিছানায় প্রস্রাব করা ইত্যাদি অস্থে দিনা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । যে সকল শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের অন্তের মধ্যে ক্রিমি থাকে, তাহাদিগের অন্ত্রে বিশেষ উপকারী। মূগীরোগ, রাত্রিতেই বাহার আক্রমণ অধিক হয় এবং বাহার আক্রমণের সময় রোগী অত্যন্ত চীৎকার করে ও হাত পা প্রবল বেগে বারম্বার দাপাদাপি করে; ঘুমেরঘোরে বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করা; হাত পায়েব স্পন্দন (ক্যাক্-কার্স্, ইয়েন্); হাত পায়েব ঝাকনি এবং উষ্ণ বিকৃত হওয়া (সিকুটা); রাত্রিতে, কোন বস্তুব দিকে এক দৃষ্টে তাকাইরা থাকিলে এবং বাহ্যিক প্রচাপনে অস্থের বৃদ্ধি ইত্যাদি দিনার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মনো পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । দিনার কাঠের সঙ্গে আদিনিক্, বেলা-ডোনা, ক্যাল্‌কেব্রা, ক্যামোমিলা, চারনা, ফেরাম্, ইগ্‌নেসিয়া, ফফ্রাস্, স্পাইজেলিয়া এবং পাল্‌সেটিলাব কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাক্‌ফে, ক্যাপ্‌সিকাম্, চায়না এবং ইপি-কাকিউগ্রা দিনার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর

অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।  
সবিরাম বা স্বল্প বিরাম অবস্থায়, ওলাউঠার পতনাবস্থায় উদরে ক্রমি থাকার  
দরুণ প্রতিক্রিয়া না হওয়া সন্দেহ হইলে ২০০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া  
অনেক সময় আশ্চর্যচরিত্র কল পাওয়া যায় । সাণ্টোনাইনের ১ম দৈনিক  
ক্রমের গুঁড়াই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

### ককিউলাস্ ইণ্ডিকাস্,—বকিউল্ ।

(COCCULUS INDICUS,--(Coc- IND.)

এই গাছের ফল যথা নিয়ম প্রেক্টিকাইড্ স্পিবিটে মিশাইয়া ইহার  
মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । গতি উৎপাদক রাস্য মণ্ডলীর উপর ইহার  
কার্য অতি প্রবল, যাহাব দরুণ ইহা প্রথমতঃ স্বেচ্ছাপূর্বক সঞ্চালনের  
শক্তিবিশিষ্ট পেশী আক্রমণ করিয়া পক্ষাঘাত এবং ধক্টকারের দ্বারা  
আক্ৰেপ এবং তৎপর জ্ঞান উৎপাদক রাস্যমণ্ডল আক্রমণ করিয়া মাথা  
ঘোরা এবং মাথার দিক্‌বদল্য উৎপাদন করিয়া থাকে । স্নায়বিক উত্তে-  
জনার দরুণ বিশেষ প্রকৃতির বমনোদ্বেষ্ট এবং অবসন্নতা, সার্ভিক্সিক বলক্ষয়  
এবং মাথা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে একই হইয়া জল পথে জাহাজ, নৌকাদিতে  
চাপিয়া বেড়ানোর দরুণ অসুখের (Sea-Sickness) দ্বায় লক্ষণাদি প্রকাশ  
পায় । মাথাঘোরা থাকুক বা না থাকুক, চিষ্টিরিয়া বা অজ্ঞাত প্রকারের  
স্নায়বিক অসুখের অনেকানেক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অনবরত জ্বাশ্রয় বিষয় চিন্তা; রোগী (স্ত্রীলোক) আপন  
বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করে না ; গান করিবার অনিবার্য  
ইচ্ছা ; অল্প মনঃকতা, যাহার দরুণ রোগী (স্ত্রীলোক) বাহ্য এইক্ষণ চিন্তা করে  
উহার পরক্ষণই সে উঠা ভুলিয়া যায় ; অত্যন্ত ভয়ানক রকমের হৃদয় করিলে  
বেহুশ হয়, মনের স্বেপন উদ্বোধ (ইগ্‌নেস্) ; রোগী সহজে বিরক্ত হয়,



রাগান্বিত হয় এবং সহজে অবসন্ন বা ক্লান্ত হইয়া পড়ে (ক্যাম্প, নাস্-বম্); সামান্য কারণেই চমকিয়া উঠা (সিপিয়া, সাইলিসি)।

**মস্তক ।** নেনা করিলে ঘেরূপ হয়, সেরূপ মাথা ঘোরা (চারনা, পাল্-স্, লেডাম্, নাস্-মফ্, রাস্টক্স) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে বমনের ইচ্ছা (ব্রাই), যাহার দরুণ রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; মাথায় খালিবোধ; বিছানায় সোজা হইয়া বসিলে বা গাড়ীতে, পাল্কিতে, নোকা বা জাহাজে চাপিয়া বেড়াইলে মাথাঘোরা; মাথায় অবসন্ন এবং গোলমলে বেচুঁ বাহা আহাৰ বা পানের পর সচরাচর বৃদ্ধি হয় (নাস্-বম্); শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনের ইচ্ছা (ইপিডাক্, নাস্-বম্); কাপড় দিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বা কুঁ আঁটিয়া রাখিলে ঘেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ চাপিয়া ধরার দ্বারা বেদনা বা যাতনা (মার্ক্, নাইট্-ক্-আস্); চক্ষু টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলে ঘেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ বেদনাশ্রুত্ব; নিদ্রা, আহাৰ বা পানের পর শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি (ইগ্নেন্স্); গাড়ীতে চাপিয়া বেড়াইলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি (ক্যালী-কার্ক্, শিট্টোল্); বহির্বিষ্মতে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে ও উষ্ণ ঘরে শিরঃপীড়ার উপশম; গ্রীবাদেশস্থ পেশীর দুৰ্বলতার দরুণ মাথার আক্ষেপিক স্পন্দন; শিরঃপীড়া, চীত হইয়া শয়ন করিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং যাহার দরুণ রোগী এক পাশে শয়ন করিতে বাধ্য হয়।

**চক্ষু ।** চক্ষে বাপ্পা দেখা; খেঁত্‌গিয়া গেলে ঘেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রাতিতে চক্ষু মেলিবার অশক্তি; চক্ষু মুদ্রিয়া থাকা, কিন্তু এই অবস্থায়ই চক্ষুর গোলক অনবরত ঘূর্ণন।

**কর্ণ ।** প্রবল বেগে জল চলিলে ঘেরূপ হয়, কানে সেরূপ নোঁ নোঁ শব্দ হয় (ক্যাম্প) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে কম শুনা।

**মুখমণ্ডল ।** মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং গাল লালবর্ণ (ফেরাম্); মুখকৃতি মেটে মেটে এবং অত্যন্ত যাতনায় চিরযুক্ত।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য ।** স্ফাঙ্খির নিম্নস্থিত গ্রন্থির ক্ষীণতা এবং কঠিনতা (ক্যাক্-কার্ক্, অয়েড্, রাস্টক্স); মুখগহ্বর শুষ্ক (নাস্-মফ্); জিহ্বা শুষ্ক এবং সাদাটিয়া লেপযুক্ত, কিন্তু পিপাসা থাকে না (নাস্-

মক্, পাল্‌স্); মুখে ধাতুর স্বাদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা শূন্যতা (ইক্-লাস্, মার্ক্, নেজা)। গলার মধ্যে শুকাহুত্ব; গলার মধ্যের উপরিভাগের নালী বন্ধ হওয়ার স্থায়ী সঙ্কুচিত হওয়ার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মিয়া কান্ধির উদ্বেক হয়।

পাকস্থলী এবং উদর । আহার দ্রব্যে অত্যন্ত অরুচি (মার্টি-ক্রুড্, ইপিফাক্), বিশেষতঃ টক দ্রব্যে, অথচ উহাও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা থাকে ; আহারের সময় অত্যন্ত পিপাসা ; ঠাণ্ডা দ্রব্য পানে ইচ্ছা ; হৃগ্নকণ্ঠ কাঠি উল্কার (আর্বিফা, ক্যাম্, সোরিনাম্); তিক্ত উল্কার উঠা (আর্বিফা, নাক্স-বম্, পাল্‌স্); বারম্বার উদগার উঠিতে চাহে, কিন্তু একবারও উল্কার উঠে না ; বারম্বার অত্যন্ত প্রবল বমনোদ্বেগের দরুণ রোগী মুচ্ছা বাওরার উপক্রম হয় (টেবেকাম্); রেলের গাড়ীতে চাপিয়া বেড়ানোর সময় অত্যন্ত বমনো-দ্বেগ বা বমনের ইচ্ছা (নাক্স-মফ্, পিটোল্), অথবা ঠাণ্ডা লাগিয়া বমনোদ্বেগ বা বমনের ইচ্ছা ; বমনের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল শিরঃপীড়া এবং অস্থির মধ্যে মোচড়াইয়া পড়ার স্থায় বেদনা ; পাকস্থলীতে ভয়ানক খিল ঘরা এবং উহাতে কামড়ানী (নিওডানের স্থায়); ভোতা ছুরি দিয়া কাটার স্থায় বেদনা বা বাতনা ; পাকস্থলীতে যেন একটা কুনি নিভিতেছে এরূপ অনুভূত হয় ; জল-পথে জাহাজাদিতে চলিবার দরুণ বমন বা বমনোদ্বেগ (Sea-Sickness) ; আহারের সময় এবং উহার পর পাকস্থলীতে খিল ঘরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাদকষ্ট (নাক্স-বম্); পাকস্থলীতে খালি খালি বোধ (ইগ্নেস্, পিটোল্, সিলিয়া); উদর অত্যন্ত ফাঁত এবং বিস্তৃত (অলোজ্, সিকুটা, ক্যাম্, চায়নু); উদরে খালিবোধ এবং উহাতে যেন কিছু নাই এরূপ অনুভূত হয় ; উদরোচ্চ প্রদেশের সংকোচন, বাহ্যিক দরুণ নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় ; রাত্রি ছই প্রহরের সময় উদরে দূষিত বায়ু জনিত আক্কেপিক শূল বেদনার স্থায় বেদনা ; শুষ্কতার দিয়া বায়ু নিঃসরণ, কিন্তু উহার দরুণ বহুপানীয় কোনও উপশম হয় না এবং কাশিলে বাতনার বৃদ্ধি হয় ; কুঁচকি সম্বন্ধীয় অল্প বৃদ্ধি হওয়ার উপক্রম হয় (আগাম্, নাক্স-বম্, নাইট্রিক্‌ অ্যাস্)।

মল এবং মলদ্বার । অপরাহ্নে শুষ্ক সংকোচক বেদনা, বাহ্যিক দরুণ বসিয়া থাকিবার ব্যাঘাত জন্মে ; মল কোমল, পাতলা এবং শাদাটিয়া,

হৃদয়বর্ধ, মল্ অত্যন্ত কঠিন এবং অতি কষ্টে নির্গত হয় (আলাম্, ব্রাই, সাল্‌ক্) ।

**জননেন্দ্রিয় ।** স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উনরে খিল ধরা এবং শূল বেদনার ভায় বেদনা ; রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুক খিল ধরা এবং অবসন্নকারক বমনো-  
দেগ ও মুচ্ছার ভাব ; রজঃস্রাবের সময় রোগী এত দুর্বল হইয়া পড়ে যে, উহার দরুন সে দাঁড়াইতে বা কথা বলিতে পারে না (আমন্-কার্ক, কার্কো-  
আনিমেল্) । কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনার (Painful Menstruation) পর প্রায়ই অর্শ রেগণ হয় ; রজঃস্রাবের পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণে ভাতের পাতলা কেণের আঁক ছেকড়া ছেকড়া পদার ভায় পূর্ব সংযুক্ত শ্বেত প্রদর নিঃসরণ (আলাম্, আস্, ক্যাক্স-কার্ক, ক্রিয়াজ্, হাইড্রাট্, পাট্) এবং তদরূপ রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া কথা বলিতে বা দাঁড়াইতে পারে না ; অরায়ুতে কষ্টদায়ক চাপাবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুক খিল ধরা, বমনোদেগ এবং মুচ্ছা ; গর্ভাবস্থায় বোনিদ্বার দিয়া রক্ত মিশ্রিত স্রোয়ার ভায় পদার্থ নিঃসরণ ।

**শ্বাসযন্ত্র ।** বুক আঁটাবোধ হওয়ার দরুন অত্যন্ত ক্লান্তিজনক কাশি ; বকের ডাইন পার্শ্বে কদিয়া ধরার ভায় সঙ্কোচক বেদনা, যাহার দরুন নিশ্বাস বদ্ধ হয় ; বকের মধ্যের সংকোচন ; হিষ্টিরিয়া রোগে বেক্রপ হয়, গলার মধ্যে স্বেদ্রপ সংকোচন বা আঁটাবোধ (আসাকিটিডা) ; বকের মধ্যে জ্বালামুভব যাহা গলার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; বকের মধ্যে খালি বোধ ।

**হৃৎপিণ্ড ।** স্নায়বিক হৃৎস্পন্দন (আসাকিটিডা) ।

**গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ ।** গ্রীবা দেশস্থ পেশীর দুর্বলতার দরুন মাথা সোজা করিয়া রাখিতে পারা যায় না (বিরেট্-আব্) ; সঞ্চালন করিবার সময় ষাড় শক্ত হয় বা উহা নোরান যায় না (চেলিডন্, রাস্ টঙ্ক্) ; কোমরের পশ্চাৎভাগে পক্ষাঘাতের ভায় বেদনা বা যাতনা ।

**অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি ।** সযুদয় অঙ্গের কম্পন (কোন্-  
রাম্, জেল্‌স্, মার্ক্) ; বাহু এবং পা সঞ্চালনে কষ্টকর অশক্তি ; হাত পায়ে পৃষ্ঠায়ক্রমে অবশ বা অসাড় বোধ । হাতের সন্ধির বাতের ভায় শীতি ;

হাত অবশ এবং অসাড় হয় এবং উহা পর্যায়ক্রমে শীতল এবং উষ্ণ হয় ;  
 বেংলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে ঘেৰুপ হয়, ক্লম এবং বাহুতে শেফুপ  
 বেদনা ; পায়ের পক্ষাঘাতের জ্বায় সকালনে অশক্তি ; কোমর হইতে শরী-  
 রের নিম্নাঙ্গের সমুদয় অংশের পক্ষাঘাত ; চলিতে চলিতে হাঁটু ভাঙ্গিয়া  
 পড়ে ; চলিবার সময় পা হেলিয়া টলিয়া পড়ে ; হাঁটুর সন্ধির প্রদাহযুক্ত ক্ষতি  
 এবং উহাতে সূচী বিধানের জ্বায় ক্ষণস্থায়ী বেদনা বা যাতনা ; চলিবার  
 সময় হাঁটুর সন্ধিতে কেড়্কেড় শব্দ হয় ; বসিয়া থাকিলে পায়ের পাতার  
 তলা অসাড় হয় ।

নিদ্রা । নিদ্রাশূন্যতা ; রাগি জাগরণের দরুণ নিদ্রাশূন্যতা ; কাঙ্ক্ষ-  
 কর্মের চিন্তার দরুণ নিদ্রাশূন্যতা ; মনের উদ্বিগ্ন বা চিন্তা এবং অস্থিরতার  
 দরুণ নিদ্রাশূন্যতা ; নিদ্রা দ্বারা রোগী আপনাকে আপনি সুস্থ মনে করিয়া  
 না (আগিকা, চায়না, ওপিডাম) ।

জ্বর । পর্যায়ক্রমে শীত এবং উষ্ণাত্তব (কাক্সিকার্স, মার্ক) ;  
 গাল অত্যন্ত গরম এবং লালবর্ণ (একন্, বেল) ; অশ্রুনাশ এবং সন্ধ্যার সময়  
 শীত বোধ, পা এবং পৃষ্ঠদেশেই যাহা অধিক অশ্রুত হয় এবং উত্তাপ দিলেও  
 যাহার উপশম হয় না ; বারম্বার দম্কা উষ্ণাত্তব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে  
 গাল উষ্ণ, পায়ের পাতা শীতল ; আন্থিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার যাহাতে  
 রোগী কোন বিষয় সহজে বুদ্ধিতে পারে না ; কথা বলিবার সময় মনের ভাব  
 প্রকাশ করিবার ভ্রষ্ট উপযুক্ত শব্দ অরণ হয় না ; অন্নকণের ঘটনাও অরণ  
 থাকে না এবং বিভ্রিঙ্ক করিয়া বা শুন্শুন্ করিয়া কথা বলা (আগিকা) ।

বাবহার । গাড়ী, পাকী, দোলা, জাহাজ, বা নৌকার দোলন  
 জনিত অস্থখ ; মেলান্চোলিয়া (Melancholia) ; স্নায়বিক দুর্জলতা ; আক্ষেপ ;  
 মূৰ্ছা ; হিষ্টিরিয়া ; স্নায়বিক জ্বর ; রক্তাভিত্তিক ; শরীর শীর্ণ হওয়া বা পেশীক্ষয় ;  
 পাকস্থলীর অস্থখ এবং পিত্তজনিত অস্থখ ; অজীর্ণ রোগ ; সন্ধিঘাত ; পক্ষা-  
 ঘাত (প্রধানতঃ নিম্নাঙ্গের) ; অগ্রবৃদ্ধি ; শিরঃপীড়া ; মাথাঘোরা ইত্যাদি  
 অস্থখে ককিউলাস্ বাবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । দুর্জলতার দরুণ দৃঢ় ভাবে দাঁড়াই-  
 বারে অশক্তি ; পক্ষাঘাতের জ্বায় দুর্জলতার বারম্বার আক্রমণ ; সন্ধ্যা শরীর

কম্পনের শব্দাব (ইগ্নেস) ; খীতলই হউক, বা উকই হউক, বহির্বাৰু সহ  
হয় না (আমন্-কার্ব, অরাম্, নাক্স-বম্, পিট্রোল্, বাস্ টক্স, কমেজ্,  
সিপিরা) ; দুৰ্জলতার দরুণ সজোরে কথা বলিতে অশক্তি (ষ্টোনাস্) ; মারিলে  
যেৰূপ হয়, হাড়ের মধ্যে খনন করার তায় সেরূপ বেদনা বা যাতনা ;  
জীলোক এবং শিশুগণের অস্থিে বিশেষ উপযোগী ; আহাৰ বা পানের পর,  
সুখাইলে, কথা বলিলে এবং গাঁড়ী, পাকীতে চাপিয়া বেড়াইলে, তামাক  
খাইলে, পরিশ্রমে এবং বহির্বাৰুতে অস্থির হৃদ্ব ইত্যাদি ককিউলাসের  
কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ উদরের উপর ককিউলাসের কার্য  
ক্যামোমিলার তায় । এতদ্বির ইহার কার্যের সঙ্গে আন্টিমোনিয়াম্ কুডাম্,  
আর্গিনিক্, বেলাডোনা, ককিয়া, কুপ্রাম্, ইগ্নেসিয়া, ইপিকাকিউএনা,  
লাইকোপডিয়াম্, নাক্স, বমিকা, পিট্রোলিয়াম্, ফক্ষরাম্, পাল্ দেটলা,  
বাস্ টক্স, সাইলিসিয়া, বিরেটাম্ আশ্বাসের কার্যের সাপৃঞ্জ আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । কাম্ফার, ক্যামোমিলা, কুপ্রাম্, ইগ্নে-  
সিয়া, নাক্স, বমিকা ককিউলাসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ৬ এবং ১২ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক  
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । হানিমান এই ঔষধের ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করি-  
তেন । আবার মস্তিষ্কের অস্থি জনিত বমন বা বমনোদ্বেগ, দূষিত বায়ু-  
জনিত পেট ফাঁপা এবং খিল খরা বা আক্ষেপ, রক্তস্রাবের অনিয়ম হেতু  
বেদন বা বাধকের বেদনায় কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের মূল  
আরোক ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন ।  
নিম্নাঙ্গ এবং শরীরের ডাইন অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাতে এই ঔষধের মূল আরোক  
৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া ২।৩টা রোগীর চিকিৎসায় লেখক  
আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন । কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের  
৩০ এবং ২০০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

## কফিয়া ক্রুডা,—কফিয়া

(COFFEA CRUDA,—COFF.)

আমেরিকা দেশে এই গাছ জন্মে। আমেরিকার উক্ত প্রধান দেশে এবং ইউরোপের কোন কোন স্থানে ইহার ডাল চাষ হইয়া থাকে। মোকা দেশ হইতে আনিত ক্রুডা বিচি যথা নিয়মে রেক্টকাইড্ স্পিরিটে নিশাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কসের/হা মজ্জা সম্বন্ধীয় বায়ু মণ্ড-  
লেয় উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। ইহা স্নায়ুসমূহকে উত্তেজিত করিয়া  
উহার কার্য বৃদ্ধি করে। অতএব স্বাভাবিক উত্তেজনা বা শরীর ও মনের  
কার্যের অতিরিক্ত চাকলা এবং তদ্রূপ বিশেষ বিশেষ ইঞ্জিয়ার অতিরিক্ত  
উত্তেজনা বা চেতনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাব দরুন বেদনাদি সৃষ্টি  
করিবারে অশক্তি, মানসিক উত্তেজনার দরুন নিদ্রাশূন্যতা ইত্যাদি কষ্টকর  
লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। সুশুদ্ধ অস্থিবেই বেদনা যন্ত্রণাদি সৃষ্টি করিতে  
অশক্তি এই ঔষধের এক বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনের অত্যন্ত চাকলা (অজ্ঞাষ্ট্রা, ল্যাক্); মনের মধ্যে  
অনেকানেক ভাব উপস্থিত হয়; ভাড়াভাড়ি কাজ করিবার ইচ্ছা (অক্কা-  
লিক্-আস্); নিদ্রাশূন্যতা (চায়না); বেদনা যন্ত্রণাদি অসহ্য হইয়া পড়ে;  
(অরাম্, চায়না), যাহার দরুন রোগী একদমে হতাশ হইয়া পড়ে; সুশুদ্ধ  
ইঞ্জিয়ার অতিরিক্ত চেতনা, এমনকি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোগী অনায়াসে  
পড়িতে পারে; শ্রবণ, স্পর্শ, স্বাদ এবং স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদির অতিশয় এবং  
সামান্য মানসিক অবসন্নতাও রোগী অধিক বলিয়া অনুভব করে।

অস্ত্রক। মাথা ঝিম ঝিম করা এবং মাথায় গো-মুগুণে বোম; মস্তিষ্ক  
আচড়াইয়া বা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিলে সেকপ হয়, মাথায় সেকপ  
বেদনা বা যাতনা (মিউর-আস্, বিরেট্-আস্); কঁটা মারিয়া রাখিলে সেকপ  
হয়, মাথায় এক পার্শ্বে সেকপ বেদনা বা যাতনা যাহা বহির্বাযুতে বৃদ্ধি হয়  
(আপারিকান্, আনাকার্ড্, আর্বিফ্); আহাতির পর মাথা বেদনার বৃদ্ধি

কেকিউল্, নাক্স-বম) এবং বহির্বিষ্মতে মাধাধরা থাকে না ও ঘরের মধ্যে গেলে মাথা বেদনা পুনরায় আরম্ভ হয় (পাল্‌স্)।

চক্ষু । দৃষ্টি শক্তিবৃদ্ধি ।

কর্ণ । শ্রবণ শক্তির অত্যন্ত প্রগরতা (কোকা, ওপিয়াম্); কোন প্রকারেব শব্দ বা গোলমাল কানে লয় হয় না বা কানে লাগে এবং তদ্রূপ রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে।

নাসিকা । শ্রাবণ শক্তির বৃদ্ধি (একন, আণ্ডারিকাশ্, বেল্, কল্‌চ্, হিপ্পোলাফ্, লাইকোপ)।

মুখমণ্ডল । অপরাহ্ন ১টার সময় মুখমণ্ডল শুষ্ক এবং গাল লালবর্ণ; মুখমণ্ডল, ডাইন চক্ষুর গোলক এবং মাথাব ডাইন পার্শ্বের স্নায়ুশূল।

মুখগহ্বর । দন্তশূল, কেবল শীতল জল বা বরফ মিশ্রিত জল লাগিলেই যাহার উপশম হয় (বিস্মাগ্, ব্রাই, ক্রিমেটিন্); স্বাদের আতিশয্য।

পাকস্থলী এবং উদর । আহারের পূর্বে অত্যন্ত ক্ষুধা, যাহার দ্রুত রোগী অত্যন্ত ভাড়াভাড়ি ব্যগ্রতার সহিত খায়; ক্ষুধা বা কচির হ্রাস; হিকা। উদরে বেদনা, যাহার দ্রুত মনে হয় যেন উদর কাটিয়া যাইবে এবং তদ্রূপ অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়া।

শ্বাসযন্ত্র । প্রাতঃকালে চলিয়া বেড়াইলে কঠিনালীতে ঝঞ্ঝেণ বোধ এবং স্বরভঙ্গ (কার্পো-অনিমেল্, কষ্ট, ফস্); বৃক্কের মধ্যে অত্যন্ত যাতনা; ঘন ঘন নিশ্বাস টানা; আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি (আলাম্, সিমিসিফ্, হায়োস্)।

নিদ্রা । শারীরিক এবং মানসিক অত্যন্ত উত্তেজনার দ্রুত নিদ্রা-শুভ্রতা (সিমিসিফ্, কোকা, হায়োস্, ওপিয়াম্)।

জ্বর । প্রত্যেকবার নড়াচড়াতে শীতের বৃদ্ধি (আণিকা); আভ্যন্তরিক শীত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল এবং বাহ্যিক উষ্ণতা।

চর্ম্ম । গায় হামের আয় ক্ষুদ্রী (আণ্টি-কুড, ব্যাপ্ট, পাল্‌স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চর্ম্মের শুষ্ক উষ্ণতা (একন); চর্ম্মের অতিরিক্ত উত্তেজনা এবং তদ্রূপ ক্রন্দন।

ব্যবহার । হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা ক্রমিত অস্থ্য;

হঠাৎ কোন সম্ভাব্য জনক বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অস্থব্ধ; প্রারম্ভিক মণ্ডলীর অতিরিক্ত উত্তেজনা; অত্যন্ত কষ্টদায়ক শ্বাসশূল; দস্তশূল; নিদ্রাশূন্যতা; হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি অস্থব্ধে কক্ষিয়া ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অনেক স্থান চুলকাইবার ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু যাতনামূল্য করিতে না পারিয়া চুলকানে অশক্তি; মানসিক উল্লাসের দরুন শারীরিক উত্তেজনা; স্থির ভাবে রাখিতে ইচ্ছা সত্যোৎপ্রেমিক হাত কাঁপে; হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতাতে মুচ্ছা ঘাওয়া; অতিরিক্ত উত্তেজনায় দরুন আক্ষেপ (Convulsions) (জেল্ম); অসহ্য বেদনা (অরাম, চারনা, কাম্), শ্বাসের দরুন কোণী একবারে হতাশ হইয়া পড়ে; বহির্বাণ্য সেবনে অনিচ্ছা, কারণ উদ্ভাঙে অস্থব্ধ বুদ্ধি হয় ইত্যাদি কক্ষিয়ার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । কক্ষিয়ার কার্য্যের সঙ্গে ক্যানোসিসা, ইগ্নেসিয়া এবং কোকার কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহাব কার্য্যের সঙ্গে একোনাইট, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, কটিকাম্, চারনা, ককিউলাস্, হায়োসায়েরমাস্, লাইকোপডিয়ারম্, নাক্স-বমিকা, ওপিরাশ্, পাল্‌সেটিলার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । একোনাইট, ক্যানোসিসা, ইগ্নেসিয়া, নাক্স-বমিকা, পাল্‌সেটিলার কক্ষিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । অতিরিক্ত পরিমাণে কার্ফি থাইয়া কোন প্রকারের পুরাতন আকারের রোগ উৎপন্ন হইলে লক্ষণ বিশেষে ক্যানোসিসা, ইগ্নেসিয়া, মাকিউরিয়াস্, নাক্স-বমিকা, পাল্‌সেটিলার ইত্যাদি ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে ।

ডাইলুশন বিচার । ৬ হইতে ১২ ক্রমের আরোকই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্টর বেজেস ( Dr. Bayes ) মতে সকল প্রকার অস্থব্ধেই ১২ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী । এই ঔষধের ৩০ দশমিক এবং ৩০ শতভাগিক ডাইলুশনও অনেক চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া থাকেন ।



## কল্‌চিকাম্ অটাম্‌নেলী,—কল্‌চ্

(COLCHICUM AUTUMNALE,—COLCH.)

ইউরোপের অনেক স্থানে ভিজা মাঠ ময়দানে এই গাছ জন্মে। ইংলণ্ড এবং আয়ারলণ্ডের কোন কোন স্থানে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বসন্ত কালে পাতা শুকাইয়া পড়িয়া গেলে ইহার গোলাকার কাঁচা মূল বা শিকড় সংগ্রহ করিয়া যথা নিয়মে প্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

**সাধারণ ক্রিয়া।** মস্তিষ্ক এবং কসেরূকা মজ্জা সঞ্চরীয় এবং গ্যাংলিয়োনিক স্নায়ুশুল্কীয় (Ganglionic System of nerves) উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ মস্তিষ্ক এবং কসেরূকা মজ্জা উত্তেজিত হইয়া আক্কেপ (Convulsions), খিলধরা (Cramps), স্নায়ুশূল, পক্ষাঘাত এবং দুর্বলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্নায়ুশুল্কীয় উপর উক্ত প্রকারের কার্যের প্রতিক্রিয়াতে ইহা স্থির আবরক কঠিন পর্দা (Periosteum), সাইনোভিয়াল্ পর্দা (Synovial membranes), (বিশেষতঃ হৃদ্ব হৃদ্ব সন্ধিব), মূত্র এবং পরিপাক সঞ্চরীয় যন্ত্রাদি এবং কতক পরিমাণে শ্বাস যন্ত্র আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা শৈল্পিক ঝিল্লীর নিঃসরণে পরিবর্তন এবং উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করে, যাহার দরুণ সন্ধি বাতের স্থায় প্রদাহের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। ছিঁড়িয়া ফেলার স্থায় বেদনা বা বাতনা এবং রাত্রিবোণে বেদনাদির আক্রমণ কল্‌চিকামের এক বিশেষ প্রকৃতি মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

**মন।** সর্বদা চিড়ং চিড়ং করা এবং কিছুতেই মন তুষ্ট না হওয়া (ক্যালক-কল, কাম, সিনা); উজ্জল এবং উগ্র গন্ধ সহ হয় না (নাক্স-বন্), গায় আঘাত লাগা বা স্পর্শ এবং অশ্রুব অশ্রায় কার্য একবারে সহ হয় না; বেদনা যন্ত্রণাদি একবারেই সহ হয় না (কাম, কফিয়া); সকল বিষয়ই ভুলিয়া যাওয়া (আজেক্ট-নাইট্রিক, ক্যাক-কার্ক, ক্যাছ)।

**মস্তিষ্ক।** মাথায়, প্রধানতঃ মাথার পশ্চাৎভাগে এবং হৃদ্ব মস্তিষ্কের (Cerebellum) মধ্যে অত্যন্ত চাপাবোধ; মাথায় ছিদ্র করার স্থায়

বেদনা, প্রধানতঃ চক্ষুর উপরিভাগে (কলোস্); কপাল এবং মাথার উপরি ভাগে হামা দেওয়া বা হুড়্-হুড়্ করার জ্বার অনুভূত হয় (আল্বেণ্ট-নাইটিক্, কুশ্রাম্); চলিয়া আসিয়া বসিলে মাথাধোরা; চক্ষুর উপরি ভাগে ফাটির বা ওয়ার জ্বার অনুভূত হয়; মাথার চিড়িকমারা বা দপ-দপানি (পাল্‌স্)।

চক্ষু । চক্ষু প্রদাহ; চক্ষে কম বা কাপ্সা দেবা; চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলপড়া; চক্ষুর কর্ণিরাতে (Cornea) সাদা দাগ পড়া।

কর্ণ । কর্ণশূল এবং কানের মধ্যে ভৌজ ছুঁবীদিয়া কাটার জ্বার অনুভূত হওয়া (বেল্, পাল্‌স্); কানের মধ্যে সৌ সৌ শব্দ হওয়া; কান যেন বন্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়। \*

নাসিকা । সমুদয় প্রকারের গন্ধই নাকে লাগে বা সহ হয় না। (একন্, আগারিকান্, বেল্, কফিয়া, হিপ-সাল্‌ফ্, লাইকোপ্); দুই নাসারন্ধ্রের মধ্যবর্তী অস্থিতে ক্ষত হওয়ার নায় বেদনা এবং টাটানি; লক্ষ্যার সময় নাক দিয়া রক্ত পড়া।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল রুগ, বিষৰ্ষ এবং অত্যন্ত ঘাতনার চিহ্নযুক্ত (আস্); মুখ মণ্ডলের পেশী এবং হাড় কলিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার জ্বার প্রবল বেদনা; নিহাব লাগিলে বেক্রপ হয়, মুখ মণ্ডলে সে রূপ হুড়্-হুড়ী বা চড়্‌চড়ানি (আগারিকান্); মুখমণ্ডলের শোথের জ্বার ক্ষতি।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত (আণ্টিক্রুড্, ব্রাই, নাক্স-বন্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্); জিহ্বা ভারি, শক্ত এবং উহাতে স্পর্শ জ্ঞান থাকে না (কোনায়াম্); দন্তশূল এবং দাঁতের গোড়ায় ছিড়িয়া ফেলার জ্বার বেদনা বা ঘাতন; দাঁতে সামান্য স্পর্শন ও সহ হয় না; মুখ-গহ্বর এবং গলার মধ্যের স্নৈয়িক কিল্লীর প্রদাহ; মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠা, অথচ গলার মধ্যে শুকাহুতব। তালুকা এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎ ভাগ প্রদাহযুক্ত এবং লাল বর্ণ।

পাকস্থলী এবং উদর । আহারে অনিচ্ছা বা অকাচ (ককিউল); আহার দ্রব্য দেপিলেই গা বমী বমী করা (আণ্টিক্রুড্, আস্); আহার দ্রব্যের পক্ষে আরো গা বমী বমী করে; অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু খুধা থাকে

না; মুখে তিক্তবান; বাহ, ডিম, চর্কিযুক্ত মাংসের গন্ধে বমনোৎসেগ, বমন এবং কখন কখন মুচ্ছাও হয়; উদগার উঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থনীতে জ্বালাসুত্তব (আর্স্); প্রত্যেকবার নড়া চড়াতে বমন হয়, যাহার দক্ষণ রোগী সোজা হইয়া বসিতে পারে না (ব্রাই); উদরস্থ আহার দ্রব্য বা পিত্ত বমন (আন্টি-ক্রুড্); পাকস্থলীর মধ্যে বরফের জ্বায় ঠাণ্ডা বোধ (ক্যাস্ফার, লবোস্, ফস্); পাকস্থনীতে স্ত্রী বিধানের জ্বায় অহুত হয়; উদরোর্ধ্ব প্রদেশে অত্যন্ত জ্বালাসুত্তব (আর্স্, বেল্, ক্যাস্, ফস্, বিরেট্-আব্)। অতিরিক্ত আহার করিলে যেরূপ হয়, উদর সেরূপ ক্ষীত এবং বিস্তৃত হয় (চায়না, লাইকোপ্); উদরে কামড়ানীর জ্বায় বেদনা বা বাতনা (ব্রাই, চেলিডন্, মার্ক্); শূল বেদনা, আহারের পর, দ্বিত বায়ু উৎপাদক দ্রব্য খাওয়ার পর পেট্ কাঁপা, উদরাময় হইয়া গেলে যাহার উপশম হয়; ষাঁটু শুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিলে শূল বেদনার উপশম হয় (কলোস্)।

মল এবং মলদ্বার । সন্ধ্যাকালে শুষ্কদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত হর্গক্ষয়িত দ্বিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্, ব্রাই, আক্); শুষ্কদ্বারের লক্ষ্যচক ঘরের আক্ষেপ এবং পৃষ্ঠদেশের কাম্পন; অত্যন্ত কষ্টের সহিত অত্যন্ত অল্প পরিমাণে মলত্যাগ; বারম্বার বাহের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না; বায়ু নিঃসরণে বাহের বেগের কতকটা উপশম হয়; প্রবল কষ্টদায়ক কৌথপাড়া (মার্ক্, ক্যাপ্); মল প্রথমত পিত্তযুক্ত এবং তৎপর পক্ষীর টুকরা, চট্‌চটিয়া আঠা পদার্থ ও হরিজ্রাবর্ণের পক্ষীর জ্বায় ছেকড়া ছেকড়া পদার্থ মিশ্রিত মল ত্যাগ; প্রচুর পরিমাণে হরিজ্রাবর্ণ রক্ত বিশিষ্ট মল ত্যাগ; মল স্বচ্ছ ও চট্‌চটিয়া আঠা পদার্থ মিশ্রিত (হেলিবোরাস্, রাস্টক্); পক্ষীযুক্ত স্লেয়া নির্গত হইয়া পেটকামড়ানীর উপশম হয়; স্বচ্ছ, গদ গোলার জ্বায় স্লেয়া ভেদ (আলোজ্, হেলিবোরাস্, ক্যানী-বাই); কণী কানীর আমাশয় এবং মল সাদা স্লেয়া ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টদায়ক কৌথপাড়া; মল ত্যাগের সময় মনে হয় যেন শুষ্কদ্বার ছিঁড়িয়া বাইবে; শুষ্কদ্বার বাহির হইয়া পড়া (Prolapsus ani)।

মূত্রবস্ত্র । বারম্বার মূত্রত্যাগ; বারম্বার অল্প পরিমাণ কাল্টে, বোলাটিয়া মূত্র ত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কষ্টদায়ক কৌথপাড়া

ও মূত্র নালীতে জ্বালা (কাফ, কাপস, মাক্-কর); কালিটে, রক্ত মিশ্রিত, প্রায় কাগীর জায় মূত্রভাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র কুচ্ছ (আস, কাফ); মূত্রে সাদাটিয়া তলানি পড়ে (কাক্-কার্ক, কাফ) ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক অত্যন্ত কষ্টান্বিত; রাত্রিতে কালি এবং কালিবার সময় অনিচ্ছাপূর্বক বা অসাড় মূত্র নির্গত হয় (আলাম, কষ্ট, পালস); বৃক ছিঁড়িয়া ফেলা বা ভোঁতা ছুরী দিয়া কাঁটার জায় বেদনা বা যাতনা ।

হৃৎপিণ্ড । প্রবল হৃৎস্পন্দন (একন, ফর্ম, বেল, পাইজেল); তক্রণ বাত রোগের পর হৃৎপিণ্ডের অস্থখ; নাকী ক্রতগামী এবং কঠিন অথবা পূর্ণ এবং মৃদুগতি বিশিষ্ট; নাকী মৃদুগতি বিশিষ্ট এবং হ্রস্বল; নাকী ক্রতগামী এবং মৃদুবৎ হ্রস্ব ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশে বাতের বেদনার জায় কসিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার জায় বেদনা (পালস); গুহা ধারের উপরি ভাগের কোন কোন অংশে ক্ষত হওয়ার জায় টাটানি বা চড়্‌চড়ানি, স্পন্দনে যাহা অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায় ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । পেশী এবং সন্ধিতে ছিড়িয়া ফেলার জায় বেদনা; হাত এবং পায়ের পাতায় অবশবোধ এবং উহাতে কুট্‌কুটানি । বাহ্যে পক্ষাঘাতের জায় বেদনা বা যাতনাদি এত প্রবল হয়, যে উহার দরুন রোগী একটা কুদ্র বস্তুর আঁটিয়া বা দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারে না; বাহ্যে বাতের বেদনা যাহা আত্মল, প্রধানতঃ আত্মলের সন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (ব্রাই, কলোস্) । পায় বাতের বেদনা যাহা পায়ের আত্মল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; পায় খিলধরা (কাক্-কার্ক, কাক্ফার, নাক্-বম, সালফ্); পা এবং পায়ের পাতার শোণের জায় ক্ষীতি (আস, এপিস্); পায় নিহারাদি লাগিলে পায়ের আত্মলে ক্ষত্‌য়া বা কুট্‌কুটানি (আগারিকাল্) ।

নিদ্রা । দিনের বেলা নিদ্রাবেশ বা স্থিমান (নাক্-মক্) ।

চর্ম্ম । নিদার লাগিলে ঘেক্রণ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে সেক্রণ পড়্‌পড়্‌ বা চড়্‌চড়ানি (আগারিকাল্) ।

**জ্বর ।** সমুদয় শরীরেই ঠাণ্ডা বা শীতবোধ, শরীরের স্থানে স্থানে শীত কম্প এবং হান্না দেওয়ার ভায় স্ব্‌ড্‌হ্‌ড্‌ ; রাত্রিতে শুষ্ক উষ্ণাহুত্ব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা (একন্, আস্) ; ঘর্ম্মাবরোধ ; টক গন্ধ যুক্ত প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম বাহ্য হঠাৎ চয় এবং হঠাৎ শুকাইয়া যায় ; এই প্রকার ঘর্ম্ম বাত রোগেই অধিক হইয়া থাকে ।

**ব্যবহার ।** পেশী এবং স্নায়ুগত জনিত অজ্বর ; শরীরের বহির্দর্শিত্ব হইতে বাত রোগ আভ্যন্তরিক রোগের মধ্যে পরিণত পড়া ; পক্ষাঘাত ; শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্র এবং কোটরের শোণ, প্রধানতঃ হৃদাহাবরক, কিরীীর মধ্যে জলেন ভ্রায় দূষিত পদার্থের সঞ্চার ; বক্ষশোণ ; উদরী ; অরায়ুর শোণ ; শোণের ভ্রাস্‌ক্ষতি (Ilema) ; সাদ্যঙ্গিক শোণ ; উদরায় ; বক্তাভাণয় ; হাঁপানি কাশি ; হৃদ্যাবরক কিরীী প্রদাহ (Pleurisy) ; হৃদাহাবরক কিরীী প্রহাহ (Pericarditis) ; চক্ষু প্রদাহ এবং চক্ষে ছানি পড়া (Cataract) ; সমাখ ওলাউঠা ইত্যাদি অজুখে কল্‌চিকাম্ ব্যবহার্য্য ।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।** অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা এবং উহাতে অসাড়বোধ ; গ্রীষ্মকালে বা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বাতরোগ ; নিহার লাগিলে যেৰূপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে সেৰূপ উন্‌টন্‌ করা ; শারীরিক পরিশ্রমের পর যেৰূপ হয়, সেৰূপ দুর্বলতা বা অসঙ্গতা (আস্, ব্রাই, চায়না) ; হঠাৎ অত্যন্ত বলকয় (আস্, কাম্‌ফাব, নিকেল) ; সমাখ স্পর্শনেও আক্রান্ত স্থানে বেদনার উদ্রেক হয় ; বেদনা এক স্থান হইতে অল্প স্থানে হঠাৎ পরিণত পড়ে (পাল্‌স্) ; বলিষ্ঠ বোলীৰ ক্ষুদ্র স্নায়ুগত বা গাউট্‌ (Rout) এবং বৃদ্ধবয়সের অজুখে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী ; বাত্ৰিতে, মানাসক পরিশ্রমে, বিছানায় উঠিয়া বসিলে নড়াচড়াতে অজুখের রক্তি এবং নিদ্রা বা বিশ্রাম কালীন এবং বহির্বায়ুতে অজুখের উপশম ইত্যাদি কল্‌চিকামের কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পবিগণিত ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ ।** কল্‌চিকামের কার্য্যের সঙ্গে সিবিসি-ফিউগা, আর্বিকা, ব্রাইওনিয়া এবং বিরেট্রাম্‌ আল্‌বামের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এত ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে একো-

নাইট্, বেলাডোনা, কাকিউলাস্, মার্কিউরিয়াম্, নাক্স্, বমিকা, ওপিয়াম্, পাল্‌সেটিনা, রাস্ টক্স্ এবং সিপিয়ার কার্বোর মাদৃশ আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । বেলাডোনা, ক্যান্‌ফার, কাকিউলাস্, নাক্স্, বমিকা, স্পাইজেলিয়া, পাল্‌সেটিনা কল্‌চিকামের প্রতিষেধক ঔষধ মন্থে পরিগণিত । অধিক মাত্রায় কল্‌চিকাম্ খাইয়া বিষাক্ত হইলে আয়োনিয়াম্ কল্‌চিকামের কএক ফোঁটা চিনির জলে মিলাইয়া সেবা ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ২য় এবং ৩য় ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, সামান্য রকমের কুহ্ম সন্ধিততে (Gout) কল্‌চিকামের মূল আরোক ৫ ফোঁটা মাত্রার ২৩ ঘটা অল্প এক মাত্রা সেবনে বেদনাদিব অতি শীঘ্র শীঘ্র উপশম হয়, অগতঃ এত অধিক মাত্রায় ঔষধ সেবনের দরুণ অনিষ্ট হয় না । কিন্তু ডাক্তার ডান্‌হাম্ (Dr. Dunham) বলেন যে রোগ অনেক পুরাতন আকার ধারণ করিলে ১৫ ডাইলুশন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে । চক্ষের ছানিতে (Cataract) ৩৪ ডাইলুশনে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায় । চক্ষের ছানিতে অনেক চিকিৎসক ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহৃত করিয়া থাকেন ।

কলোসিস্তিস্,—কলোসিস্ত্,—কলোস্

(COLOCYNTHIS —COLOCYNTH,—COLOC.)

যাপান, ইজিপ্ট এবং তুরক দেশে এই গাছ জন্মে । ফল সংগ্রহ করিয়া ইহার বিচিত্র শুকনা খণ্ড দিয়া এক্‌ স্পিরিটে ইহাৰ মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । যথা নিয়মে অগাধ অর মিষ্টের সঙ্গে মিলাইয়া ইহার ভুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাদারণ ক্রিয়া । গাংগ্লিয়োনিক স্নায়ু মণ্ডলীর (ganglionic nervous system), প্রধানতঃ সূক্ষ্মমণ্ডল এবং মস্তকেব জ্ঞান উৎপাদক বৃহৎ স্নায়ু বা ট্রিজিমিনাস্ (Trigeminal), এরট্ (Aorta) নানক বৃহৎ ধমনিব চতুঃস্পার্শ্বকীয় স্নায়ু সন্ধ বা সোলার প্লেক্সাস্ (Solar Plexus), কোমর এবং উরদেশস্থ স্নায়ু এবং উক্ত স্নায়ুগুলি শবীরেরদে যে অংশ দিয়া অস্থিবা

বার, উহার উপর কলোসিসিস্ কার্য্য অতি প্রবল । উক্ত স্নায়ু ইত্যাদির উপর কার্য্যের দৰ্শন স্নায়ুশূল এবং কখন কখন আক্রান্ত অংশে প্রকৃত প্রদাহও উৎপন্ন হইয়া থাকে । সোঁলাল প্লেক্সাস্ দিয়া উক্ত প্রদাহ আহার বহা নালীতে (Alimentary Canal) বিস্তৃত হইয়া বমন, ভেদ এবং উদরে ভয়ানক আকারের শূল বেদনার জন্ম বেদনা বা পেট কামড়ানী ইত্যাদি কষ্টকর অস্বস্তি উৎপাদন করে । ট্রিজিমিনাস্ স্নায়ুর অগ্রভাগের জ্ঞান উৎপাদক শক্তির কার্য্যের বৈলক্ষণ্য উপাদান করিয়া ইহা মুখমণ্ডল, চক্ষু এবং মস্তকের স্নায়ুশূল উৎপাদন করে । কোমর এবং পায়ের স্নায়ুর (Lumbar and Crural nerves) মধ্য দিয়া ইহা কুচকির সন্ধিবাহ বা সায়ে-টিক্ স্নায়ুশূল (Sciatica) এবং অস্বাস্থ্য প্রকারের স্নায়ুশূল জনিত রোগ উৎপাদন করে । উদরে শূল বেদনার জন্ম ভয়ানক প্রবল বেদনা (যাহার দৰ্শন রোগী হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়) উৎপাদন করা কলোসিসিস্ একটী বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । কথা বলিতে, প্রবেশ উত্তর দিতে অথবা বস্তু বাক্যবর্ণনাকে দেখিতে অনিচ্ছা (জেলন্স); অত্যন্ত খিট্ খিট্ করা এবং বিমর্ষতা; অধৈর্য্য হওয়া এবং সামান্য কারণেই বিরক্ত হওয়া (ক্যাপ্‌স্, নাক্স-বম্); রাগ করা এবং দর্শনা রাগান্বিত থাকা (ব্রাই, ক্যাম্, কোনিবাম্, নাক্স-বম্); বোগী (ব্রীলোক) অস্ত্র লোক এবং আপন দুর্ভাগ্যে অত্যন্ত ক্রিষ্ট হয়; শ্রোণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বোমা থাকা এবং বিচানা হইতে পলায়নের ইচ্ছা ।

মস্তক । মাথা গোলমেলে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর কোটরে চাপিয়া ধরা যাত্র বেদনা বা যাত্রনা; কপালে চাপিয়া ধরা জ্বর বেদনা, মাথা ঠেট করিয়া উপুড় হইলে বা চীৎভাবে শয়ন করিয়া থাকিলে ব্যথার বৃদ্ধি হয়; মস্তকের সমুদয় স্থানের মধ্য দিয়া ছিড়িয়া ফেলা বা বমন করার জ্বর বেদনা বা যাত্রনা, চক্ষুর উপরে পাতা সঞ্চালনে ব্যথা অস্বস্তি হইয়া পড়ে; কপালের ডাইন পার্শ্বে ছিদ্র করার জ্বর ভয়ানক বেদনা; কপালের ডাইন পার্শ্বে ছিদ্র করার জ্বর ভয়ানক বেদনা; কপালের ডাইন পার্শ্বে সূচী প্রবেশ বা ছিদ্র করার জ্বর বেদনা বা যাত্রনা, স্পর্শ করিলেই যাহা অস্বস্তি

হয় ; কপালের বাম পার্শ্বে চাপিয়া ধরাব জায় ঘৃণ্ণ-মুশে বেদনা যাহা ক্রমে ক্রমে কষ্টনবৎ এবং অধিক প্রবল হয় ; এক পোশে মাথা ধরা (আধ কপালিয়া মাথা ব্যাথা) এবং উঠাব সঙ্গে সঙ্গে বমনোদগে এবং বমন ।

চক্ষু । চক্ষুর গোলকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক চাপাবোধ, মাথা হেট করিয়া উপুড় হটলে যাহা অধিক অন্তর্ভূত হয় ; চক্ষে বেদনা ; ডাইন চক্ষুর গোলকে কষ্টনবৎ বেদনা ।

কর্ণ । দুই কানেই সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া এবং দপ্পদপানি, বাম কানেই যাহা অধিক অন্তর্ভূত হয় ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল কালচে লালকর্ণ (বাপ্ট, ওপিয়াম্) ; বাম গালের মেজাব অস্থিতে (Malar bone) সফোর্চক এবং চাপিয়া ধরার জায় বেদনা যাহা বাম চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বে ছিড়িয়া ফেলার জায় বা আঘাত বা ছল ফটানের জায় বেদনা যাহা কর্ণ এবং মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; গালে ছিড়িয়া ফেলার জায় বেদনা ; মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বে ঘাটশূল ; বাম গালের হাড়ে খিলধরার জায় বেদনা যাহা চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; নড়া চড়া বা স্পর্শন বা সামান্য আঘাতে বেদনাদির বৃদ্ধি (চাফনা) ।

মুগগন্ধর । মুগ ক্রমাগত তিক্ত এবং বিবর্তিত জনক স্বাদ (ব্রাউ, চায়নি, নাস্-পন, পাল্, সাল্-ক্ : জিহবার অগ্রভাগের জালা (ক্যান্ড্-কার্ল্, কার্গে-অনিমেব্) ; ডাল উঠিয়া বা হটলে মেকপ হয়, জিহ্বায় মেকপ অন্তর্ভূত হয় (আইবিস, প্রাটিনা, মাস্কুনারিয়া, বিরেট-অল্, বিরেট-বিরাইড) ।

পাকস্থলী এবং উদর । বহুদন প্রকাশ্যে আহার বা পানীয় ত্রবোই তিক্ত স্বাদ ; যাহারো পব মুখে তিক্ত স্বাদ (নাইটিক্-অস্) ; প্রবল পিপাসা (একন্, অস্, ব্রাউ) ; আহারে অকচি এবং গলার মধ্যে চাচিয়া ফেলার জায় অন্তর্ভূত হয় ; কাঠ উদগার (ককিউনাস) ; পাকস্থলী হইতে যেন বমনোদগে হয় একপ অন্তর্ভূত হয় ; তিক্ত স্বাদ বাশিষ্ট হরিদ্রাবর্ণের তরল পদার্থ বমন ; পাকস্থলীতে আঘাত বেদনা (অস্, এপিস্, ক্যান্, কল্, কস, বিনেট্-অস্, প্রত্যেকবার আহারের পর উদরোচ্চ প্রদেশে



কামড়ানির জ্বায় বেদনা, সম্ভার সময় বাহার বৃদ্ধি হয় ; উদরোচ্চ প্রদেশে পূর্ণবোধ ; রাত্রিতে পাকস্থলীতে খিলধরা, উদগার উঠিলে বাহার উপশম হয় ; পাকস্থলীতে খালিবোধ ; পাকস্থলীর মধ্য স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনামুক্ত হয় বা টাটায় ; বুক এবং উদরের নানা স্থান হইতে কঠিনবৎ বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বায় বেদনা আবন্ত হইয়া পাকস্থলীর মধ্যে বিস্তৃত হইয়া স্থিত হয় ; প্রবল প্রচাপনে এবং হাঁটু গুটাইয়া জড় সড় হইয়া থাকিলে এই বেদনার উপশম হয় ও বোগী বিরক্ত বা রাগান্বিত হইলে এই বেদনার উদ্বেক হয় । উদরের ছই পার্শ্বেই খিল ধরার জ্বায় বেদনা, চাপ দেওয়ার পর অথবা টেবলের উপর উদর ফেলান দিয়া উপুড় হইয়া চাপ দিয়া রাখিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; উদর স্পীত ও বিস্তৃত এবং বেদনামুক্ত (একন্. বেল্. মার্ক) ; উদরে ভয়ানক সঙ্কোচক, মোচড়াইয়া ধরার জ্বায় বেদনা (সিনা). নাভির উপরিভাগেই বাহা অধিক অন্তর্ভূত হয়, এবং বাহার দক্ষণ রোগী হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় (অপোজ্, কষ্ট, আইবিস্, নাক্স-বম্, ক্রম্, সাল্ফ্., বিবেট্-আব্) এবং একভাণ চাড়িয়া অত্র একভাবে থাকিলে বাহার বৃদ্ধি হয় (বিপরিত অবস্থায় বেলাডোনা ব্যবস্থা) ; একভাবে পবিবর্তন করিয়া অত্র একভাবে থাকিলেই বেদনার দক্ষণ বোগী অত্যন্ত অস্থির হয় এবং ছটফট্ করে ও চিংকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে ; ৫১০ মিনিট অন্তর বেদনার বৃদ্ধি ; মল-ত্যাগ বা গুহ্বার দিয়া বায়ু (Flatus) নিঃসরণে বেদনার ক্ষণিক উপশম হয় ; উদরে শূল বেদনার জ্বায় বেদনা এত কষ্টকর হইয়া পড়ে, যে উহার দক্ষণ উপশম পাওয়ার আশায় বোগী মেজ বা থাটের কাঠে উদরে প্রবল বেগে চাপ দিয়া রাখিতে বাধ্য হয় ; অত্র পাথরের চাপ দিয়া নিম্ভ্‌ডাইলে যেকপ হয়, উদরে সেকপ অন্তর্ভূত হয় (নাক্স-বম্) ; উদবে ছুরি দিয়া কাটার জ্বায় বেদনা ; অত্র বৃদ্ধি হইলে যেকপ হয়. কুঁচকি প্রদেশে সেকপ ঠেলিয়া বাহির হওয়ার জ্বায় অন্তর্ভূত হয় এবং আক্রান্ত স্থানে চাপ দিলে বহির্গত অত্র যেন স্বস্থানে প্রবিষ্ট হয় একপ অন্তর্ভূত হয় ; ডিম্বকোষের প্রদাহে যেকপ হয়, স্ত্রীলোকের উদরের স্থানে স্থানের গভীর প্রদেশে স্ত্রী বিন্দানের জ্বায় বেদনা বা চিড়িক মারা ; উদরে গড়্ গড়্, কল কল এবং বেঙ্গের ডাকের জ্বায় শব্দ হয় (খুজা) ; কাঁকি বা তামাক খাইলে অশ্রুব মধ্যে বেদনার অনেক উপশম হয় ;

একবার আহারের পর বেদনার বৃদ্ধি এবং উহার পরবারের আহারের পর বেদনা থাকে না এবং তৎপর আহারের পর আবার বেদনার বৃদ্ধি হইয়া এই প্রকার ক্রমাগত হইতে থাকে (ফেরাম) ।

**মল এবং মলদ্বার ।** বারম্বার অত্যন্ত বাহ্যের বেগ, বাহার দরুণ মনে হয় যেন গুহ এবং গুহদ্বার অনেক কাল ধবিয়া উদরাময়ের দরুণ ছর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে ; আমাশয়ের লক্ষণাক্রান্ত উদবাসন, আহার বা পানীয় দ্রব্য উদরস্থ হইলেই বাহার উদ্রেক হয় (আলোজ, ফেবায়, নাক্স-বম) ; প্রচুর পরিমাণে মলভাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু (Flatus) নিঃসরণ (আলোজ) ; রক্ত ভেদ ; আহারের পব তরল ভেদ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু নিঃসরণ এবং উদরে বেদনা (আগাধিকাণ) ; পাতলা, ফেণাবুক্ত, যাক্সানের জায় হরি-জীবনের পচাছিন্নবৃত্ত মল ভেদ ; কোষ্ঠবদ্ধ এবং মল কঠিন, বাহা নির্গত হওয়ার সময় মনে হয় যেন গুহদ্বার দিয়া পাথর নির্গত হইতেছে ; বিরক্তি এবং শোণের পর সবুজবর্ণের তরল ভেদ ; আমাশয় ; মল রক্ত মিশ্রিত, চট্‌চটিয়া আঠা পদার্থ বা অল্প টাচিয়া ফেলিলে যেক্রপ হয়, সেরূপ কাঁচা মাছ মাংস ধোয়া জলের জার জলবৎ ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া পর্দার জায় পদার্থ বিশিষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বায়বীর কষ্টদায়ক কৌণপাড়া, মল ভাগের পর বাহার উপশম হয় ; রক্তমিশ্রিত তরলমল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নের মধ্যে ভয়ানক প্রবল বেদনা, বাহা উরুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; গুহদ্বারের সঙ্কোচক যন্ত্রের পক্ষাঘাত হেতু গুহদ্বার সর্বদা শোলা থাকে (ফস) ।

**মূত্রযন্ত্র ।** মূত্র সঞ্চিত থাকার দরুণ মূত্রাধারে পূর্ণবোধ এবং গুহদ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণের সময় মূত্রাধারে চাপ পড়ার দরুণ চর্চাৎ মূত্র নির্গমন ; বারম্বার মূত্রের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে অতি অল্প পরিমাণে মূত্র নির্গত হয় (ইদুলাস, এপিদ্, প্রাক, তেলিবোরাস, মার্ক, নাইট্রিক-অ্যাস) ; অত্যন্ত তর্পকবৃত্ত, গাঢ়, আঁটাল, গোঁদ গোলার ন্যায় অল্প পরিমাণ মূত্র ভাগ ; মূত্র মাংস ধোয়া জলের ন্যায় দিক লালবর্ণ এবং উহাতে সাদাটিয়া কটাবর্ণ তলানি পড়ে ; মূত্র কটাবর্ণ (ব্রাউ) বাহা মূত্র ভাগের কতকগুলি পরেই ঠাণ্ডা হইলে বোলাটিয়া হয় এবং উহাতে প্রচুর পরিমাণে তলানি পড়ে ।

**জননেদ্রিয় ।** গ্রীলোকের বাম ডিম্বকোষ প্রদেশে খিল ধরার জ্বর বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন উক্ত স্থান আখের রস বাহির করার কলের মধ্যে রাখিয়া ঘোচড়াইতেছে ; ডিম্বকোষে কসিয়া ধরা বা ছিদ্র করার ক্ষমতা বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ রোগী হাঁটু ওটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকে এবং ছট্-ফট্ করে ।

**স্বাসযন্ত্র ।** কণ্ঠনালীতে উত্তেজনা এবং হৃৎ-স্রুতীর দরুণ রাত্রিতে কাশির উদ্রেক হয় ; বৃকে আঁটা বা কণ্টামুতব ।

**গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ ।** ঘাড়ের পেশী শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না, যাহার দরুণ ঘাড় ফিরাইতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয় (চেনিডন্, রাস্ টঙ্ক) ; গ্রীবার বাম পার্শ্বের পেশীতে কসিয়া ধরার জ্বর বেদনা, ঘাড় সঞ্চালনে যাহার বৃদ্ধি হয় ; ঘাড়ের বাম পার্শ্বে চাপিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয়, ঘাড় ফিরাইলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; শ্বাস এবং রক্তবহা নালীগুলি কসিয়া টানিয়া রাখিলে বেক্রম হয়, ডাইন ব্লক প্রদেশের মধ্যে সেক্রম কসিয়া টানিয়া ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা ; কেবল শ্বাস টানিবার সময়ই কোমরের ডাইন পার্শ্বে কসিয়া বা বাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা (ব্রাই), চীৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে যাহা অধিক প্রবল হয় ; সন্ধ্যার সময় কোমরের পশ্চাৎ-দেশে এবং পায় হৃর্কল বোধ, যাহার দরুণ চলিতে বা নড়িতে ইচ্ছা হয় না ।

**অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি ।** সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের জ্বর ছিঁড়িয়া ফেলা বা কসিয়া ধরার জ্বর প্রবল বেদনা (ব্রাই, লেডাম্, লাইকোপ্, মার্ক্) । জুঁ দিয়া কসিয়া আঁটিয়া রাখিলে বেক্রম হয়, কুঁচকির সন্ধিতে সেক্রম বেদনা যাহা উর্দ্ধদিকে কোমর এবং নিম্নদিকে পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; বাম কুঁচকির সন্ধিতে এবং ডাইন পার্শ্বে কসিয়া ধরা, স্পন্দন করার ন্যায় দপ্-দপিয়া বেদনা ; সোয়াস মাগ্‌গ্‌নাস্ নামক পেশী খাট হইলে বেক্রম হয়, চলিবার সময় ডাইন উর্দ্ধতে সেক্রম বেদনা বা যাতনা ; ডাইন উর্দ্ধতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; বাম পায়ের ডিমে খিল ধরা ; বাম পায়ের পাতায় কসিয়া ধরার ন্যায় কন্‌কনানি ।

জ্বর । সমুদয় শরীরে শীত বোধ ; রাহিক শুষ্ক উষ্ণতা ; রাত্রিতে মুত্রের গন্ধেব ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট বর্ষ্য হওয়া ।

ব্যবহার । রাগ জনিত অসুখ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রাগ থাকা ; উদরাময় ; রক্তমাশয় ; শূল বেদনা ; খিল ধরা ; উরুর সন্ধির অসুখ ; শ্বাসশূল, প্রধানতঃ মুখ মণ্ডল এবং সার্বেটিক্ স্নায়ু শূল (Sciatica) ; জীলোকের ডিম্বকোষের অসুখ (শ্বাস শূলের ন্যায়) ; পেণী এবং সন্ধিবাত ; ওলাউঠা ইত্যাদি অসুখে কলোসিস্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শোক, এবং রাগ জনিত অসুখ ; সন্ধির কঠিনতা বা উণা সঞ্চালনে অশক্তি ; সমুদয় শরীরে দন্দপানি (পাল্‌স্, জিক্) ; হাত পা সঙ্কুচিত হর ; শরীরের সমুদয় পেশীতেই কষ্টদায়ক খিল ধরার ন্যায় সঙ্কোচন (কুপ্রাস্) ; মুচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ঠাণ্ডা হয় ; সন্ধার সময়, বিশ্রামে বা শয়ন করিয়া থাকিলে, নড়াচড়াতে আহার বা পানের পর, রাগ হইলে অসুখের বৃদ্ধি এবং গুহ দ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণে (শূল বেদনা), কান্ধি থাইলে, ভাবাকু থাইলে, হাঁটু শুটাইয়া জড়সড় হইলে, প্রবল প্রচাপনে অসুখের উপশম ইত্যাদি কলোসিস্‌হর কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমুদয় বিশিষ্ট ঔষধ । কলোসিস্‌হর কার্য্যের সঙ্গে ডাইগনিয়ার কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক, ক্যামোমিলা, চেলিডোনিয়াম্, কফিউল্যাস্, গ্যাংগোজিয়া, নাক্সবমিকা, ষ্ট্রাকিসেপ্ত্রিয়া, বেগাডোনা, কষ্টিকাম্, চেলিডোনিয়াম্, কফিয়া, লাটিকেপেডিয়াম্, মার্কিউবিরাস্, পাল্‌সেটলা এবং ট্যানামের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাম্ফার, কষ্টিকাম্, ক্যামোমিলা, কফিয়া, ষ্ট্রাকিসেপ্ত্রিয়া ইত্যাদি কলোসিস্‌হর প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । অধিক নাত্রায় কলোসিস্‌ থাইয়া বিযাক্ত হইলে কুসুম কুসুম গরম হুদ, ক্যাম্ফার, ওপিয়াম্ ব্যবস্থা ।

ডাইলুশন বিচার । শ্বাসশূলে ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম ব্যবহার্য্য । শূল বেদনাতে লেপক ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া

থাকেন। হানিমান ২৪ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়া গিয়া-  
ছেন। ১ম, ২য় দশমিক ডাইলুশন এবং মূল আরোকও কেহ কেহ ব্যবহার  
করিয়া থাকেন।

## কোনিয়াম্ ম্যাকুলেটাম্,—কোনিয়াম্

(CONIUM MACULATUM,—CONI.)

ইউরোপের প্রায় সমুদয় স্থানের নদীর ধারে, বাগানাদির বেড়াতে এবং  
মাঠ ময়দানে এই গাছ জন্মিয়া থাকে। সমুদয় কাটা পাতা, ডাঁটা ইত্যাদি  
ক্লেফ্ স্পিরিটে নিশাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। অধিক  
মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে বিষাক্ত হইয়া জগত বিখ্যাত মহাত্মা সস্ক্রেটিসের  
মৃত্যু হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। গতি উৎপাদন শক্তির সহায়কারী স্নায়বিক  
মণ্ডলীর উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, বাহার দ্রুতগমনোন্মত্ত উৎপন্ন হইয়া  
থাকে। গ্রন্থির উপরও ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, বাহার দ্রুত গ্রন্থির  
বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা উৎপন্ন হইয়া উহার নির্মাণে পরিবর্তন হইয়া থাকে।  
এজন্যই গণ্ডমালা এবং কর্কট (Cancer) রোগে এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ  
ফল পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বয়সের অস্থি বিশেষ উপকার হওয়া এই ঔষধের  
একটি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। বৃদ্ধাঙ্গী অপেক্ষা বৃদ্ধ  
পুরুষের অস্থি ইহা অধিক উপকারী।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মানসিক অবসন্নতা (লাইকোপ্, প্লাটিনা, পাল্‌স্); সর্বদা  
চিড়্-চিড়্ করা (ব্রাই, কলোস্, নাল্-বম্); আপন বিষয়ে সর্বদা ভাবিয়া  
অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হওয়া এবং সকল বিষয়ে উদাসীনতা (ফল্-আস্); কোন  
প্রকারের মানসিক পরিশ্রম করিতে অশক্তি (জেল্‌স্, নাল্-বম্); অরণশক্তির  
হ্রাস বা বিনাশ (আনাকার্ড্, নেট্রাম্-মিউর, ক্রিয়াজ্, নাল্-মফ্); কার্য  
করিতে অনিচ্ছা (সাইক্লেমেন্, নাল্-বম্, ফস্); অত্যন্ত স্থূল বুদ্ধি, বাহার

স্বরূপ রোগী যাহা পড়ে সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না ; লোকের নিকট থাকিতে বা কাহার কথা শুনিতে অনিচ্ছা (ইগনেন্স্); ইচ্ছা চমকিয়া উঠার স্বভাব ।

মস্তক । মাথাঘোবা (আলাম্, অরাম্, বেল্, ত্রাট্, নাক্স-বম্), শয়ন করিয়া থাকিলে বা বিছানায় পাশ ফিরিবার সময় যাহাব অধিক উল্লেখ হয় (বেল্) ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেই মাথা ঘোবা (ত্রাট্) ; চলিয়া বেড়ানোর সময় মাথাঘোবা ; চক্ষুর ক্র এবং নাকের গোড়ায় অনবরত কেমন কেমন বোধ হয় ; কপালে সূঁচী বিধানের ন্যায় বেদনা যাহা কপালের মধ্যদেশ হইতে বহির্দেশে বিস্তৃত হয় ; প্রাতঃকালে এবং বেলা দুই প্রহরের সময় কপালে উক্ত প্রকারের বেদনা ; প্রাতঃকালে চলিয়া বেড়ানোর সময় মাথা ঘোবা, যাহাব দরুণ মনে হয় যেন মাথা অতিরিক্ত পূর্ণ রহিয়াছে এবং তদরুণ মাথা ফাটিয়া যাইবে ; মাথার ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; এক পেশে মাথাধরা (মাথ কপালিয়া মাথা বাথা) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা বমি বমি করা ; মাথার পশ্চাৎভাগে এবং ঘাড়ের ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা ; মাথার এক পার্শ্বে অবশ এবং ঠাণ্ডা বোধ ; কোন একটী বড় পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মস্তিষ্কের ডাইন অর্ধাংশে সেক্রপ অন্তর্ভুক্ত হয় ; ছুঁবী বিঁধাইলে যেরূপ হয়, নাকীর প্রত্যেকবাব স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে মাথাব পশ্চাৎভাগে সেক্রপ বেদনা ; মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া ।

চক্ষু । দৃষ্টিশক্তি হ্রাসিতা বা ত্রাস ; চক্ষুর হ্রাসিতা এবং চক্ষে উজ্জল আলোক অত্যন্ত লাগে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোবা ও সার্ভাসিক হ্রাসিতা যাহা চলিবার সময় বাহ্য এবং পায়ের অধিক অন্তর্ভুক্ত হয় ; নেদা করিলে যেরূপ হয়, চলিবার সময় সেক্রপ হেলিয়া চলিয়া পড়া ; চক্ষে জ্বালা-ভ্রভব (আস্) ; চক্ষুর পাতার বহির্দেশে জ্বালাভ্রভব ; চক্ষুর যেতাংশ হ্রিবজাবর্ণ ; একটী ভারি দ্রব্যের চাপ পড়িলে যেরূপ হয়, চক্ষের পাতার সেক্রপ ভাবি বোধ, যাহার দরুণ চক্ষু মেলিতে পারে যায় না (কষ্ট্, নেট্রাম্-অর্পে, নেট্রাম্-কার্প্, নেজা, ফাইনষ্ট্) ; দুমাইয়া পড়ার স্বভাব (নাক্স-বম্) ; সকল স্থানে চক্ষে এক বস্তু দেখায় না ।

কর্ণ । কানে টন্ টন্, গুন্ গুন্ এবং সৌ সৌ শব্দ হওয়া (চায়না, নাক্স-বম্, সালক্); কানের মধ্যে এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে স্থটী বিধানের ন্যায় অনুভূত হয় (কালী-কার্ক, গ্রাক্); কক্ষ ফেলিবার জন্ত নাক কাড়িলে কান যেন বন্ধ হয়; কানের মধ্যে রক্তের স্রাব লাল ঠৈল পড়ে ।

মুখগহ্বর । ঠাণ্ডা আহার বা পানীয় দ্রব্য খাইলে দাঁতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (আণ্টি-ক্লুড্, ক্যাক্-কার্ক, ষ্টাকিস্, সালক্); জিহ্বার পক্ষাঘাত হেতু ক্ৰথা বলিতে কষ্টানুভব (কষ্ট্, জেল্-স্, হায়োস্) বা কপা বলিতে একবারে অশক্তি (কষ্ট্, জেল্-স্, হায়োস্) ।

মুখমণ্ডল । তামাকু খাওয়ার পাইপের (Pipe) চাপ পড়িয়া ওষ্ঠের কর্কটরোগ (Cancer); ওষ্ঠ জালায়ুক্ত এবং শুষ্ক ও উষ্ণ হইলে খোঁচা বিধার স্রাব বেদনা বা যাতনা; রাত্রিতে মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল যাহা ডাইন পার্শ্বেই অধিক অনুভূত হয়; নিম্ন মাড়িহিত দাঁতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা গালের হাড় পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; গলার মধ্যে আঁটাবোধ; হ্রাস্তির নিম্নস্থিত গ্রন্থির ক্ষতি এবং কঠিনতা ।

পাকস্থলী এবং উদর । গলা দিয়া হর্গক্যুক্ত উদগার উঠা (আর্গিকা, আণ্টি-টার্ট, কাকিউলাস্, সিপিরা); টক উদগার উঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে জ্বালানুভব; উদরস্থ আহার দ্রব্যের স্বাদবিশিষ্ট উদগার উঠা (আণ্টি-ক্লুড্, ক্যাক্-কার্ক, চায়না, পালস্); প্রবল বমন; কক্ষির কাঠের ন্যায় পদার্থ বমন (সিকেল্); টক স্বাদ বিশিষ্ট পরিষ্কার জল বমন; ফিকা কটাবণের উগ্র স্বাদবিশিষ্ট তরল পদার্থ বমন, আহাৰের পর গলা দিয়া টক জল উঠা; পাকস্থলীতে প্রবল বেদনা; পাকস্থলীতে চাপিয়া ধরা, জালায়ুক্ত মোচড়ানের ন্যায় বা ছুঁয়া দিয়া কাটার স্রাব বেদনা (আস্, কাকিউলাস্); পাকস্থলীতে মধ্যে চড়্-চড়ানি এবং ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় টাটনি; পাকস্থলীর ডাইন অংশের ক্ষতি; পাকস্থলীতে আক্কেপিক বা চিন্‌চিন বেদনা (কলোস্, নাক্স-বম্) । যুক্ত প্রদেশে স্থটী বিধানের ন্যায় অনুভূত হয় (আস্, ক্যাক্-কার্ক, ব্রাই, ক্যালী কার্ক, সিপিরা); ছুঁয়া বিধাইয়া দিলে বেদন হয়, উদরে সেকপ বেদনা (মার্ক্);

উদরে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা, যাহা বুকের ডাইন পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; শুষ্কতার দ্বারা দূষিত বায়ু নির্গত হওয়ার পূর্বে উদরে কৰ্ত্তনবৎ বেদনা; উদরে চিন্তিনে বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন তরল ভেদ হইবে; সমুদয় যন্ত্রণাদি যেন নীচের দিকে সজোরে ঠেলিয়া নামিতেছে তল পেটে একরূপ অস্থিত হয়; সন্তান প্রসবের পর যেরূপ হয়, তলপেটে দেরুণ সঙ্কোচক বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারংবার বেগ বা কৌথ পাড়ার ইচ্ছা; উদরে গড়্‌গড়্‌ কল কল শব্দ হওয়া।

মল এবং মলদ্বার। কোষ্ঠবদ্ধ এবং বারংবার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না (অস্থী, লাইকোপ্, আনাকার্ড্, নাক্স-বম্); উদরস্থ অঙ্গীর্ণ অংশ দ্রব্যের কণা মিশ্রিত বেদনাহীন উদরাময় (চায়না); কঠিন মল মিশ্রিত তরল ভেদ (ল্যাকোপ্, নাক্স-বম্); প্রত্যেকবার দাণ্ডের পর অত্যন্ত দুর্বলতা এবং তদনুশরীরের কম্পন (কন্); শুষ্ক দ্বারে বারংবার সূচী বিঁধানের ত্রাণ বেদনা; মল ত্যাগের সময়ে শুষ্কের মধ্যে জ্বালা এবং উকাহুভব; মলত্যাগের পর অত্যন্ত দুর্বলতা এবং শরীরের কম্পন (বিরেট্-অ'ব্)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্র গাঢ়, সাদা এবং দোলাটিয়া (ফস-অ'স); প্রথম ও শেষের মূত্রভাগ (অস্থী, বোব'ক্স, কন্ অ'স); মূত্র ত্যাগের সময় ও উহার পর মূত্র নালীতে অত্যন্ত জ্বালাহুভব (একন্, অ'স্টি-টাট্); মূত্র গাঢ়িতে পড়িতে বন্ধ হয় এবং কতককণ বদ্ধ থাকিয়া আবার নির্গত হইতে আরম্ভ হয় (ক্রিমেটিস্); মূত্র ত্যাগের সময় মূত্র নালীতে কতনবৎ বেদনা; বৃদ্ধ বয়সে বা যৌবন কালে মৈথুন কার্যে অত্যাচার হেতু মূত্রকৃচ্ছ।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের স্ত্রীসংবাসের ইচ্ছা রহিয়াছে, অথচ পুরুষাঙ্গ খাড়া হয় না (আগ্নিকোপ্, আগ্ন'শ, বুক'স); জ্বালোকের নিকট বসিয়া আলোপ করিলে বা তাহার গার চাত দিলেও ধাতু নির্গত হয়; কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা হইলেই, (মনে কোন প্রকারের বিকারের ভাব হউক, আর না হউক) ধাতু নির্গত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গের মাংসের আবরণক চর্ম চুলকার; অণুকোষের ক্ষীণতা (একন্, আগ্ন'শ)। জ্বালোকের ঘোনি দ্বারের মধ্যে অত্যন্ত চুলকানি (ক্যা'ব্, শাক্); নিরমিত



সময়ের অনেক পূর্বে এবং অতি অল্প পরিমাণ রক্তঃস্রাব; কটীর আভ্যন্তর  
রক্তঃস্রাব; রক্তঃস্রাবের সময় জরায়ুতে হল ফুটানের জায় বেদনা বা যাতনা  
এবং শয়ন করিলে মাথাধোরা; সাদা উগ্র এবং ক্ষতকারক জালা উৎপাদক  
শ্বেত প্রদর নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরের পশ্চাৎভাগে পক্ষাঘাতের  
জায় দুর্বল এবং অবশবোধ; গড়ি, হৃদয়ের জায় শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ এবং  
উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে প্রসব বেদনাব জায় সঙ্কোচক বেদনা যাহা  
জরায়ুব হই পাশ্বে হইতেই আরম্ভ হয়; জরায়ুর কঠিনতা (অরাম্, কার্কো-  
আনিমেল্); ডিম্বকোষের কঠিনতা; স্তনের কঠিনতা; জরায়ু স্থান ব্রষ্ট  
হওয়া (Prolapsus uteri) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর কঠিনতা, উহাতে  
ক্ষত এবং শ্বেত প্রদর নিঃসরণ; জরায়ু প্রদেশে জালা, টাটানি বা চড়্‌চড়ানি  
এবং কনকনানি; ডিম্বকোষের প্রদাহ এবং কঠিনতা; রক্তঃস্রাব আরম্ভ হও-  
য়ার পূর্বে শ্বসন ক্ষীণ হয় এবং টাটায়; স্তন ছোট বা সঙ্কুচিত হয় (ম্যায়োড্)  
এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা; বাম স্তনে স্ত্রী বিধানের  
জায় বেদনা; গর্ভাবস্থায় ভয়ানক বমনোদ্বেষ্ট এবং বমন; স্তনে ফোঁড়া এবং  
উহাতে ছুরী বিধানের জায় বেদনা বা যাতনা; স্তন্যে স্তন্যের বৃদ্ধি হয় এবং  
তদনুগত স্তন অত্যন্ত টাটায় বা বেদনায়ুক্ত হয় এবং উহাতে আঙ্গুলের স্পর্শ-  
নের ভারও সহ হয় না। স্তনের কৰ্কট রোগ (Cancer of the Breast)।

শ্বাস যন্ত্র । কঠিনালীর কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে হামা দেওয়ার জায়  
স্বচ্ছন্দীর দরুণ অনবরত শুক কাশির উদ্ভব হয়; দিনের বেলা শ্বাস রাত্রি  
শয়ন করিলেই অত্যন্ত প্রবল আক্কেপিক শুক কাশি (হারোস্, পাল্‌স্,  
সিপিয়া); গর্ভাবস্থায় কাশি; চলিয়া বেড়ানোর সময় শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন  
হয়; গায়ের কাপড় যেন স্কন্ধ এবং বুকে একটী ভারি বস্তুর চাপা পড়ার  
জায় অনুভূত হয়; বসিয়া থাকিলে বক্ষাস্থি হইতে বুকের নখা দিয়া মেরু  
দণ্ড পর্যন্ত হঠাৎ ধাক্কা লাগার জায় অনুভূত হয়; প্রত্যেক বার নিশ্বাস  
টানিবার সময় বুকের ডাইন পাশে স্তনের বোঁটার নিকট স্থচী বিধানের  
জায় প্রবল বেদনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্প্); চলিবার সময় বুকে উক্ত প্রকারের  
বেদনা, হাত দিয়া প্রবল চাপ দিলে যাহার উপশম হয়।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎস্পন্দন; হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করিতে করিতে হঠাৎ

বন্ধ হইয়া আবার স্পন্দন করে (Intermittent Heart) (ডিলিট, ক্যালী-কার্ক); জ্বলাদি পানের পর প্রবল জ্বাশ্পন্দন; নাড়ী সকল সময় এক রকম থাকে না, অর্থাৎ কখন প্রবল ও দ্রুতগামী, কখন বা দুর্বল ও মৃদুগতিবিশিষ্ট এবং কখন বা একবারে অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে; মাইট্রেল ফ্লুও কপা-টের (Mitral Valve) বোধোচিত শক্তির অভাব।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন (ককিউল, জেল্‌স্, বার্ক, ট্রামন্); অঙ্গুণীর পশ্চাৎদেশের চুলকানি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকালনে অশক্তি, বাহার দক্ষণ রোগী চলিয়া বেড়াইতে পারে না; চলিয়া বেড়ানোর সময় উরুদেশের দুর্বলতা এবং কখন কখন কাঁপনি; বর্ণিবদ্ধ সকালনে কেড়্ কেড়্ শব্দ হওয়া; চলিবার সময় হাঁটুর সন্ধিত কেড়্ কেড়্ শব্দ হওয়া; পায়ের পাতা শীতল।

জ্বর। নাড়ী অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে এবং সাধারণতঃ মৃদুগতি বিশিষ্ট এবং পূর্ণ; প্রাতঃকাল এবং পূর্বাঙ্কে শীতবোধ ও উত্তার দক্ষণ বোধে থাকিবার ইচ্ছা; শরীর উষ্ণ এবং উত্তার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত প্রাণবিকতা; বর্ষ, নিদ্রাবিহীন হই বাহা অধিক হয়।

চর্ম। গ্রন্থির ক্ষীতি এবং কঠিনতা ও স্ফাব্য সময় উহাতে অত্যন্ত বেদনাভূতব; কাল্‌চে ক্ষত এবং উগ্র হইতে রক্তমিশ্রিত, দুর্গন্ধবৃক্ষ, পচাপর্দার স্তায় ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া পদার্থ বিশিষ্ট ক্রুপ নিঃসরণ; ককট রোগের ক্ষত (Cancerous Ulcers); গায় দানের স্তায় কলতানি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র (ক্যাঙ্কার্‌, ডাল্‌ক্, গ্রাক্)।

ব্যবহার। স্ত্রী বা পুরুষ মহাভ্রমের উচ্চা চরিতার্থ না হওয়া জনিত অস্থব; অতিরিক্ত ক্রো বা পুরুষ মগদাস জনিত অস্থব; গ্রন্থির অস্থব; পেঁত-লিয়া বাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার দক্ষণ অস্থব; গ্রন্থির কঠিনতা, দিব্বন্ধি অথবা উত্তার কঠিনতা বা হ্রাস; হিট্টিরিয়া; মনোরোগ (Hypochondriasis); গণ্ডালা (Scrofula); ককট রোগ (Cancer), (বিশেষতঃ স্তন্যের); আঘাত পাইয়া চক্ষু ছানি পড়া (Traumatic Cataract); পাবরি রোগ (Gravel); বটমূত্র (Diabetes); অজীর্ণ রোগ; বায়ুনল প্রস্রাব; হাঁপানি কানি; কনি-কক; পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগে কোনায়াস্ ব্যবহার্য।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।** ইহা বৃদ্ধ বয়সের অস্থখ বা হ্রস্ব-  
লভায় বিশেষ উপযোগী; অতিরিক্ত স্ত্রী বা পুরুষ সহবাস জনিত অস্থখ  
(ফস্-আস্) ; স্ত্রীলোকের স্তনের পাথরের ভায় কঠিনতা (ব্রাই, ফাইটোল্) ;  
রজঃশ্রাব আরম্ভ হওয়ার পূর্বে স্তনে বেদনা এবং টাটানি ; চলিতে চলিতে  
শরীর হঠাৎ চর্কল এবং অবসন্ন হইয়া পড়া ; প্রাতঃকালে বিছানায় শয়ন  
করিয়া থাকিলেও শরীর অবসন্ন হইয়া পড়া ; মৃতিকা পাণ্ডুরোগ (Chloro-  
sis) ; শীতবোধ, অত্যন্ত মুচ্ছাব ভাব, সংস্পন্দন, মুখমণ্ডল শিটা, রজঃরোধ  
এবং প্রচুর শ্বেত প্রদর ; গ্রন্থির ক্ষীতি এবং উহাতে টন্ টন্ করা বা স্ফটী  
বিধানের ভায় বেদনা বা যাতনা ; গণ্ডমালা এবং কর্কট রোগের ধাতু ; যে  
সকল শিশু বা ছোট বালক খালিকা অতি শীঘ্র শীঘ্র বড় হয় তাহাদিগের  
অস্থখ ; রাত্রিতে, বিশ্রাম কালীন, খাওয়ার সময়, শয়ন করিয়া থাকা কালীন  
অস্থখের বৃদ্ধি ; নড়া চড়া, প্রধানতঃ চলিয়া বেড়াইলে, অস্থখের উপশম  
ইত্যাদি কোনায়ামের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ ।** গতি উৎপাদক স্নায়ু মণ্ডলীর উপর  
কোনায়ামের কার্য কিউরেয়ার, ক্যালী ব্রোমেটাম্ (ব্রোমাইড্ অব্  
পোটাস্), জেল্‌সিমিয়ামের ভায় । গ্রন্থির উপর ইহার কার্য আয়োডিন্,  
হাইড্রাষ্টিন্ এবং স্যায়াইটা কার্বোনিফার ভায় । এতদ্ভিন্ন অস্ত্রান্ত বিষয়ে  
ইহার কার্য অ্যাসিনিক, বেলাডোনা, ক্যাকেরিয়া কার্ব্, ডিজিটালিস্,  
ডাল্‌কেমেরা, হায়োসায়ামাস্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াম্, নাইট্রিক্  
অ্যাসিড্, নাক্স'মিকা, কক্ষরাস্, রাস্টক্স্, পাল্‌সেটিলা, পিপিয়া, সাইলি-  
সিয়া, সাল্‌ফারের ভায় ।

**প্রতিষেধক ঔষধ ।** কফিয়া এবং নাইট্রিক্ অ্যাসিড্ কোনায়ামের  
প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

**ডাইলুশন বিচার ।** ডাক্তার আণ্ডার উড্ (Dr. Underwood)  
 বলেন, গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা, গণ্ডমালা, কর্কট রোগ, ক্ষত, অনিবার্য  
চর্মরোগ, স্তনের কোড়ার ভায় ক্ষীতি এবং বেদনা ও আক্ষেপ নিবারণের  
পক্ষে, আক্ষেপিক কাশি, ছপিংকফ, স্নায়ুশূল, কর্কট রোগ এবং বাতের  
বেদনা, কোরিয়া, কসেজকা মর্জার উত্তেজনা এবং অজীর্ণ ইত্যাদি অস্থখে

নিম্নক্রম (অর্থাৎ ৩, ৬, ১২) বিশেষ উপকারী। বৃদ্ধবয়সের অসুখ, পক্ষাঘাত  
সম্বলিত সংশ্রাশ রোগ, জ্বরী বা পুরুষ সহবাস জনিত অবসন্নতা, মুচ্ছা, যক্ষা  
কাশ এবং পক্ষাঘাতের পক্ষে ১২, ৩০ এবং ততোধিক ডাইলুশন বিশেষ উপ-  
কারী। লেখক ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহার করিয়া যথো-  
চিত ফল পাইয়া থাকেন।

## ড্রুসিরা রোটান্ডিফলিয়া,—ড্রুসিরা

(DROSERA ROTUNDIFOLIA,—DROS.)

ইউরোপের মধ্য এবং উত্তরাংশে ও ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারলণ্ডের  
কাদাবিশিষ্ট বা নিচুভাগে এই গাছ জন্মে। গ্রীষ্ম এবং শরতকালে ফুল-  
ফুটার সময় এই গাছ সংগ্রহ করিয়া কাটা অবস্থায় উহার সমুদয় অংশ লইয়া  
প্রকম্পিত হইবার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। নিউমোগাস্ট্রিক্‌ নার্ভ (Pneumogastric  
nerve) উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, বাহার দক্ষ হৃপিৎ কক বা আক্ষে-  
পিত হাঁপানি কাশির ন্যায় লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মন সর্বদাই অস্থির এবং অসুস্থ; রোগী এক বিষয় অনেক-  
ক্ষণ পড়িতে পারে না। অতএব সে বারম্বার এক বিষয় ছাড়িয়া অন্য  
বিষয় পড়ে। সর্বদা মনের উদ্বেগ এবং ভবিষ্যৎ বিপদ বিষয়ে আশঙ্কা ও  
মানসিক অবসন্নতা।

মস্তক। মাথায় চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, কপাল এবং গালের  
হাডে ব্যথা অধিক অত্যন্ত হয়; কপালের ডাইন পার্শ্বের চর্মে টাটানি  
এবং বেদনা।

নাসিকা। বারম্বার ঠাণ্ডি এবং উষ্ণ দ্রব কখন নাক দিয়া তরল  
শ্লেষ্মা নির্গত হয়, কখন বা শ্লেষ্মা একেবারেই নির্গত হয় না।

মুখগহ্বর। মুখ দিয়া ক্ষুদ্র পরিমাণে জলবৎ তরল লাগ পড়ে।

পাকস্থলী । কাবছার ঝিকা ।

হাইপোকণ্ডিয়া । উভয় হাইপোকণ্ডিয়াতেই সঙ্কোচক বেদনা, ষাটার দরুণ কাশিবার ব্যাঘাত জন্মে এবং কাশিবার সময় বোগী উক্ত প্রদেশে ছাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে বাধ্য হয় ।

মূত্রযন্ত্র । বারম্বার মূত্রতাগের ইচ্ছা এবং অতি অল্প পরিমাণে মূত্র তাগ, অনেক সময় মূত্র কোঁটায় কোঁটায় নির্গত হয় ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বাস টানবার সময় কণ্ঠনালীতে মোচড়াইয়া পড়ার ছায় বেদনা ; স্বরভঙ্গ এবং অত্যন্ত মৃদুস্বর (কার্কো বেজ্, কষ্ট্, ফস্) ; গলার মধ্যে অত্যন্ত কষ্টানুভব এবং প্রত্যেকবার কথা বালবার সময় গলার মধ্য সঙ্কচিত হয় ; চলিবাব সময় শ্বাসকষ্ট হয় না ; কথা বলিলে বুক এবং গলার মধ্যে অসুখেব লক্ষণাদিব বৃদ্ধি (কষ্ট্) ; ক্রমাগত কাশিব আক্রমণ, যাহার দরুণ বোগী নিশ্বাস ফেলিবার সময় পায় না ; রাত্রিতে কাশি ; সন্ধ্যার সময় শয়ন করিবার পূর্বে কাশির উদ্রেক ; শেষ রাত্রি ২টার সময় জাগিলেই কাশিব উদ্রেক (আমন্-কার্ক্, ক্যালী-কার্ক্), শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনের ইচ্ছা ; কাশির সময় এবং উহার পর উদরস্থ আহাব দ্রব্যাদি বমন (আন্টি-টার্ট্, ইপিলাক্) ; কাশি এবং গলাদিয়া পুষ বা রক্ত মিশ্রিত পুষ নির্গমন (চায়না, লাইকোপ্, ফস, প্লাসাম্, সিপিয়া, সাই-গিসি) ; মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ এবং কোমল তালুকায খণ্ডখণ্ডে, টাচিয়া ফেলার ছায় বা শুষ্কানুভব, যাহার দরুণ খুশ খুশে কাশির উদ্রেক হয় এবং গলা দিয়া হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হয় (পাল্‌স্) এবং স্বরভঙ্গ ও মোটা বা গভীর স্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুক অঁটা বোধ বা কষ্টানুভব ; কথা বলিবার সময় মনে হয় যেন বকের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করে না, যাহার দরুণ বোগী শ্বাস ফেলিতে পারে না ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । সমুদয় অঙ্গে অবশ এবং অসাড় বোধ, মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁতলিয়া যাওয়ার ছায় অনুভূত হয় ; যে ভাবেই থাকা যাউক না কেন হাত পায়েব পেশীতে চাপিয়া বা ঘাটিয়া ধরার ছায় বেদনা বা যাতনা অনুভূত হয় ; লম্বা হাড়ে চর্কনবৎ বা স্থতীবিধানের ছায় বেদনা বা যাতনা, সন্ধিতেই যাহা অধিক অনুভূত হয় ; সন্ধিতে স্থতীবিধানের

জ্বর যাতনা যাহা নড়াচড়াতে কম অনুভূত হয় এবং বিশ্রামকালীন অধিক অনুভূত হয় । কেবল বিশ্রাম কালীনই ডাইন স্বক্বেব স্পন্দন । ডাইন উষ্ণ এবং কুঁচকির সন্ধিতে অবশ বা অসাড় কারক বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের পাতার সন্ধিতে মোচড়াইয়া পড়ায় জ্বর বেদনা । চলিবার সময়ই যাহা অধিক অনুভূত হয় ; বায় উত্তর ঠিক মধ্যভাগেব সম্মুখের অংশে কখন কখন স্টি-বিধানের জ্বর অনুভূত হয় ; ডাচন পায়ের ডিম্ব কঠিনবৎ তীক্ষ্ণ স্ফুটাবিধানের জ্বর প্রবল বেদনা, বসিয়া থাকিলে যাহা অনুভূত হয় এবং চলিয়া বেড়াইলেই যাহা থাকে না, মচকাইয়া গেলে বা স্থানান্তর হইলে স্বেদন হয়, কেবল চলিবার সময়ই পায়ের পাতার সন্ধিতে ছিড়িয়া ফেলার জ্বর সেরূপ বেদনা ; পায়ের পাতার সন্ধি শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ।

ব্যবহার । কেবল শ্বাসযন্ত্রেব, প্রধানতঃ উহার প্রয়োগনিহিত অশ্বখেই ডুসিরা বিশেষ উপকারী । স্বরভঙ্গ ( Hoarseness ) ; কণ্ঠনালী প্রদাহ ( Laryngitis ) ; হ্রিৎ কক্, হাপানি কাশি ; আক্ষেপিক শুক কাশি ইত্যাদি অশ্বখে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সমুদয় শরীরে চর্ক্সগবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু এবং গাল বসিয়া যাওয়া, চর্ক্সে কুটকটানি এবং আলাহুতব ; সমুদয় শরীরে জ্বর জ্বর শীত বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং হাত বরফের জ্বর শীতল, কিন্তু পিপাসা থাকে না ইত্যাদি ডুসিরার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আক্ষেপিক কাশিতে ডুসিরার কার্য্য হাইড্রোসায়েনিক আসিড্, নাইট্রিক আসিড্, বেলাডোনা, চেলেডোনিয়াম্, সিনা, কোরেলিয়াম্, কুপ্রাম্, হায়োসায়েনাম্, ইলিকাকিউএন, নাক্স-বমিকা, সাবুকাশের কার্য্যের জ্বর । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্য একোনাইট্, আমোনিয়াম্ কার্ক, ক্যাডবেরিয়া কার্ক, পাল্‌সেটিলা, রাস্টক্স, নাইনিসিডা, সাল্‌ফার এবং বিসেটাম্ আল্‌বামের জ্বর ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্‌ফার ডুসিরার প্রতিষেধক ঔষধ ।

ডাইলুশন বিচার । হানিমান ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিতেম । ডাক্তার কারি ( Dr. Curie ) মূল আরেক ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন ।

ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) ১ম ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। লেখক ১ম দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। হুপিং কফে অনেক সময় মূল আবেক এক ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহারে অমিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়।

### ডাক্তেমেরা,—ডাক্

(DULCAMARA,—DULC)

ইউরোপেব প্রায় সমুদয় স্থানের ভিজা বা আর্দ্র জঙ্গলা ভূমি এবং বেড়া-দিতে এই গাছ জন্মিয়া থাকে। ফুল দুটোবাব পূর্বে ইহার পাতা এবং কচি ডাটা সংগ্রহ করিয়া যথা নিয়মে প্রক্‌ স্পিরাটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ফ্রিয়া । শৈশবিক শিথী এবং পেলীব উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ হিম, ঠাণ্ডা বা বৃষ্টিদিনের আর্দ্র বাতাসাদি লাগিয়া যে সকল লক্ষণ বা অসুখ উৎপন্ন হয়, ইহা দ্বাবাও সে সকল লক্ষণ বা অসুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। চর্ম এবং লম্বিকা বা লিম্ফেটিক গ্রন্থি (Lymphatic Glands) উপরও ইহার কার্য আছে, যাহার দরুণ গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং কৌষিক অংশে দূষিত পদার্থের সঞ্চার এবং চর্মে ফুসুড়ী প্রকাশ পায়। শেতশেতিয়া ঠাণ্ডা বায়ুতে অসুখের বৃদ্ধি করা এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । কোন বস্তুর প্রকৃত নাম অথবা পড়ে না (লাটেকোপ্.); রাগান্বিত না হইয়াও ধমকাইবার ইচ্ছা; সর্বদা অস্থির এবং অধৈর্য্য; সর্বদা ঝগড়া করার স্বভাব (ব্রাই, কাম্, নাস্-বম্)।

মস্তক । প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথাঘোরা এবং মাথা কিম্বা কিম্বা করা ও চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার দেখা (সাল্ফ্), শরীর কম্পন এবং ত্রুণতা; মাথায় টিমাবোধ এবং মাথার কষ্টকর অবসন্ন বোধ; মাথায় ভারি বোধ; কপাল এবং কপালের হই পার্শ্বে হ্রদ করার স্তাব

বেদনা (কলোস্), বাতি হই প্রহরের পূর্বে এবং নিম্নক ভাবে শয়ন অবস্থা থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং কথা বলিলে যাহার উপশম হয়; কশালে বনন করার স্থায় বেদনা এবং মনে হয় যেন মস্তিষ্ক স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছে; মাথাব পশ্চাৎভাগে অবসন্নকারক বেদনা যাচা বাড় হইতে গ্রীবা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; মাথার পশ্চাদ্দেশে ঠাণ্ডাবোধ; মাথায় পুষ্ক খোঁসা বা চুমচী পড়ে, বাহ্যিক দক্ষণ চুল পড়িয়া যায় (গ্রাফ্, মার্ক্); মাথায় দাঁদের স্থায় গোলাকার কুসুড়ী।

চক্ষু । চিম ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষু প্রদাহ, চক্ষুর তারা অত্যন্ত বিস্তৃত।

কর্ণ । কানেব মধ্যে এবং কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থিতে স্তম্ভী বিধানের স্থায় বেদনা, কণ্ঠমূল।

নাসিকা । নাক দিয়া বস্ক পড়া; বস্ক উজ্জল লালবর্ণ (ইপিকাক্) ও উষ্ণ এবং নাকেব উপবিভাগে চাপা বোধ (একন্, হামামেনিস্); শুষ্ক সর্দি, ঠাণ্ডা বাতাসে বাতাস বৃদ্ধি হয়।

মুখমণ্ডল । টেটাব (Tetter, কুসুড়ী) বসিয়া বাইয়া মুখমণ্ডলের বন্ধনানি এবং হাঁপানি কাশ; মুখমণ্ডল, কপাল এবং টুটিতে কটার আভাবক হরিভাবণেব খোঁসা পড়া।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখে তক্ত বাদ; মুখগহ্বর এবং জিহ্বা শুষ্ক (এপিস্, আস্, ব্রাই, নাক্স-নক্, পলেন্স্); মুখে লাল সঞ্চিত হয় (একন্, মার্ক্, নাটটিক্-আস্); ঠাণ্ডা বাতাস বা ঠাণ্ডা লাগিলে জিহ্বা এবং মাড়ি অসাড় হয়, জিহ্বার পক্ষাঘাত (গ্রেগন্স, কল্, হায়োল্); ঠাণ্ডা লাগিয়া গলার মধ্যে বেদনা বা টাটান।

পাকস্থলী এবং উদর । অগারে অক্টি (অক্টি-কুড্, ককিউল্, ইপিকাক্); অত্যন্ত প্রবল পিপাসা এবং শীতল জলাদি পানের ইচ্ছা (একন্, আস্, ব্রাই); বমনোদ্বেষ্ট এবং সাদা চট্‌চটিয়া আঠা স্রোয়া বমন (অক্টি-টাট্, ইপিকাক্, লোবিলিয়া); পাকস্থলীতে পূর্ণবোধ এবং উদরে খালি বোধ; ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরে শূল বেদনার স্থায় বেদনা (মার্ক্, নাক্স-নক্); শূল বেদনা, যাহার দক্ষণ মনে হয় যেন উদরাময় হইবে (আগোজ্); উদর (Ascites); ঠাণ্ডা লাগিয়া কুষ্ঠিকর গ্রন্থের ক্ষতি (বাকী) (মার্ক্)।



**মল এবং মলদ্বার ।** সন্ধ্যার সময় বাহ্যের ইচ্ছা এবং তলপেটে কার্ভানির জ্বাৰ বেদনা হইয়া তৎপর প্রচুর পরিমাণে পাতলা, টকগন্ধযুক্ত মল ভেদ, বাহার দ্রুপ পেটের বেদনাদির উপশমন হয় বটে, কিন্তু রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে ; পর্যায়ক্রমে হরিত্রা এবং সবুজ তরল মল ভেদ ; ঠাণ্ডা লাগিলে যেক্রপ হয়, সেক্রপ হরিত্রাধর্মের জলবৎ তরল ভেদ এবং উষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকবার দাঁষ্টের পূর্বে উদরে ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বা কর্তনবৎ বেদনা (ক্যান্সাস) ; শেতশ্বেতিয়া বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া উদরাময় বা আমাশয় ; ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় : মল স্লেয়া, সবুজ-বর্ণ, জলবৎ এবং সাদাটিয়া ; উদরাময় এবং উষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে শূল বেদনা ; মল জলবৎ তরল, গ্ৰীষ্মকালে এবং বায়ু হঠাৎ ঠাণ্ডা হইলে যাগা অধিক হয় ; গায়ে কোন প্রকারের ফোটক রোগের কুস্কুড়ী বসিয়া যাইয়া, ঠাণ্ডা লাগিয়া বা শিশুগণের দাঁত উঠার সময় উদরাময় ।

**মূত্রযন্ত্র ।** মূত্রাধারের স্লেয়া জনিত রোগ (একন্, ক্যান্স) ; মূত্র-ত্যাগের সময় মূত্রনালীতে জ্বালাহুতব (একন্, আস্, ক্যান্স, কোনাডাম) ; মূত্র ঘোলাটিয়া এবং সাদা ; মূত্রে কখন লাল এবং কখন বা সাদা তলানি পড়ে ; মূত্র চূর্ণকায়ুত ; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্র ত্যাগ (আস্, বেগ, সিকুটা, হারোস্) ; মূত্রত্যাগে অত্যন্ত কষ্টাশ্রুতব (একন্, ক্যান্স) ; বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা বাহ্য উদরের প্ৰস্তীর প্রদেশেও যেন অনুভূত হয় ।

**জননেন্দ্রিয় ।** পুরুষের শ্বস্রভঙ্গ ; পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষাদিতে দাধের জ্বাৰ কুস্কুড়ী । স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবের পূর্বে গার এক প্রকারের কুস্কুড়ী বাহির হয় ; গোলে জলবৎ তরল রজঃস্রাব, ঠাণ্ডা লাগিয়া রজঃরোধ (মার্ক, পডোক্, সালক্, পান্‌স্) ; ঠাণ্ডা লাগিয়া সন্তান প্রসবের পর জরাস্থ হইতে ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হওয়া ; ঠাণ্ডা লাগিয়া রজঃস্রাব এবং জ্বনে দুইয়ের সঞ্চার বন্ধ হওয়া (একন্, মিনিসিক্, পান্‌স্) ।

**শ্বাসযন্ত্র ।** ঠাণ্ডা লাগিয়া শ্বাস কষ্ট এবং বুকের মধ্যে স্লেয়া সঞ্চিত হওয়া ; শ্বস্রভঙ্গ এবং কর্কশ শ্বস্র (কার্কো-বস্) ; বাত জনিত ফুফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ এবং ফুফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ সম্বলিত ফুফুস প্রদাহ (Pleuro pneumonia) এবং উষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া অতি কষ্টে

কঠিন বদরসের স্লেয়া নির্গমন ; বক্ষশোথ, ভিক্ষা বা আত্মবাতাসাদিতে বাহার বৃদ্ধি হয় ; কাশি এবং কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া উজ্জ্বল লাল রক্ত নির্গমন ; তরল আত্ম কাশি, ঘরের মধ্যে থাকিলে এবং বিশ্রাম কালীন বাহার বৃদ্ধি হয় ; বুকের মধ্যে প্রচুব পরিমাণে স্লেয়ার সঞ্চার (আন্টি-টাইট্, টপিকাক্, সাবুকাশ্) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান বার না, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কোমর সঞ্চালনে অশক্তি (সিমিসিফ্) ; কোমরের ডাটন পাখের গভীর অংশে কঠিনবৎ প্রবল বেদনা, চাপিলে বাহ্য কতকক্ষণের জন্ত একবারে থাকে না ; অনেকজন মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে সেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎ দেশে সেরূপ বেদনা (চারনা, পাল্‌স্) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । পক্ষাঘাতে সেরূপ হয়, বাহ্য বাহিতে সেরূপ মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁতলিয়া যাওয়ার জ্ঞান বেদনা ; ডাইন পায়ের টিব্রিয়া (Tibia) নামক হাড়ের বিবৃদ্ধি এবং পায় নীলের আভাবুক্ত লালবর্ণ দাগ পড়ে ও উহার স্থানে স্থানে পূঁয় সঞ্চিত হয় ; উরু দেশে হিঁড়িয়া কেলা বা কসিয়া ঘরার জ্ঞান বেদনা, চলিয়া বেড়াইলে বাহ্য থাকে না ও বসিলে বাহার পুনরায় উদ্ভেক হয় ।

চর্ম্ম । গাৰ টেটারের (Tetter) জ্ঞান কুস্কড়ী বাহ্য হইতে অনেক জ্ঞান কলতানি পড়ে এবং চুলকাইলে বক্ত পড়ে (মার্ক্, নাইটিক-আল্) ; সমুদয় শরীরে আমবাত বাতির চর (একন্) এবং উহা অত্যন্ত চুলকাই এবং চুলকাইলে অত্যন্ত আলা করে ; উহাশে উহার বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডাতে উপশম হয় ; সমুদয় শরীরে পুষ্ক, কটার আভাবুক্ত ত্রিজাবর্ণের খোলা (চুম্টি) পড়ে ; শরীরের স্থানে স্থানে বাটিয়া ঘরা এবং চুলকানি (শাল্‌ক্) ।

নিদ্রা । অস্থির নিদ্রা এবং নিদ্রা দ্বারা রোগী আপনাকে আপনি সহ মনে করে না (একন্) ।

জ্বর । শীত বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ঘাতনা ; শরীর সাধারণতঃ শুষ্ক এবং উষ্ণ ও উহাতে আলাহুভব (একন্, আল্, ব্রাই ; হুপ্‌কবুক্ত বর্ণ হয় (আর্গিক্, কার্কো-আনিমেল্, সাইলিদি) ।

**ব্যবহার ।** হিম ঠাণ্ডা বা আর্দ্র বাতাসাদি লাগিয়া বাত রোগ এবং স্নেহাজনিত অস্থি ; ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া গায় স্কেটিক রোগের কুকুড়ী বদিয়া বাওয়ার নরুণ অস্থি ; আর্দ্র বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া সকল প্রকারের অস্থি ; পক্ষাঘাত ; আমবাত ; টেটার (Tetter) ; দুগ্ধশোষা শিশুর গায় কুকুড়ী (Milk crust) ; শূল বেদনা ; উদরাময় ; শোথ ; মূত্র কোষের ট্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ ; মূত্রাধারের শ্লেষ্মিক রোগ ; হাঁপানি কাশি ; বায়ুনলের শ্লেষ্মিক রোগ . হৃপিং কফ ; গণ্ডমালা ; অস্থির বিবৃদ্ধি ; পারার অপব্যবহার জনিত অস্থি ইত্যাদিতে ডাল্‌কেমেরা ব্যবহার্য্য ।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।** ভিজা শেত শেতিয়া স্থানে বাস বা হিম, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া শ্লেষ্মিক বা বাত রোগ ; বহির্বাযু প্রত্যেকবার শীতল হইলেই অস্থির বৃদ্ধি ; শ্লেষ্মিক ঝিল্লী এবং গ্রন্থির নিঃসরণের আধিক্য ; আর্দ্র বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া ঘর্ম্ম বদ্ধ হওয়ার নরুণ শোথ ; কোন প্রকার স্কেটিক রোগের স্কেটিক বদিয়া যাইয়া পক্ষাঘাত ; হিম ঠাণ্ডা লাগিয়া পক্ষাঘাত ; রাত্রিতে, বিশ্রাম কালীন (আমন্-কার্প, রডোডেণ্ড্রন, রাস্-টন্স), ঠাণ্ডা বাতাসে, আর্দ্র বাতাসে এবং বহির্বাযু হঠাৎ ঠাণ্ডা হইলে অস্থির বৃদ্ধি ; বলা অবস্থা হইতে উঠিলে, নড়াচড়াতে, উচ্চতা এবং গুরু বাতাসে অস্থির উপশম । চর্কিবৃদ্ধ চোপ্‌সা মোটা শরীর, গণ্ডমালা, খাতু, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দি লাগা ইত্যাদি ডাল্‌কেমেরার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ ।** ডাল্‌কেমেরা এমন একটা বিশেষ প্রকৃতির ঔষধ যে ইহার সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না । তবে কোন কোন বিষয়ে ডাল্‌কেমেরার কার্যের সঙ্গে একোনাইট্, আদিনিব, বেলাডোনা, ট্রাইওনিয়া, সিমিসিফিউগা, লাইকোপডিয়াস্, নাইট্রিক্-আসিড্, পাল্‌সেটিলা, রাস্-টন্স, সিলিয়া, সাল্‌ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে এরূপ বলা যাইতে পারে ।

**প্রতিষেধক ঔষধ ।** ক্যান্‌ফার, কুপ্রাম্, ইপিকাকিউএনা, মার্কি-উরিয়াম্ ইত্যাদি ডাল্‌কেমেরার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

**ডাইলুশন বিচার ।** ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই অধিক ব্যবহৃত হইয়া

থাকে। ডাক্তার অ্যাণ্ডারউড (Dr. Underwood) বলেন যে কুকুসের পুরাতন ত্রৈমাসিক রোগ, ক্ষুদ্র সন্ধিবাত জনিত অস্থব, কোন অস্থব দ্বারা শরীর একবারে রক্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িলে এবং নানা প্রকারের চর্ম রোগে নিম্ন ডাইলুশন (১ম হইতে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত) দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। চক্ষু প্রদাহ, আক্কেপ (Convulsions), পাকস্থলী এবং অন্ত্রের উত্তেজনা এবং শরীরের নানা অংশের পক্ষাঘাতে উচ্চ (৩০ ও ততোধিক) ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। আমরা এতদ্দেশে ৬ এবং ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই বর্ণোচিত ফল পাইয়া থাকি।

### ইউফ্রেসিয়া অফিসিনেলিস,—ইউফ্রেস্ ।

(EUPHRASIA OFFICINALIS,—EUPHR.)

চক্ষুর ছোঁতি এবং তেজ বৃদ্ধি করে বলিয়াই বোধ হয় ইংবেলী ভাষায় ইংকে চক্ষু উজ্জলকারী (Eye bright) বলিয়া থাকে। ইউরোপ এবং আসিয়ার মাঠ মরদ্বানে এই গাছ জন্মে। ইংলণ্ড, আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে এই গাছ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। জুলাই মাসে এই গাছের সমুদয় অংশ সংগ্রহ করিয়া মদ্যনির্দনে প্রকৃষ্টপরিট দ্বারা ইহার মূল আরোক্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । গ্যাংলিয়োনিক সিস্টেম (Ganglionic system of nerves) দ্বারা ইহা ত্রৈমাসিক বিদ্যুত উপর কার্য করিয়া থাকে। চক্ষু, চক্ষুর পাতা এবং ষোল্ল যন্ত্রের উপর ভাগের ত্রৈমাসিক বিদ্যুত উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, বাতাব দরুণ উপর প্রেরা জনিত প্রদাহ হইয়া চক্ষু, নাসিকা চর্মেতে প্রচুর জল পড়ে। চক্ষু এবং নাসিকা দ্বারা প্রচুর জল পড়া সম্বলিত রোগ উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি প্রধান প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

বস্তুক । বাগায় মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁচলিয়া বাগড়ায় ভাষ

বেদনা বা গাতনা (জেন্স্); কপালে ঘৃণ্বশ্বে বেদনা (হাইড্রাষ্ট্, ক্যালী-  
ট্রাইক্রম্, নাক্স-ইম্, পাল্‌স্)।

**চক্ষু।** চক্ষে আলা এবং চক্ষুদিয়া জল পড়া (আস্); চক্ষে চাপা-  
যোথ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া জল পড়া; চক্ষে বারবার আলাভূতব  
এবং কামড়ানী; চক্ষু দিয়া আলা উৎপাদক জল পড়া এবং উহার দক্ষণ  
যেন চক্ষু কামড়ায় এরূপ অশুভূত হয় (আস্, মার্ক্-কর); চক্ষে আলা এবং  
চুলকানি, বাহার দক্ষণ রোগী বারবার চক্ষু টিপিতে (পাজলাইতে) এবং চক্ষু  
মুছিতে বাধ্য হয় (ক্লোকাশ্, পাল্‌স্); চক্ষুর পাতা লালবর্ণ এবং আলা-  
যুক্ত; চক্ষুর পাতার ধার (প্রান্ত) ক্ষীত (মার্ক্-কর, সাল্‌ক্); বারবার চক্ষু  
টিপনেব (পাঙ্‌লানের) ইচ্ছা (ক্লোকাশ্); চক্ষুব পাতা ক্ষীত এবং উহাতে  
অত্যন্ত বেদনা বা টাটানি; চক্ষু দিয়া অনন্তরত প্রচুব পরিমাণে ক্ষতকারক  
জল পড়া, বাহার দক্ষণ রোগী অক্ষকার দেখে বা চক্ষে দেখিতে পার না (মার্ক্-  
কর); একখানি পাতলা কাপড়ের মধ্য দিয়া তাকাইলে যেরূপ হয়, সন্ধ্যার  
সময় চক্ষে সেরূপ স্থাপ্সা দেখা (কষ্ট্, মার্ক্, পিটোল্, পাল্‌স্, সাল্‌ক্);  
অধিক পরিমাণে কেতুর (শ্রম্মা) সঞ্চিত হইলে যেরূপ হয়, চক্ষের কর্ণিয়াতে  
(Cornea) সেরূপ অশুভূত হয়, বাহার দক্ষণ রোগী চক্ষু বুজিয়া চক্ষুর পাতা  
চাপিতে বাধ্য হয় (ক্লোকাশ্, পাল্‌স্); আলোক পানে তাকাইলে অত্যন্ত  
কষ্টোভূতব বা চক্ষে আলোক সহ্য হয় না (Photophobia) (একন্, বেল্,  
মার্ক্); চক্ষুব কর্ণিয়াতে (Cornea) দাগ পড়ে, ক্ষত হয় এবং ফোড়া পড়ে  
(মার্ক্, সাইলিসি); চক্ষুব উপর দিয়া যেন এক গাছি চুল ঝুলিয়া পড়িয়া  
রহিয়াছে এরূপ অশুভূত হয়, বাহার দক্ষণ বারবার চক্ষু মুছিয়া ফেলার  
ইচ্ছা হয়।

**নাসিকা।** নাক দিয়া প্রচুব পরিমাণে (সিপা) ক্ষতকারক শ্রম্মা  
নির্গমন (আস্, মার্ক্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া প্রচুব পরিমাণে  
জল পড়া এবং চক্ষে আলোক সহ্য না হওয়া, সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে বাহার  
বৃদ্ধি হয়; সর্দি না লাগিলে বা কোন প্রকারের দৃষ্টতঃ কারণ বাতীতক  
হাঁচি দেওয়ার ইচ্ছা (কাম্)।

**শ্বাস যন্ত্র।** সর্দি অনিত শব্দভঙ্গ (একন্, কার্কী-বেল্, হিল্-

মাল্ফ, কস) : চক্ষুনাশের উত্তেজনা, এবং উহার দ্রুত ক্রমশঃ উল্লেখ্য চক্ষুনাশ  
বক্ষ্যাহব নীচে কথিত্য ধরাব জাতি চাপাবোধ ; প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই  
কানি এবং বলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে শ্রদ্ধা নির্গমন ; ইচ্ছা করিয়া গল  
কেকুর দিনেই গল দিয়া প্রচুর পরিমাণে শ্রদ্ধা নির্গমন ; বাসিয়া থাকিলে ও  
কীর্ষ নিষ্কাশ টানিতে অসমর্থ কষ্ট অস্বস্তি হয় ; বক্ষ্যাহব নীচে চাপিয়া  
ধরার কার বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের স্থানে স্থানে ঘাটিয়া ধরাব  
জার কথিত বেদনা

নিদ্রা । বহির্বিদ্যুত চলিয়া বেড়াইলে অসমর্থ হইতে উঠে ; ভয়  
খাইলে সেক্ষণে ভয়, বাহিরে বাসিলে সেক্ষণে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ।

বাবহার । সকল প্রকারের প্রোফ্রাটাইট হকর বোগ ; শিঃপীড়া ;  
চক্ষু বোজক কিলীর প্রদাহ (Conjunctivitis) ; নাসিকা এবং বায়ুনাল  
সম্বন্ধীয় সর্দি বা কৈশিক বোগ ; সর্দি জনিত জ্বর ; অন্ধতা এবং কর্ণির  
অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea, ইত্যাদি অন্তর্গত ইউক্লেশিয়া বাবহার্য্য ।  
ডাক্তার আলেন (Dr. Allen) এবং ডাক্তার নটন (Dr. Norton) বলেন  
যে "চক্ষুর অন্তর্গত, ইহা এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । চক্ষুর  
বোজক কিলীর অন্তর্গত চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে উত্তাপ এবং জ্বালা উৎপাদক  
জল নির্গমন এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।  
ঔষধী আবেশ বলেন যে তিনঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষু গতি উৎপাদনের সহায়-  
কারী ঔষধ পক্ষ্যাহবের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী । যে প্রকার অন্তর্গত চক্ষু  
দিয়া গাঢ় জল পড়ে তাহাতে ইউক্লেশিয়া এবং বাহ্যেতে উত্তাপ অপেক্ষা কম  
পাচ্ছ জল পড়ে তাহাতে আর্দ্রানিক এবং মার্কিউরিয়াল বাবহার্য্য "

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সকল অন্তর্গতই চক্ষু এবং নাক দিয়া  
জল পড়ে ; প্রাতঃকালে, বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে, ঘরের মধ্যে  
থাকিলে এবং সন্ধ্যার সময় অন্তর্গতের বৃদ্ধি ; বিছনা হইতে উঠিলে, ঘরের  
বাহির হইলে এবং আহারের পর অন্তর্গতের উপশম ইত্যাদি ইউক্লেশিয়ার  
কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগ্রণ বিশিষ্ট ঔষধ । ইউক্লেশিয়ার কার্য্যের সঙ্গে এথুজা,  
ওলিভিয়াম সপা, এপিস্ মেলিফিকা, অর্জেন্টাম্ নাইট্রিকাম্, আর্দ্রানিক,

হিপার সাল্ফিউরিস্, ক্যালী বাইক্রমিকাস্, ক্যালী আক্সোডেটাস্, মার্কি-  
উরিয়াম্ সলিউবিলিস্, মার্কিউরিয়াম্ ক্লোরাইডাস্, পাল্লেটিনার কার্বোর  
বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে  
বেলাডোনা, ক্যাল্ করিয়া কার্বো, নাক্স, বমিকা, কক্ষরাস্, সাল্ফার, মিশিয়া  
ট্র্যাডির কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

**প্রতিষেধক ঔষধ ।** ক্যান্সার এবং পাল্লেটিনা ইউফ্রেসিয়ার  
প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

**ডাইলুশন বিচার ।** হানিম্যান এই ঔষধের মূল আরোক ম্যাক-  
হাবের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন । এই ঔষধে ১ম, ২য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই  
আমবা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি । আবার কোন কোন চিকিৎসক  
ইহার ১০ এবং ২০০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

## জেলসিমিয়াম্ সেম্পারবিরেন্স্, - জেলস্

( GELSEMIUM SEMPERVIRENS, GELS. )

আমেরিকার দক্ষিণ দেশে এই লতা জন্মে । ইহার মূল বা শিকড় যথা-  
নিম্নে প্রক্ স্পিরিটে ডিফাইয়া ইহার মূল বা আদত আরোক প্রস্তুত হইয়া  
থাকে । অনেক গাছে এই ঔষধ জেলসিমিয়াম্ (Gelsemium) নামে  
উল্লিখিত হইয়াছে ।

**সাধারণ ক্রিয়া ।** গতিশক্তি উৎপাদনের সহায়কারী স্বল্প  
মাত্রার উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুন মস্তিষ্ক এবং কলেক্কা  
মজ্জার রক্তাধিকা বা বক্তাবোধে হইয়া সার্বাঙ্গিক বলহীন এবং স্বেচ্ছাপূর্বক  
এবং অনিচ্ছা পূর্বক সঞ্চালনার সহায়কারী পেশীর পক্ষাঘাত হইয়া থাকে ।  
রক্তাধিকালন অধিক হয়, মানসিক শক্তি লিপিল হয়, শৈথিল্য (খারী উদ্বেজিত  
এবং প্রদাহযুক্ত হয় এবং তদ্রূপ স্বপ্ন বিরাম জ্বর (Remittent Fever)  
এবং স্লেয়া জনিত জ্বরের লক্ষণাদি প্রকাশ পায় । স্নায়বিক মণ্ডলী  
অবসন্ন হইয়া নিদ্রাবোধ, অলসবোধ, সর্বদা নিস্তব্ধভাবে থাকা, সমুদর

যন্ত্রের বা ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত উত্তেজনা বা চেতনা উৎপাদন করা এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি যথো পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। কোন বিষয়ে চিন্তা করা বা মনোযোগ দেওয়ায় অশক্তি (এথুজা, সিমিসিক্, নাক্স-বম্, ফস্-আস) ; মানসিক শক্তির স্থূলতা (এইলাহ্, ব্যাল্ট্) ; সর্বদা চিড়্ চিড়্ করা এবং সহজে চট্টয়া উঠার স্বভাব ; একাকি থাকিবার ইচ্ছা (কলোস) ; অচেতনতা ; ঘুমেরষেবে প্রণাপ বলা ; অর্জ নিদ্রিতাবস্থায় অসংলগ্ন কথা বলা ; ক্যাটালপ্সির (Catalepsy) দ্বারা স্পন্দহীনতা, চকর ভাবা বিস্তৃত, চকু বুজিয়া থাকা, কিন্তু চেতনা বা জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় না ; মনের গোপমান ; উন্নাদ এবং উদার পরক্ষেপেই মানসিক অবসন্নতা (ল্যাক্)।

মস্তক। নেশা করিলে যেরূপ হয়, সেরূপ হেলিয়া উলিয়া পড়া ; মাথা কিম্বিক্ করা এবং উদার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে আঁসা বা আঁধার দেখা ; মাথার খালি বোধ এবং মাথা কিম্বিক্ করা, হঠাৎ নড়াচড়া বা চলিলে যাতার বৃদ্ধি হয় ; মাথার ভারিবোধ, প্রচুর মূত্রতাগের পর যাতাব উপশম হয় ; মাথার ভারি এবং চাপা বোধ ; মাথার পূর্ণবোধ এবং উদার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডলে উচ্ছানুভব এবং নীতবোধ ; মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, মস্তিকে সেরূপ অন্তর্ভূত হয় (হেলিওরাস্, নাক্স-বম্) ; মাথার পশ্চাৎভাগ, কর্ণের পশ্চাৎভাগ, গ্রীবার উপরিভাগে সজোরে টানিয়া দবার জ্বদি বেরনা বাচা স্বক পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; কর্ণের উপরিভাগ হঠাতে মস্তকের উপরিভাগ যেন এক গাছি কিতা দিয়া চাপিয়া বাধা বহিয়াছে একথা অনুভূত হয় (অস্টি-টাট্, কার্কো-আনিমেল্, চেলিডন্, কোকা, মার্ক্, নাটটিক্-খাস্) ; মাথার পূর্ণবোধ ; মুখমণ্ডলে উচ্ছানুভব ; নীতবোধ ; গ্রীবা দেশে ধম-নির মপ্পপানি ; কথা বলিবার সময় জিহবার ভারিবোধ ; মোচড়াইয়া পড়িলে বা পৌত্লিয়া গেলে শেপ্প হয়, মস্তিকে সেরূপ অন্তর্ভূত হয় ; মস্তকান করার সময় চক্ষুর গোলকে টাটানি ; মস্তক এবং কদমককা মজ্জাবরক জিহ্বা এণ্ডার (Cerebro-spinal meningitis) রক্তাধিকা বা রক্তাবরোধের অবস্থা, অন্তস্ত নীতবোধ ; চকর ভাবা বিস্তৃত, কদমককা এবং মস্তিকে



রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; মাথার উপরিভাগে চাপা বোধ বাহ্যি এত প্রবল হয় যে উহা স্বক্‌ পর্য্যন্তও অমুভূত হইয়া থাকে ; মাথার অত্যন্ত ভারি বোধ হয় ; মাথার স্বায়ত্ত্বের জায় বেদনা বাহ্যি প্রীবাদেশস্থ মেকবন্ডের উপরি ভাগে আরম্ভ হয় এবং বেদনা মাথার উপরিভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, বাহ্যি দরুন কপাল এবং চক্ষুর গোলাকে ফাটিয়া যাওয়ার জায় বেদনা অমুভূত হয়, পূর্ব্বাহ্ন ১০ টার সময় বা শয়ন করিয়া থাকিলে বাহ্যি বৃদ্ধি হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদেগ, বমন, শীতল বস্তু এবং পারের পাতা শীতল ; প্রাতঃ-কালে আঠারের পর মাথাবৃন্দাংশে গুল্মবুণে বেদনা, নড়াচড়া বা মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে বাহ্যি বৃদ্ধি হয় ; মাথাবরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা, মুচ্ছার ভাব এবং ঘাড় বেদনা ।

চক্ষু । চক্ষুর পাতা পড়িয়া যায় (কষ্ট, জিজ্ঞাস্য) ; চক্ষুর পাতার ভারি বোধ, বাহ্যি দরুন চক্ষু মেলিতে পারা যায় না বা মেলিতে পারিলেও চক্ষু আপনা আপনি ঘেন বুদ্ধিমা আইসে (কোনাম, নেট্রাম্-কার্ক, নেট্রাম্-আর্স, নেজা) ; চক্ষুর তারা বিস্তৃত (বেল, ইয়োস, ওপিয়াম্, ট্রামিন্) ; চক্ষে আঙ্গা দেখা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা ; চক্ষুর সমুদ্র ধূমের জায় কাপ্পা দেখা (সাইক্লোমেন, ফন্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা ; চক্ষে গোলমেলে দেখা ; অন্ধতা ; ঘাড় ফিরাইয়া বন্ধন দিকে তাকাইলে এক বস্ত্র ছুইটির জায় দেখায় ; কোন বস্ত্র পানে তাকাইলে চক্ষুর গোলক বারিম্বার চক্ষুর কোণ পানে সরিয়া পড়ে ; চক্ষে আলোক একবারেই গন্ধ হয় না (বেল) ।

কর্ণ । হঠাৎ কান বন্ধ হইয়া কণ্ঠকালের অল্প বধিরতা ; কানের মধ্যে নৌ নৌ শব্দ হওয়া (ককিউল, কাম্, লেডাম্) ; সন্ধিগ্ননিত বধিরতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্য হইতে কানের মধ্য প্রবেশ পর্য্যন্ত বেদনা ।

নাসিকা । নাসারন্ধ্রের মধ্যে জ্বালাহুতব ; ইটি দেওয়া ; নাসিকের মধ্যে টন্টনানি ; সন্ধি (একন্, মার্ক-কর, মাজুনেরিয়া) ; নাসিকার মূলে পূর্ণবোধ ; নাসারন্ধ্রের মধ্যে বেদনা বাহ্যি প্রীবাদেশ এবং কন্টাইহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল ভারি এবং অত্যন্ত যাতনার চিহ্নযুক্ত (ব্যাণ্ট),

লাল বর্ণ, উজ্জল এবং স্পর্শনে উষ্ণ (বাগ্‌পট্, বেল্, ওপিয়াম্); মুখমণ্ডলের পেশী শক্ত হয়; চক্ষুর কোটরের স্নায়ুশূল থাকিয়া থাকিয়া বাহ্যর উদ্বেক হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত পার্শ্বের পেশীর সংকোচন এবং স্পন্দন ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা গাঢ় লেপযুক্ত, হরিদ্রাঙ্গ আভাষিত সাদা, জিহ্বা অবলম্ব্য; জিহ্বা এত পুরুবোধ হয় যে উহার দ্রুত বোগী অতি কষ্টে কথা বলিতে পারে, অথবা একবারে কথা বলিতে পারে না; জিহ্বার আংশিক পক্ষাঘাত (কষ্ট, কানারাম্, হায়োস্); ওষ্ঠ শুষ্ক এবং কালচে শ্বেতা; দাঁত আবৃত; মুখে দুর্ভুজ; মুখগহ্বরের আলাহুত্ব বাহ্য গলার মধ্য এবং পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; ডেলার জ্ঞায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে গলার মধ্যে একপ অস্তিত্ব হয়; গলার মধ্য বেন পবিপূর্ণ রহিয়াছে একপ অস্তিত্ব হয় (ইউপেট-পাপূর, মেনমেন্, সাইলিদি)। গিলিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব; গিলিবার সহায়কারী যন্ত্রের পক্ষাঘাত; গিলিবার সময় কানের মধ্যে খোঁচা বিধার জ্ঞায় অনুভূত হয়; গলনালীর মধ্যে অক্ষেষ এবং খির্ন ধার জ্ঞায় বাহন; গলনালীর মধ্যে ডেলার জ্ঞায় কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে একপ অস্তিত্ব হয়, বাহ্যর দ্রুত বোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে; ডিপ্‌গিরিয়া; অরের সময় আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত টনটনি এবং পক্ষাঘাতের পূর্ন লক্ষণ ।

পাকস্থলী এবং উদর । পাকস্থলী এবং উদরে খালি এবং দুর্বল বোধ হাইড্রাট্, সিপরা, সাল্‌ক); পাকস্থলীতে পূর্ণ এবং আঁটবোধ, কালভের চাপা লাগিয়া বাহ্যর দৃষ্টি হয়; উক উপহার উঠা (নাইট্রিক্‌-অ্যাস্, নাক্স-বম্); বমনোবেগ । উদরের উপরিভাগে হঠাৎ আক্কেপিক বেদনা এবং তদ্রূপ বেদনা দ্বিগুণ সংলগ্ন উদরে সংকোচন বোধ, বাহ্যর দ্রুত বোগী চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠে; তিভা বা আত্মবায়ুতে অস্ত্রের প্রয়োগনিভ তরুণ প্রসার; আত্মিক জব বা অস্বিকারে দক্ষিণ প্রাণী প্রদেশে (Right-liae region) টাটানি বা বেদনা; উদর প্রাণীরে (Abdominal walls) অত্যন্ত বেদনা বা টাটানি ।

মল । হঠাৎ নান্দিক উত্তেজনা বা অবনমনতা, শোক, জ্বর এবং কোন প্রকার উত্তেজনার সংবাদ পাইয়া উদরাময় (ইগ্নেস্, কল্‌-অ্যাস্,

ওপিয়াম) ; কোন প্রকার অসাধারণ চর্খটিনায় আশঙ্কার দরুন উদরাময় ; শুষ্কতার সঙ্কটকে যত্নে পক্ষাঘাত হইলে ঘেঁষপ হয়, কোমল মলত্যাগ করার সময়ও সেদপ কষ্টক্লভব ; মল হরিদ্রাবর্ণ, মল সংযুক্ত, পিত্তযুক্ত, হৃৎকের কবের রক্ত বিশিষ্ট, কান্দার রক্ত বিশিষ্ট ; সবুজ মলত্যাগ ; শুষ্কতার সঙ্কটকে যত্নে পক্ষাঘাত (বেল, হায়োস্) ।

মূত্রযন্ত্র । প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার স্বচ্ছ মূত্রত্যাগ (কস্-আস্) বাহ্যতে মাথ ধরার উপশম হয়, মূত্রাধারের সঙ্কটকে যত্নে পক্ষাঘাত হেতু মূত্রধারণে অশক্তি বা অসাড়ে মূত্র নির্গমন (কষ্ট) ; স্বাভাবিক শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্রত্যাগ ; মূত্রাধারে আলোভূত এবং তরুণ বারবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা ও কৌথপাড়া বা শূণ (কাহ্, ক্যাম্প, মাক্-কর) ।

জননেদ্রিয় । পুরুষের অনিচ্ছা পূর্বক বা অসাড়ে ধাতু নির্গমন, বাহার পূর্বে কখন পুরুষাঙ্গ খাড়া হয়, কখন বা পুরুষাঙ্গ খাড়া হয় না এবং তৎপর অত্যন্ত তরুণতা এবং মানসিক অবসন্নতা (চাশনা, কস্-আস্) ; মল-ত্যাগের সময় অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক ধাতু নির্গমন । স্ত্রীলোকের জরায়ু প্রদেশে প্রসব বেদনার জ্বা প্রবল বেদনা বাহা পৃষ্টদেশ এবং উক পর্যন্তও বিস্তৃত হয় (সিমিসিফ্, সিকেল্) ; জরায়ুতে ভারিবোধ (নাক্স-বম্) ; কষ্টকর সঞ্চঃশ্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে আক্ষেপিক এবং স্নায়ুশূলের জ্বা বেদনা (সিমিসিফ্) ; রক্তঃরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ (ককিউল, নাক্স-মক্) ; গর্ভাবতার উদর এবং পায়ে খিলখিলা, এক বস্ত্র ছইটীর জ্বা দেখায় ; সর্বদা ঘূমের ইচ্ছা এবং কিমান (নাক্স-মক্) ; পেটীর শক্তির হ্রাস বা বিনাশ ; আক্ষেপ (বেল্, হায়োস্) ; নির্দিষ্ট সময়ে প্রসব বেদনা ভাল-রূপ হয় না বা একবারেই হয় না ; জরায়ুর মুখ বিস্তৃতরূপে খোলা থাকে অথবা উহার কোন ক্ষমতাই থাকে না (কলোফিলাম্) ; কৃত্রিম প্রসব বেদনা ; জরায়ুর মুখ কঠিন ছইরা থাকে বা খোলে না (বেল্, সিমিসিফ্, একনু, কলোফিলাম্) ; গর্ভাবস্থায় জরায়ুতে প্রবল বেদনা, মাথা ধরা ইত্যাদি ।

শ্বাসযন্ত্র । বায়ুনের উপরিভাগের আক্ষেপ হেতু রোগী কঁপক

তওয়ার উপক্রম হয়; অতঃপরে বেক্রম হয়; গলার মধ্যে সেক্রম থণ্ণণে বোধ; বুকের নিম্ন প্রদেশে আঁটাবোধ (ক্যাক্ট, কষ্ট, ইগ্নেন্স)।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপিণ্ড অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে; হৃৎস্পন্দন; এদিক ওদিক চলিয়া না যেড়াইলে রোগী (স্ত্রীলোক) মনে কবে যেন তাহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইবে; নাড়ী অত্যন্ত, কোমল, উর্বল এবং লুপ্তপ্রায় (একন্)।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবাদেশক পেশীতে বেদনা, ষ্টার্নো ক্লাইডো পেশীতেই (Sternocleidomuscle) এবং কর্ণমুখস্থ গ্রীবার পশ্চাদ্দেশেই বাহ্যিক অম্লভূত হয়; যেকদণ্ড হইতে মাথা এবং স্বল্প পর্য্যন্ত বেদনা; কসেক-কার রক্তাধিক্য বা রক্তাববোধ; অত্যন্ত বলহীন; অলসবোধ; পেশী-গুলিতে মোচড়াইবা পড়া বা ধেঁতলিয়া যাওয়ার ভায় অম্লভূত হয় এবং উহার স্বচ্ছা পূর্ব্বক কার্যের শক্তি থাকে না; লোকোমোটোর আটাক্সি (Locomotor ataxy); নিম্ন অঙ্গজের পক্ষাঘাত; কোমর এবং শুষ্কহারের ঠিক উপরিভাগে ঘূর্ণবলে কনকনানি বা বেদনা; রোগী চলিতে পারে না এবং তাহার স্বচ্ছাপূর্ব্বক পেশী সকলনের শক্তি থাকে না।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । সমুদয় অঙ্গের কাশনি (ক্যাক্টিল, কোনারাম); অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশীব গভীরতম অংশে একা সন্ধিতে কনকনিয়া বেদনা; হাত পায়ের দ্রাবুঙ্গ এবং বাতের বেদনার ভায় বেদনা (ব্রাই, সিনিসিক্, রাস-টয়)। সামান্য পরিভ্রমেই পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গে প্রাপ্তি বোধ; পায়ের পেশীব শক্তির হ্রাস বা বিনাশ, বাতের দরুণ রোগী উক্ত অঙ্গাদি স্বচ্ছা পূর্ব্বক সকলন করিতে পারে না।

নিদ্রা । অস্থির নিদ্রা; মনের অশান্তিজনক স্বপ্ন দেখা (হায়োস্); সার্বিক উদ্বেজনর দরুণ নিদ্রালুপ্ততা (বেল, ক্যাক্ট)। অত্যন্ত অলস এবং নিদ্রাবেশ বা বিদ্রাব, কিন্তু কোন মতেই ঘুম হয় না।

স্বপ্ন । প্রতিদিন অপরূপ দৃষ্ট হইতে টো পর্য্যন্ত শীতবোধ, অলস বোধ, হাত পা ইত্যাদিতে কনকনানি এবং প্রাপ্তি বোধ ও কনকনানি; হাত দিগাশীত আরম্ভ হয়; শীত পৃষ্ঠ দেশের নিম্ন দেশ হইতে উর্দ্ধদেশে বিস্তৃত হয় এবং হাত পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; মস্তক এবং মুখমণ্ডল উষ্ণ;

শরীর উষ্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ ; অলসবোধ, যাহার দরুণ হ্রস্ব ভাবে থাকিবার ইচ্ছা হয় ; প্রতি দিন এক নির্দিষ্ট সময়ে শীত বোধ, প্রাধানতঃ প্রাতঃকালে ; শীতের পর শরীর উষ্ণ হয় এবং তৎপর বর্ণ হয় ; বরকের অলে ভিজাইয়া রাখিলে বেরূপ হয়, পায়ের পাতা সেরূপ ঠাণ্ডা ; জাগতিক শীত কম্প এবং তন্দ্ররূপ দাঁতে দাঁতে খট্ খট্ শব্দ করা ; অর, কিন্তু উহাতে পিপাসা থাকেনা (পাল্‌স্) ; নাড়ী মৃদুগতিবিশিষ্ট, কিন্তু নড়িলে চড়িলেই ক্রতগামী হয় ; স্বল্প-বিরাম (Remittent) এবং আঙ্গিক অর বা অববিকার ও উহার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক লক্ষণের প্রাধান্য ।

বাবহার । কোন প্রকারের কুসংবাদ বা মনের উত্তেজনা উদ্দীপক সংবাদ পাওয়ার দরুণ অস্থখ ; ভয় পাইয়া অস্থখ (একন্, ওপিরাম্) ; কোন প্রকারের দুর্ঘটনা ঘটবে সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া অস্থখ ; অত্যন্ত দুর্বল কারক (Asthenic) অর ; স্বল্প-বিরাম অর ; সবিরাম বা পালাজর ; টাইফয়েড্ অর বা অর বিকার ; ফোটিক-অর ; যে প্রকার ফোটিক অরে আক্ষেপের ভাব থাকে, সে প্রকার অর ; যে প্রকার স্নায়বিক কিলীর অস্থখে অলবৎ তরল নিঃসরণ হয়, এবং পূর্বের ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয় না, সে প্রকার অস্থখ ; অকৃতা ; স্নায়ুশূল ; শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের স্বল্প বিরাম অর ; মৃগীরোগ ; আক্ষেপ ; পক্ষাঘাত ; হিষ্টিরিয়া ; লোকোমোটর অ্যাটাক্সী (Locomotor ataxy) ; স্নায়বিক শীত কম্প ; মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জাবরক কিলী প্রদাহ (Cerebro-spinal-Meningitis) ; কসেরুকা মজ্জা এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; কোরিয়া (Chorea) ; বাতরোগ ; পেশীবাত ; কঠকর বজ্রস্রাব এবং বাৎকের বেদনা (Painful menstruation) ; স্ত্রীলোকের ডিম্ব কোষের উত্তেজনা ; বিলম্বে বিলম্বে প্রসব বেদনার আক্রমণ বা যথোচিত পরিমাণে প্রসব বেদনা না হওয়া ; প্রসব বেদনা প্রবল হইলেও ভরাঘুর মুখ লক্ষ থাকে বা মুখ খোলে না ; কৃত্রিম প্রসব বেদনা ; গর্ভস্রাব ; সন্তান প্রসবের পর আক্ষেপ ; মূত্র ধারণে অশক্তি বা অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্র নির্গমন ইত্যাদি অস্থখে জেলসিমিয়াম্ বাবহার্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সমুদয় পেশীর বহুকক্ষ বা শিথিলতা

(সিমিসিক) ; কসেককার অবসন্নতার দরুণ সমুদয় শরীর যেন পাতলা বোধ হয়, বাঁহী হস্ত মৈথুনকারীগণই অধিক অস্থির করে ; হস্ত মৈথুনকারীগণের অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা এবং অত্যন্ত অলসবোধ ; তামাক খাইয়া মাথা ধরা ; ঠাণ্ডা মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা, উল্লাস, শোক, ভয় জনিত অস্থির ; অত্যন্ত দুর্বলতা এবং তদ্রূপ শরীর কম্পন ; স্নায়বিক ধাক্কা ; যুবা যুবতীর বা শিশু এবং ছোট বালক বালিকার অস্থির বিশেষ উপযোগী ; চলিয়া বেড়াইলে, বিছানার উচ্চতাতে, তামাক খাইলে, মদ খাইলে, রাত্রি জুই প্রভেদের পর, ডিঙ্গা বা শেহুগতিয়া বায়ুতে, বহির্লোকীয় পরিবর্তনে অস্থির বুদ্ধি ইত্যাদি জেলসিমিরামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ ।** জেলসিমিরামের কার্যের সঙ্গে কোন-রামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । স্বল্প বিরাম বা একজরে ইহার কার্য ঘাপ্টিসিয়ার ন্যায় । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য একোনাইট, বেলাডোনা, ট্রাইওনিয়া, কলিকাম্, সিমিসিকিউগা, চায়না, গুণিয়াম্, রাসটেল্, ট্র্যামোনিয়াম্ এবং বিরেট্রাম্ বিরাইডের ন্যায় ।

**প্রতিষেধক ঔষধ ।** চায়না এবং ককিয়া জেলসিমিরামের প্রতিষেধক ঔষধ ।

**ডাইলুশন বিচার ।** স্বল্প বিরাম বা একজরে ১ম দশমিক ডাইলুশন বিশেষ উপকারী । ফিট্রিয়া, কোরিয়া, ধমুঠকার, সন্তান প্রসব উপলক্ষে আক্ষেপ, স্নায়ুশূল, বিশেষতঃ শ্বস মস্তলের স্নায়ুশূল, শিশুগণের দাঁত উঠার সময় উত্তেজনা জনিত অস্থির, মস্তিষ্ক এবং কসেককা মজ্জার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ইত্যাদিতে ১ম চইতে ৬ষ্ঠ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী । পক্ষাঘাত (সার্কান্সিক এবং স্থানিক) এবং তজ্জনিত অস্থির ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী । পুরাতন আকারের স্নায়বিক শিরঃশীড়ার এই ঔষধের ২০০ ডাইলুশন, ১ কোঁটা মাত্রার ব্যবস্থা করিয়া, ৩টা যুবতীর চিকিৎসায়, একদিন অন্তর একদিন ১ যাত্রা, এই প্রকারে ২০ সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে ।

## হামামেলিস্ বাজিনিকা,—হামা

(HAMAMELIS VIRGINICA,—HAM.)

আমেরিকার আর্জ' ভূমিতে এই গাছ আছে। এই গাছের বাকল যথানিয়মে প্রেক্স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার গুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আদত গুঁড়াকে হামামেলিন্ (Hamamelin) বলে।

সাধারণ ক্রিয়া। শিরার (Veins) উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ শিরাশ ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি, শরীরের নানা অংশের শিরা সঞ্চীয় (Venous) রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, রক্তস্রাব এবং শিরার যান্ত্রিক অস্থূল উপর হইয়া থাকে। গুহ এবং জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার বিশেষ কার্য দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার হেল্ (Dr. Hale) বলেন যে “ধমনির উপর একোনাইট বেরুপ কার্য করে, শিরার উপর হামামেলিস্ সেরুপ কার্য করিয়া থাকে। শিরার গতি শক্তি শাসনকারি দ্রব্যের আক্কেপ উৎপাদন করা হামামেলিসের এক মুখ্য (Primary) কার্য মধ্যে পরিগণিত। ইহা শিরাগুলিকে উত্তেজিত করিয়া উহার আবরণকে এত অধিক আক্ৰমণ করে যে উহার দরুণ প্রকৃত প্রদাহ না হইলেও উহার এমত অবস্থা আনয়ন করে যে উহা হইতে শিরা ভবিষ্যতে প্রদাহযুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে। প্রতিক্রিয়াতে আক্রান্ত স্নায়ুগুলির সামান্য রক্তমের পক্ষাঘাত হয় এবং তদরুণ শিরার আবরণের পক্ষাঘাত হইয়া শিরাশ ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি, শিরাসঞ্চীয় রক্তাবরোধ এবং শিরার যান্ত্রিক অস্থূল হইতে পারে।” শিরা সঞ্চীয় রক্তস্রাব আনয়ন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা গুণ মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। অর্ধজ্ঞান রহিততা (Stupor); শিরঃপীড়া; মস্তক, গ্রীবা এবং কপালে পূর্ণবোধ; জু অঁটিয়া রাখিলে-বেরুপ হয়, কপালের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সেরুপ অঁটিয়া রাখার ভ্রায় অহুত হয়।

নাসিকা। নাক দ্বিধা রক্ত পড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাকের

গোড়ায় আঁটাবোধ এবং কপালে, হুই চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে, চাঁপাবোধ (একন্, ডাক্) ; নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া গেলে মাথার অস্থির অনেক উপশম হয় ; নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব (একন্, বেল্, চায়না), রক্ত কাল্চে ; আপনা আপনি, বা রক্তঃরোধ হওয়ার দরুন নাক দিয়া রক্ত-স্রাব (Vicarious Menstruation) (ব্রাই, পাল্‌স্, সিপিয়া) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মাড়ি ফীত এবং উহা হইতে সহজে রক্ত পড়া (মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্) ; দাঁত তুলিয়া ফেলার পর দাঁতের গোড়া দিয়া কাল্চে রক্তস্রাব (অ্যাস্) । তালুকরে উই পাথ্যস্থিত গ্রন্থিগণ (Tonsils) এবং মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; শির গুলির বিবৃদ্ধি এবং উহার ফীতি ও বিস্তৃতি ।

পাকস্থলী । পাকস্থলী হইতে কাল্চে রক্ত উঠা (রক্তবমন, Hematemesis) ; শরীর কম্পমান, উর্কণ, ঠাণ্ডা এবং নাকী ফুটগামী ও প্রচুর বর্ষ (অ্যাস্) ।

মল এবং মলদ্বার । রক্তস্রাবক অর্শরোগ (Bleeding Piles) (নাইট্রিক্-অ্যাস্, কাইটোল্) ; গৃহবার দিয়া অধিক পরিমাণে কাল্চে রক্ত নির্গমন (ইউকেলিপ্ট) ।

মূত্রবস্তু । মূত্রনাগীতে অত্যন্ত জ্বালা হওয়া তৎপব অল্প পরিমাণ মূত্র নির্গমন এবং বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা ; মূত্রকোষে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হেতু রক্ত মূত্র ত্যাগ (Haematuria) (অ্যাস্, ক্যাস্, কল্‌চ্, ফস্) ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের অণ্ডকোষে প্রবল ব্যাধিশূল ; বেদনা শুক্র-নিঃসারক সূত্র বা নালী (Spermatic Cord) দিয়া (বাবেবিস্) অণ্ডকোষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (মার্ক্) ; এক শিরার ব্যাধ্যম (Orchitis) (পাল্‌স্) ; অণ্ডকোষের ফীতি এবং উহাতে অত্যন্ত টাটানি ; শুক্র নিঃসারক সূত্র বা নালী বা অণ্ডকোষাধারেব শিরার ফীতি (Varicocele) ; কোরগু (Sarcocoele) । স্ত্রীর হইতে উজ্জ্বল লাল রক্তস্রাব (একন্, ইরিজারগ্, বেল্, মিলিকলিয়াম্) ; স্ত্রীর হইতে অধিক পরিমাণে কাল্চে রক্তস্রাব ; যোনি-ধারের আক্ষেপ (প্রাথাম্) এবং অত্যন্ত টাটানি ; যোনিতে চুলকানি



(কাহ্ন); রক্তস্রাবের সময় যোনিদ্বার দিয়া রক্তস্রাব না হইয়া নাকাদি দিয়া রক্তস্রাব (Vicarious Menstruation) (ব্রাই, পাল্‌স); ডিম্বকোষে বেদনা এবং টাটানি (এপিস্, বেল্‌, সিমিসিক্); পায়ের শিরার সাদা-ক্ষীতি (Phlegmasia alba dolens)।

শ্বাস যন্ত্র । রক্তোৎকাশ (Hæmoptysis) (একন্, চারনা, ফেরাম্, মিলিফনিয়াম্, সাবাডিলা, সানক্-আস্); খুৎ-খুশে কাশি এবং উগার সঙ্গে সঙ্গে মুখে রক্ত বা গন্ধকের স্বাদ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শিরার ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি (পাল্‌স, জিক্) এবং ক্ষত ও উচ্চাতে হুল ফুটানের জ্বায় বেদনা বা কুট-কুটানি; হাত পায়ের শিরার প্রদাহ এবং ক্ষীতি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হ্রস্বগতা এবং উচ্চাতে অবশ্যবোধ; হাত পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বায় নীলের আভাযুক্ত ক্ষত।

বাবহার । শরীরের সমুদয় অংশ বা যন্ত্র হইতে কাল্‌চে (Venous) রক্তস্রাব; শিরার ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি; শিরার প্রদাহ এবং ক্ষীতি; পায়ের শিরার সাদা ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি (Phlegmasia alba dolens); রক্তস্রাবক অর্শরোগে (Bleeding Piles); জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব; যোনি-দ্বারের আক্ষেপ; ডিম্বকোষ প্রদাহ; একশিরার ব্যারাম (Orchitis); অণ্ডকোষের দারুণ অস্ত্রথে হামামেলিস্ বাবহার্য্য। ডাক্তার লাড্‌ল্যাম্ (Dr. Ludlam) বলেন যে স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ প্রদাহ এবং পুরুষের প্রমেহ জনিত একশিরার ব্যারামে হামামেলিসের আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। যোনি দ্বারের আক্ষেপে হামামেলিসের বাহ্য প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। ডিম্বকোষের উত্তেজনা হেতু কষ্টকর রক্তস্রাব এবং বাধকের বেদনায় হামামেলিস্ বিশেষ উপকারী। স্ত্রীলোকে প্রমেহ রোগে হামামেলিস্ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে বলিয়া অনেক চিকিৎসক বিশ্বাস করেন।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শিথাসমূহের অম্ল এবং কাল্‌চে রক্তস্রাব হামামেলিসের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । হামামেলিসের কার্যের সঙ্গে পাল্-

সেটিগার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্বিত্ত কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে ইপিকাকিউএনা, মিলিকলিয়াম্, বেলাডোনা, চায়না, ফেরাম্, সাল্‌ফিউরিক্‌ অসিড্‌ এবং টিলিয়ামের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ । পাল্‌সেটিলা ।

ডাইলুশন বিচার । তরুণ রক্তশ্রাবে ১ম দশমিক ডাইলুশন ব্যবহার্য। অত্যন্ত অল্পে ২ হইতে ১২ ডাইলুশন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তরুণ রক্তশ্রাবে অনেক চিকিৎসক মূল আরোক এক ফোঁটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বাহ্য প্রয়োগের জন্ত ৫ ফোঁটা মূল আরোক, ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া ব্যবস্থা।

## হাইড্রাষ্টিস্‌ ক্যানাডেন্সিস্‌,—হাইড্রাষ্টিস্‌

(HYDRASTIS CANADENSIS,—HYDR. CAN.)

ক্যানাডা, ওহিও প্রভৃতি আমেরিকার পার্শ্বতীর দ্বারা বিশিষ্ট জঙ্গলাভূমিতে এই গাছ জন্মে। মূল বা শিকড় বগা নিয়মে ঐক্‌ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মূল বা শিকড় অত্যন্ত উষ্ণ জলে ভিজাইয়া ইহার কাত (Infusion) প্রস্তুত হয়। ইহার আরোক উজ্জল পরিষ্কার বর্ণ।

সাধারণ ক্রিয়া । স্নৈমিক বিস্তার উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল। চক্ষু, নাসিকা, মুখগহ্বর, গলার মধ্য, গুহ, বোনিম্বার, অরারুণ প্রীথ বা মুখের চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থান এবং মূত্রথলের স্নৈমিক বিস্তার উপর ইহার কার্য অত্যন্ত অংশের স্নৈমিক বিস্তার অপেক্ষা অধিক প্রবল, বাহার দক্ষণ উষ্ণ অংশের স্বাভাবিক নিঃসরণ পরিমাণে বৃদ্ধি হয় এবং তৎপর উষ্ণ পরিমাণ এবং প্রকৃতি বিকৃত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ স্নৈমিক বিস্তার নিঃসরণ পরিষ্কার, সাদা, চট্‌চটিয়া আঠা এবং স্বচ্ছ থাকে এবং তৎপর উষ্ণ পরিষ্কার, সাদা, সবুজ এবং কখন কখন রক্তমিশ্রিতও হইয়া থাকে। জীবাণুদের মাধ্যম লইয়া টানিলে উহা সুতাব স্তার আকার ধারণ করে। এই

একর স্নেহের সঞ্চয় হইয়া আক্রান্ত বিল্লীতে ছাল উঠিয়া বাওরার স্তায় হইয়া উঠা হইতে পূর্বসংযুক্ত স্নেহা নির্গমন এবং উহাতে কতও হইতে পারে । আক্রান্ত অংশের রক্তবহা কৈশিক নালীতে (Capillaries) রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া প্রথমতঃ এই প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে । তৎপর এই অবস্থা রক্তের প্যাসিভ্ হৈম্যাটিক্সের পরিণত হয় এবং মৈত্রিক বিল্লীর গ্রন্থি উদ্বেজিত হয় । অবশেষে উহার অবসন্নতা এবং হ্রাসের দরুণ, নিঃসরণের উৎপত্তির মূল বিনষ্ট হইয়া আক্রান্ত মৈত্রিক বিল্লী শুষ্ক, চক্চকে এবং নির্মূল, কঠবৃত্ত হইয়া উহার কার্য্য করার শক্তি একবারে বিনষ্ট হইয়া থাকে । অতএব যে প্রকার অস্থূণে মৈত্রিক বিল্লীর উক্ত প্রকারের অবস্থা ঘেঘিতে পাওয়া যায় তাহাতেই হাইড্রাটিস্ ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে । চর্ম্ম এবং গ্রন্থির উপরও এই ঔষধের উক্ত প্রকারের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, বাহার দরুণ উক্ত যন্ত্রের প্রথমতঃ রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, উহার কার্য্যের অতিরিক্ত চাকল্য উৎপন্ন হইয়া তৎপর উহার জড়তা বা অবসন্নতার দরুণ আক্রান্ত স্থান উক্ত প্রকারের অবস্থা প্রাপ্ত হয় । অতএব হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা এণালীতে চর্ম্মের বিকৃত লালবর্ণ হওয়া, কঙ্গতানি বিশিষ্ট ক্ষুদ্রী, বিকচ (Eczema), ক্ষত এবং শরীরের নানা অংশের বা যন্ত্রের ক্ষত, দুর্বলতা বা জড়তাতে (স্থানিক বা সার্বাদিক) হাইড্রাটিস্ বিশেষ উপকারী ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সকল বিষয় জ্বলিয়া যাওয়া (বেল্, কাক্-কার্ক্, গ্রাক্, রাস্ টেক্স) ; যে বিষয় পড়া যায়, বা বাহার বিষয় কথা বলা যায়, তাহা স্মরণ থাকে না ; খিটখিট্ করা এবং চটিয়া যাওয়া ; সর্বদা জীবার ভাব (নাক্স-বন্) ।

মস্তক । নেমা করিলে ঘেঁরুণ হয়, সেরুণ অমৃত্ত হয় (জেল্‌স) ; মাথার সম্মুখদেশে ভারি বোধ এবং উহাতে ঘূশ্‌ঘূশ্‌ বেদনা ; সজ্জ্বলিত উক্ত প্রকারের মাথা বেদনা (ইউক্লেস্, পাল্‌স্, সাস্থ্‌নেরিয়া), হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে বাহার উপশম হয় ; মাথার সম্মুখ প্রদেশে ঘূশ্‌ঘূশ্‌ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশে এবং কোমরের পশ্চাৎদেশে ঘূশ্‌ঘূশ্‌ বেদনা ; শাক্-

স্থলীর অল্পখ জনিত বা স্নায়বিক মাথা ধরা ; মাথার সম্মুখের চুলের ধারে ধারে বিকচের স্ভার (Bozematous) ফুস্ফুড়ী এবং চুলকানি, ঠাণ্ডা ঘর হইতে পরম ঘরে গেলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং ধুইলে যাহা হইতে কল্‌তানি পড়ে ।

চক্ষু । চক্ষু প্রদাহ ; স্লেয়া জনিত চক্ষু প্রদাহ ; গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ ; চক্ষু দিয়া গাঢ় স্লেয়া নির্গমন (মার্ক) । চক্ষু দিয়া প্রচুর জল পড়া ; চক্ষে জ্বালা এবং চিড়িকমারা (আস্, ইউফ্রেস, মার্ক-কর) ।

কর্ণ । কান দিয়া পূঁষ পড়া ; কান দিয়া গাঢ় স্লেয়া নির্গমন ।

নাসিকা । নাক দিয়া অনবরত সাদা স্লেয়া নির্গমন ; মাথার সম্মুখ-ভাগে বেদনা ; নাসারন্ধ্রের পশ্চাৎভাগ হইতে গাঢ় চট্‌চটিয়া আঠা স্লেয়া নির্গমন (ক্যালৌ-বাট, নেট্রাম্-আস্) ; সর্দি এবং নাক দিয়া ক্ষতকারক জলবৎ স্লেয়া নির্গমন ; নাকের মধ্যে উষ্ণ, জ্বালা এবং ছাল উঠিয়া বাওয়ার স্ভার অনুভূত হয় (সিপা, হায়োস, মার্ক-কর) ; ঘরের মধ্যে থাকিলে নাক দিয়া অধিক পরিমাণে স্লেয়া নির্গত হয় না, ঘরের বাহির হইলে নাক দিয়া প্রচুর স্লেয়া নির্গত হয় ; গলায় মধ্য এবং বৃকে ছাল উঠিয়া বাওয়ার স্ভার অনুভূত হয় ; হাঁচি দেওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের উপরিভাগে পূর্ণ-বোধ (একন্, সালুনেরিয়া) ; মাথার সম্মুখভাগে ঘৃণবৃশে বেদনা ; নাকের মধ্যের প্রদাহ এবং ক্ষত (Ozozna) এবং তরুণ নাক দিয়া রক্ত মিশ্রিত পূঁষ নির্গমন (মার্ক, নাইট্রিক্-আস্) ; বাতাস লাগিলে নাকের মধ্যে ঠাণ্ডা বোধ হয় (আণ্টি ক্রুড, সোরিনাম্, অস্‌মিয়াস) ।

মুখমণ্ডল । মুখাকৃতি শিটা, কণ্ঠ এবং ক্রান্তির চিহ্নযুক্ত ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখগহ্বরের প্রদাহ (মিউর-আস) ; স্তন দুগ্ধ পান করানোর সময় স্ত্রীলোকের এবং তরুণ শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের (মার্ক্যারি এবং ক্রোয়েট্‌ অব্‌ পটাস্ বাবচারের পর) মুখের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে গাঢ় চট্‌চটিয়া আঠা স্লেয়ার সঞ্চার ; মুখে গোল-মরিচের স্বাদ (ল্যাঙ্ক) ; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত বা হরিত্রার রেখা বিশিষ্ট ; জিহ্বা ক্ষীত এবং দাঁত দ্বারা চাপিলে উহাতে দাঁতের দাগ পড়ে (আস্, মার্ক) ; পুড়িয়া বা ছাল উঠিয়া গেলে বেৰুণ হয়, জিহ্বার সেৰুণ অনুভূত হয় । কাশিলে বা গলা পেকুর দিলে মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে এবং নাসি-

কার গোড়ার পশ্চাৎভাগে হইতে, হরিত্রাবর্ণের, চট্‌চট্টিয়া আঠা স্লেয়া নির্গমন (কালী-বাই); যুগলস্বরের পশ্চাৎভাগে ছাল উঠিয়া বাওরার ভায় অস্বস্ত হয়; গলার মধ্যে কত, বিশেষতঃ পারার অপব্যবহারের পর।

পাকস্থলী এবং উদর। পাকস্থলী যেন নেভা হইয়া পড়ে বা পেটে অসাড় বোধ (ব্যাপ্ট, সিমিসিক, ইগনেস্, কস্, মাল্‌স্, সিমিয়া) এবং হৃৎস্পন্দন, বাহার পূর্বে পাকস্থলীতে ঘৃণ্‌ঘৃণে রকমের কনকনিয়া বেদনার উল্লেখ হয়; পাকস্থলীর স্লেয়া জনিত পুরাতন রোগ এবং পাকস্থলীতে ক্ষত; উদগারে গলা দিয়া টক জল উঠা (নাক্স-বম্); জল এবং দুগ্ধ ব্যতীত যাহা খাওয়া যায় উহার সমুদয়ই বমন দ্বারা উঠিয়া পড়ে। তলপেটে কর্তনবৎ প্রবল বেদনা বাহা অভ্যকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, মলত্যাগের পর বাহার উল্লেখ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূচ্ছার ভায় শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। বৃহৎ অস্ত্রের যে অংশে ইলিয়াম্ (Ileum) শেষ হইয়াছে, সে অংশে (Caecum) প্রথর বেদনা; প্রীধা প্রদেশে প্রথর বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী এবং অস্ত্রে ঘৃণ্‌ঘৃণে বেদনা এবং জালা; মলত্যাগের সময় পেট কামড়ানী (ব্রাই, মার্ক্, কলোস্, চেলিডন্); অস্ত্রের স্লেয়া জনিত রোগ এবং তৎপর অস্ত্রে ক্ষত; অস্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার দরুণ শূল বেদনা (F'atulent colic) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূচ্ছার ভাব।

মল। ফিকা রক্তবিশিষ্ট, উগ্র, সবুজের আভাযুক্ত তরল ভেদ (উদরা-ময়); কোষ্ঠবদ্ধ এবং মল স্লেয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত কঠিন লম্বা এবং মোটা নেড় (গুলিয়াম্); কোষ্ঠবদ্ধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অর্শ রোগ (নাক্স-বম্, মাল্‌স্); শুষ্ক ঘারে নালী না (Fistula in ano)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্র পচা গন্ধ; মূত্রাধারের স্নায়িক রোগ এবং তদ্বন্ধন মূত্রে গাঢ়, স্থতার ভায় তলানি পড়ে; মূত্রকোষ প্রদেশে ঘৃণ্‌ঘৃণে কনকনানি।

জননেত্রিয়। প্রমেহ রোগের দ্বিতীয়াবস্থা এবং তদ্বন্ধন মূত্রনালী দিয়া হরিত্রাবর্ণের গাঢ় ক্রেন নিঃসরণ (আগ্নাশ্, পিট্রোয়েল্, পাল্‌স্); পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগ (Gleet) এবং তদ্বন্ধন কোন প্রকার বেদনা যন্ত্রণাদি থাকে না (মাল্‌স্, পিট্রোয়েল্); অসাড়ো ধাতুনিঃসরণ (Spermatorr-hua) হেতু দুর্বলতা; (কস্-আস্)। জীলোকের চট্‌চট্টিয়া আঠা স্থতার

জ্বর গাঢ় এবং হরিত্রা বর্ণের খেত প্রদর নিঃসরণ; অরায়ু স্থান স্রষ্ট হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অরায়ুর মুখ এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে ও যোনিদ্বারে কণ্ড (আজেক্‌-নাইটিক্‌); যোনির অভ্যন্তর চুলকানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর খেত প্রদর নিঃসরণ; শুব্ব সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা ।

শ্বাসযন্ত্র । বায়ুনের উপরিভাগে হৃৎ হৃৎ করার দক্ষ, শুষ্ক কর্কশ কাশি; বুকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বর টাটানি এবং জ্বালানুভব; বৃদ্ধ বয়সে বাহারা অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে তাহাদিগেব বায়ুনের প্রদাহ এবং তদ্রূপ গলাদিয়া গাঢ়, হরিত্রাবর্ণের চট্‌চটিয়া আঠা হত্যার জ্বর স্লেয়া নির্গমন (ক্যালী-বাই) ।

পৃষ্ঠদেশ । কোমরের পশ্চাত্তাণ্ডে প্রান্তিবোধ এবং কনকনানি (মিপিয়া) ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ । অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রান্তিবোধ এবং উহাতে কনকনানি বেষনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে সর্দি; পায় উত্তেজনাবিশিষ্ট, কষ্টে আরোপ্য হয় একপ এবং গণ্ডমালা জনিত ক্ষত ।

জ্বর । প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে শীতবোধ; পৃষ্ঠদেশ এবং উরু বেষনেই শীত অধিক অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উরু প্রদেশে কনকনানি; বারম্বার দশকা উজ্জ্বলভব; আঙ্গিক-জ্বর, পিত্তজ্বর অথবা অরবিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর অস্থখ; কামল রোগ এবং তৎপর অত্যন্ত দুর্বলতা (চারনা) ।

চর্ম্ম । শিশুগণের শরীরের নানা স্থানে ছাল উঠিয়া যাইয়া লাল হয় (Infantile-Intertrigo) (গ্রাফ্‌, ইগনেস্‌, লাইকোপ্‌); বসন্ত রোগের সমুদয় অবস্থা; মুছার ভাব এবং বলকর (আন্টি-টার্ট) ।

ব্যবহার । স্লেয়া জনিত অস্থখ; কর্কট রোগ (Cancer); কোষ্ঠ-বদ্ধ এবং অজ্ঞাত বে প্রকার অস্থখের বিষয় প্রাকৃতিক লক্ষণে উল্লেখ করা হইরাছে তাহাতেই হাইড্রাষ্টিক্‌ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । বৃদ্ধ বয়সে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়া (ওপিয়াস্‌); বারম্বার দুর্বল হইয়া হঠাৎ অবসর হইয়া পড়া বা মুছার ভাব এবং সমুদয় শরীরে শীতল ঘর্ম্ম; পাকস্থলীতে ঘেন কিছুই নাই বা

উঠা যেন একবারে অসাড় হইয়াছে এরূপ অস্বভূত হয়; বামদিক অধিক আক্রান্ত হয়; শৈথিল্য কিল্লীর নিঃসরণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং উহা চট-চটিয়া আঠা এবং স্ফতার জায় হয় (ক্যানী-বাই) ; শৈথিল্য কিল্লীতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জায় হয় (ক্রিয়াজ্) ইত্যাদি হাইড্রাটিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সম্মুখবিশিষ্ট ঔষধ । শৈথিল্য কিল্লীর উপর হাইড্রাটিসের কার্য্য পাল্‌সেটিল, ক্যানীবাইক্রমিকাম্, আমোনিয়াম্ বিউরিয়াটিকাম্ এবং আণ্টিমোনিয়ামের কার্য্যের জায় । অন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের উপর ইহার কার্য্য কলিমোনিয়া, আলোজ্, সিমিয়া এবং সাল্‌ফারের জায় ; স্তনের উপর ইহার কার্য্য ফাইটোলাক্ট এবং কোনায়ামের জায় । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আদিনিম, আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্, মার্কিউরিয়াম্ সলিউবিলিস্, মার্কিউরিয়াম্ কেরোসাইবাসের কার্য্যের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । সাল্‌ফার ।

ডাইলুশন বিচার । কর্কট রোগ, প্লেম্বাজনিত রোগ এবং কোষ্ঠ-বন্ধের পক্ষে ১ম ডাইলুশন এবং মূল আবেক ১ ফোঁটা মাত্রায় বিশেষ উপকারী । কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ৩, ৬, ১২ বা ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন । পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগ (Gleet) যাহাতে মূত্রনালী দিয়া স্ফতার জায় প্লেম্বা নির্গত হয়, মূল আবেক ৫ ফোঁটা, ২ কান্টা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উহা দ্বারা প্রতি দিন প্রাতে ও বৈকালে মূত্রনালী দিয়া পিচ্কারি দিলে বিশেষ উপকার দর্শে । স্তনের গ্রন্থির ক্ষীণিতে উক্ত পরিমাণে গোশন প্রস্তুত করিয়া নেকড়া ভিজাইয়া নেকড়াখানি স্তনে বাধিয়া রাখিলে ক্ষীণি এবং প্রদাহ ২৩ দিনের মধ্যে মিলাইয়া যায় অনেক রোগীর চিকিৎসায় এরূপ দেখা গিয়াছে ।

## হায়োসায়েরমাস্ নাইজার,—হায়োস্

(HYOSCYAMUS NIGER,—HYOSC.)

মধ্য এবং দক্ষিণ ইউরোপের স্থানে স্থানে পাথর বিশিষ্ট পতিত ভূমিতে এই গাছ জন্মে। ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারলণ্ডের পল্লিগ্রামাদির যে স্থানে ময়লাদি ফেলান হয়, সে সকল স্থানে এই গাছ জন্মে। যে প্রকার গাছ বৎসরের মধ্যে দুইবার জন্মে, সে গাছের কাঁচা পাতা, ডাঁটা ইত্যাদি মধ্য নিয়মে ডাইলুট্-স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কপেফিকা মজ্জার উপর, প্রধানতঃ জ্ঞান উৎপাদনের সহায়কারী স্নায়ু এবং পেশীর উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহ্যিক দৃশ্য উক্ত স্নায়ুর জ্ঞান উৎপাদন শক্তি এবং মানসিক বৃত্তি বিকৃত হইয়া যোগী ভ্রম এবং নানা প্রকার কাল্পনিক বিকট মূর্ত্তি বা আকারাদি দেখে, সে পাগলের জ্ঞান বগড়া করে ও সকলকে নানা প্রকারের বিশিষ্ট গালি দেয়। মস্তিষ্কের উপর যদিও ইহার কার্য অনেকটা বেলাডোনা এবং ট্রামোনিয়ামের জায়, তথাপি উক্ত দুই ঔষধের কার্যের সঙ্গে ইহার কার্যের অনেক প্রভেদ আছে। বেলাডোনা মস্তিষ্কে যে প্রকার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ উৎপাদন করে, হায়োসায়েরমাস্ সে রূপ করে না। আবার ট্রামোনিয়ামে মস্তিষ্ক যে রূপ উত্তেজিত করিয়া ঔষ্ণ উত্তেজতার অবস্থা উৎপাদন করে, হায়োসায়েরমাস্ সে রূপ করে না। হায়োসায়েরমাস্ মস্তিষ্কের কার্য সামান্য পরিমাণে উত্তেজিত করে এবং উহা রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার এত অধিক বৈসংখ্য উৎপাদন করিতে পারে না যাহারা প্রদাহ উপর হইতে পারে। অতএব হায়োসায়েরমাস্ মস্তিষ্কের উত্তেজনার একরূপ স্থানিক লক্ষণাদি উৎপাদন করে যথা বিকার, মৌহক (Typhus) জ্বর এবং মদনোন্মত্ততা (Delirium Tremens) দেখিতে পাওয়া যায়। গতি উৎপাদন কার্যের সহায়কারী স্নায়ুসমূহ দিয়া ইহা পেশীর উপর প্রবল ভাবে কার্য করিয়া লক্ষ্যবান, কোন কোন অংশের আকস্মিক অগ্রসরণ, আকস্মিক (Convulsions), বিশেষতঃ যে সকল পেশী শেফা



পূর্বক সঞ্চালন করা যায় না (Involuntary muscles) সে সকল পেশীর পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। মস্তিষ্কের জ্ঞান উৎপাদন শক্তির অতিরিক্ত চেতনা এবং স্বাধিক উত্তেজনা উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মথো পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন। সম্পূর্ণ অচেতনতা (এইলাছ্, বেল্); কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে রোগী তৎক্ষণাৎ উহার উত্তর দেয় এবং উহার পরক্ষণেই আবার অচেতন হইয়া পড়ে ও প্রলাপ বলে (আর্গিকা, ব্যাপ্ট্); প্রলাপ এবং অস্থিরতা; রোগী বিছানায় থাকিতে চাহে না (আগারিকান্, এইলাছ্, বেল্); সর্বদা ভ্রম এবং কাল্পনিক মূর্তি দেখা (আনাকার্ড্, ককিউল্, ট্রায়মন্); প্রলাপ উক্তি বাহাতে রোগী তাহার কাজ কর্মের বিষয় বলে (ব্রাট্); রোগী তাহার কাল্পনিক অনিষ্টের বিষয় বলে; রোগী মনে করে বেন অল্প লোকে তাহাকে বিষ খাওয়াইবে বা তাহাকে দ্বিজী করিবে; সর্বদা অস্পষ্ট ভাবে বিভ্ বিভ্ করিয়া প্রলাপ বলা বা কথা বলা (ট্রায়মন্), অথবা হাতে হাতে রগড়াণ; প্রলাপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দৃষ্টতঃ উষ্ণ; মুখমণ্ডল শিটা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল, যদিচ শরীর অত্যন্ত উষ্ণ; বিছানায় কাপড় বারবার খোঁটা (তোকান) (বেল্, ট্রায়মন্); মদোন্মত্ততা (Delirium Tremens) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশী পর্যায়ক্রমে তড়িত-তড়ি সঙ্কোচন এবং প্রসারণ (Clonic spasms); আলোক এবং মনুষ্যের নিকট থাকিতে অনিচ্ছা (কার্কো-আনিমেল্, ইগ্নেনস্, নেট্টায়্-কার্ক্, ট্রায়মন্); মৈথুনের অতিরিক্ত ইচ্ছা এবং সমুদয় শরীর অনাচ্ছাদিত রাবিবার ইচ্ছা, বিশেষতঃ পুরুষাঙ্গ এবং যোনি ইত্যাদি গোপনীয় স্থান; নানা প্রকারের রক্তি বিষয়ক, অশ্রাব্য গান করা; উন্মত্ততা এবং উহার সঙ্গে শরীর নানা-প্রকারের বিশ্রি ভাবে সঞ্চালন এবং হাসি উৎপাদক কার্য্য করা; উন্মত্ততা; রাগ; রোগকে ধমকান, সপত করা বা অস্ত্রের অনিষ্ট করা, মারা, কাষ-ড়াণ এবং অল্প লোককে কষ্ট দেওয়া, লোককে মারা, কামড়াণ এবং হত্যা করার ইচ্ছা (ট্রায়মন্); অর্থশূন্ত হাসি, অত্যন্ত উত্তেজিত হওয়া এবং তড়ি-

ভাঙিকথা বলা (লাক্, মার্কা, ট্রামন্); ভয় থাওয়া মাজ্জাই আক্ষেপ বা কন্-বান্‌সন্, (Convulsions) এবং বারবার চমকিয়া উঠা (জেল্‌স্, ওপিয়ান্, ট্রামন্); অভ্যন্তর উন্নতিতে হিংসা বা ভীষার ভাব (লাক্); প্রেমে নৈরাশ হওয়া (আরাম্, ইগ্‌নেস্, ফস্-আস্); ভীষা, রাগ, অসংলগ্ন কথা বলা এবং আক্ষেপ; স্বরণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ ।

মস্তক । নেসা করিলে যেরূপ হয়, মাথায সেরূপ গোলমলে বোধ এবং মাথাঘোরা (ককিউলাস্, নাক্স-মক্, নাক্স-বম্, ওপিয়ান্, পেডান্); কপালে চাপিয়া ধবার জ্বার অবনয় কারক বেদনা চল্‌চলে হইলে যেরূপ হয়, মস্তিকে সেরূপ অহতৃত হয় (নাক্স-মক্); মস্তিকে আলোড়নের জ্বার অহতৃত হয় (চায়না, মোনয়েন্; মাথা এপাশ ওপাশ করিয়া বারবার নাড়া; নিশ্বাস প্রবাসে গৌ গৌ, ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া এবং হিকা; আঘাত লাগিয়া মস্তিকের কার্ণাবরোধ (Concussion of the brain); মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ, অচেতনতা, অথচ রোগী প্রত্যেক প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেয়; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু লালবর্ণ এবং উজ্জল ও মুগমণ্ডল লালের আভাযুক্ত বেঙণী রঙ্গ বিশিষ্ট; প্রদাহ এবং তৎকরণ মস্তিকের নদীর চেউয়ের জ্বার আলোড়ন এবং টন্ টন্ করা; মস্তিকের শোথ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার আলোড়ন, হাত মুট করা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী হাতের পাতার তালু পানে দৃঢ় ভাবে আঁকষ্ট হওয়া ।

চক্ষু । চক্ষু লালবর্ণ, উজ্জল এবং পাগলের জ্বার স্থির ভাব বিশিষ্ট (বেল্, ক্যাছ্, ট্রামন্); টেরা চক্ষু (এপিস্); চক্ষু নিরীক্‌ধের জ্বার স্থিরভাব বিশিষ্ট; চক্ষুর তারা বিস্তৃত (এইলাছ্, বেল্) এবং উহাতে স্পর্শ বা আলোক জ্ঞান থাকে না (সিকুটা, ওপিয়ান্, ট্রামন্, হেলিপোয়াস্); চক্ষে অন্ধকার দেখা; দূরের বস্তু দেখিবারে অশক্তি; দৃষ্টিহীনতা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন চক্ষুর সম্মুখে একখানি পাতলা কাপড় দেওয়া রহিয়াছে (কলিকাম্, সাই-ক্রেমেন্, ক্রিয়াজ্, কস্, পাল্‌স্, সাল্‌ক্); চক্ষে কোন বস্তু স্বাভাবিক আকারে দেখা যায় না, সমুদয় বস্তু যেন আগুনের জ্বায় লাগ এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় দেখায় (নাক্স-মক্); চক্ষে যেন সকল বস্তুই স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট দেখায় (পাটিনা); চক্ষু যেন আক্ষেপিক রূপে বুঝিয়া আইলে

যাহা কোন মতেই খোলা রাখা যায় না (জেন্স) ; এক বস্তু ছুটী বলিয়া অনুভূত হয় ।

নাসিকা । ‘গ্রাণ্ শক্তির বিনাশ (গোরিনাম্) ; নাকের মূলে হঠাৎ খাঁকা লাগার জায় অনুভূত হয় ; নাসিকার মূলে এবং গলার হাড়ে চাপিয়া ধরার জায় চিন্‌চিনে বেদনা ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল আরক্ত, কাল্‌টে লালবর্ণ এবং শোথের জায় টল্‌টলে বা ক্ষীত (ব্র্যাপ্ট্) ; মুখমণ্ডল ফিকা বা শিটা, লালবর্ণ এবং উষ্ণ ও বিকৃত (বেল্) ; দাঁত লাগে (Lock-jaw), কিন্তু রোগী অচেতন হইয়া থাকে না (আবিদিস্, সিকুটা, ইগ্‌নেস্) ; মুখে ফেণা উঠা (সিকুটা) ।

মুখগহ্বর এবং গলাব্ মধ্য । আয়বিক ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দন্তশূল ; প্রাতঃকালে দাঁতে দপ্‌দপানি, কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া কেনার জায় বেদনা, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে যাহার বৃদ্ধি হয় (সাল্‌ফ্) ; জিহ্বার পক্ষাঘাত (ডাল্‌ক্, কষ্ট্, জেন্স্) ; কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্টানুব, অথবা গোলমেলে রকমের কথা বলা (কষ্ট্, কোনারাম্, জেন্স্) ; মুখগহ্বর, জিহ্বা, ওষ্ঠ এবং মুখগহ্বরের পশ্চাত্তাগে গুরু বোধ (একন্, আস্, এইলাহাস্, ব্রাই, নাক্স-মক্, পাল্‌স্) ; মুখে ফেণা উঠা ; জিহ্বা পরিষ্কার, গরম এবং শুষ্ক । গলার মধ্যের সঙ্কোচন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গিলিতে, বিশেষতঃ ভরল পদার্থ গিলিতে, অশক্তি (বেল্, প্রাষাম্, ট্রায়ন্) ; কোন দ্রব্য গিলিতে চেষ্টা করিলেই আক্ষেপের পুনরাক্রমণ হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু রোগী একবারে অসিক্ত জল পান করিতে পারে না (আস্) ; জল বা জলীয় পদার্থ গিলিতে অত্যন্ত ভয় (বেল্) ; আহারের পর হিঁকা (বাই, ইগ্‌নেস্) ; কাঠবন্মী বা বমন (আস্, আন্টি-টার্ট্, ইলিকাক্) ; স্পর্শ করিলে পাকস্থলীর মধ্যে অত্যন্ত টাটানি (ক্যালী-কার্ক্, নেট্রাম্-কার্ক্) ; হৃৎ খাইতে ভয় (বেল্, ক্যাহ্) ; আহার করিলে বমন ; রক্ত বা রক্ত মিশ্রিত স্লেষ্মা বমন । নিশ্বাস টানিবার সময় নাভি প্রদেশে বাটীয়া ধরার জায় বেদনা বা বাতনা, বমন করিলে যাহার উপশম হয় ; উদর প্রাচীরে বেদনা এবং টাটানি (ব্রাই) ; উদর ক্ষীত এবং বিকৃত এবং স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনান্বিত হয় বা টাটায় (একন্, বেল্) ; ভলপেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্ক পক্ষাঘাত ; শুষ্কধারের স্ফোটক ধরের পক্ষাঘাত ; রাত্রিতে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূৰ্ণক মলত্যাগ (আৰ্ণিকা, আর্স্, কার্বো-বেজ্, ফল্, রাস্ট্র) ; মূত্র ত্যাগের সময় অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূৰ্ণক মল নির্গমন (এইলাছ্, মিউর-আস্) ; জলবৎ তরল, বেদনা বা বাতনা-হীন উদরাময় (আর্স্, চায়না, পডোক্) ; বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে সামান্য পরিমাণ মল নির্গত হয় ; হরিদ্রা বর্ণের জলবৎ তরল ভেদ ; আন্ত্রিক-জ্বর বা অরবিকারের ভোগ সময়ে এবং জ্বীলোকের স্মৃতিকাগারে উদরাময় ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রাধারের পক্ষাঘাত (আৰ্ণিকা, বেজ্, কঠ্, কুগ্রাম্) ; বারম্বার অল্প পরিমাণে মূত্র ত্যাগ (একন্, এপিস্, ডিজিট্, হেলিবোরাস্), অতি কঠে, অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূৰ্ণক মূত্র ত্যাগ (আর্স্, বেজ্, সিকুটা, ট্রাইম্) ; মূত্র ত্যাগের কোনও ইচ্ছা থাকে না ; মূত্রাবরোধ (একন্, বেজ্, ক্যাছ্, নাক্স-বম্) ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের জ্বী সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা ; সর্সদা জ্বীসহবাস বিষয়ে চিন্তা ; সর্সদা উলঙ্গ হইয়া থাকা বা উলঙ্গ হইয়া থাকার ইচ্ছা । জ্বীলোকের সর্সদা পুরুষ সহবাসের ইচ্ছা এবং পুরুষ সহবাস বিষয়ে চিন্তা ও সর্সদা উলঙ্গ হইয়া থাকা বা উলঙ্গ হইয়া থাকার ইচ্ছা ; অরারূতে প্রসব বেদনার স্তায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোনরে এবং কোনরের পশ্চাৎ দেশে বেদনা ; হিষ্টেরিয়া রোগে যেরূপ হয়, রজঃস্রাব আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সেরূপ বাতনা বা আক্ষেপ ; রজঃস্রাবের সময় হাত পারের পাতার আক্ষেপিক কম্পন ; শিরঃপীড়া, বমনোদেগ, এবং প্রচুর ঘৰ্ণ ; প্রচুর রজঃস্রাব ; গর্ভাবস্থার আক্ষেপ ; সন্তান প্রসব উপলক্ষে আক্ষেপ (Puerperal Convulsions) (বেজ্) ; সন্তান প্রসবের পর অরারূ হইতে রৈদ (Lochia) নিঃসরণ বহু হওয়া (একন্, সিমিসিক্) ; স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া বাওয়া (একন্, আগারিকান্, পাল্‌স্, রাস্ট্র) ; দুগ্ধপোষা শিশুর হিকা ।

ঋসযন্ত্র । রাত্রিতে শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি, শয়ন করিলে বাহার রুচি হয় (কোনায়াম্, সিলিরা, সাইলিসি, সাল্‌ফ্) এবং বাহার দক্ষণ রোগী উদ্রিয়া বসিতে বাধ্য হয় এবং বসিলেই বাহা দূরীভূত হয় (পাল্‌স্) ; শুষ্ক, দুগ্ধ-

খুশে কাশি, ঘাছা বায়ুনল হইতে উৎক হর বলিয়া অগ্রভূত হয় ; বায়ুনলের উপরিভাগ এবং বায়ুনলে প্রচুর প্রেয়ার সঞ্চার, ঘাছার দরুণ স্বরভঙ্গ বা স্বর মূহ হয় ; বুকে আক্ষেপ এবং তন্দরুণ নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া আইসে ও বাছার দরুণ রোগী সম্মুখপানে হেলিয়া পড়িতে বাধ্য হয় ; বুকের পার্শ্বে হঠাৎ বিধানের ভায়ে বেদনা ; আক্ষেপিক প্রবল কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দিনের বেলা গলা দিয়া লোন্তা স্বাদ বিশিষ্ট প্রেয়া বা ধানা ধানা উচ্চল লালবর্ণ রক্ত পড়া ; খাস প্রেয়াস মূহ এবং ঘড়্ ঘড়্ শব্দবৃত্ত ।

নাড়ী । নাড়ী দ্রুতগামী, পূর্ণ, কঠিন এবং প্রবল ; নাড়ী দ্রুতগামী, অসম (Intermittent), মৃদুগতি বিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্র, দুর্বল এবং অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট ; নাড়ী দুর্বল এবং অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে ; নাড়ী এত দুর্বল হয় যে উহা প্রায়ই অগ্রভূত হয় না ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । কসেরুকা মজ্জাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Spinal Meningitis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ এবং পেশীর আক্ষেপিক কাকনি ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । হাত পায়ের কাঁপনি (ককিউল, কোনার্য়াস্, জেলস্) ; হাত এবং পায়ের পাতার বারম্বার স্পন্দন (বেল্) ; চলিবার সময় বা উচ্চ স্থানে উঠিবার সময় পায়ের আঙ্গুল আক্ষেপিক রূপে সজ্জুচিত হয় ।

নিদ্রা । অতিরিক্ত দায়বিক উদ্বেজন্য দরুণ নিদ্রাশূন্যতা (সিমিলিফ্, ককিয়া, ওপিয়াম্) ; অস্থির নিদ্রা ; ভয় খাইয়া বারম্বার চমকিয়া উঠা (অগারিকাশ্, আস্, বেল, ব্রাই, ট্রায়ন্) ; ঘোর নিদ্রা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ ; ঘুমের ঘোরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠা ; রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা ।

জ্বর । নাড়ী দ্রুতগামী, পূর্ণ এবং কঠিন ; সমুদয় শরীরে শীতবোধ এবং মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং হাত ঠাণ্ডা ; সন্ধ্যার সময় সমুদয় শরীর অত্যন্ত উষ্ণ ; আঙ্গিক জ্বর বা জ্বরবিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চুপে চুপে বীড়্ বীড়্ করিয়া প্রলাপ বলা ; পেশীর অগ্রভাগের স্পন্দন ; বিছানার কাপড় তোকান (খোঁটা) ; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মল মূত্র নির্গমন এবং পলায়ন করার ইচ্ছা (ওপিয়াম্) ; কোন প্রকার প্রকৃত উত্তর দিয়া রোগী পুনরায় প্রলাপ

বলে এবং অচেতন হইয়া পড়ে (আর্শিকা); নিদ্রাবস্থায় হৃৎসলকারক ঘর্ষ (চারনা, মার্ক)।

ব্যবহার । ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া অস্থখ; বেলাডোনার অপব্যবহার জনিত অস্থখ; ঈর্ষা এবং অস্ত্রের প্রেমে অস্থখী হওয়ার দরুন অস্থখ; আক্কেপ (Convulsions), খেঁচনী, খিলখরা, মূগীরোগ, কোরিয়া (Chorea) এবং অত্যন্ত প্রকারের আক্কেপিক অস্থখ, বিশেষতঃ গর্ভবস্থায় এবং স্ততিকাগারে (আঁতুড়ে) এবং শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের; অত্যন্ত দায়বিক উত্তেজনা; উন্মত্ততা; মননোন্মত্ততা (Delirium Tremens); মোহক-জ্বর, টাইফয়েড-জ্বর বা জ্বর-বিকার, সংজ্ঞাশ রোগ; মস্তিষ্কের শোধ; দাঁত লাগা (Lock-jaw); পক্ষাঘাত; শুষ্কহার এবং মূত্রাধারের সঙ্কোচক বস্ত্রের পক্ষাঘাত; মূত্রাবরোধ; রাত্রিতে আক্কেপিক কাশি; অরাস্ত্র হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia); হিকা; জ্বীলোকের স্ততিকাগারে (আঁতুড়ে, উদরাময় ইত্যাদি রোগে হায়োনারেমান্ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত রোগী এবং মাতালদিগের অস্থখে বিশেষ উপকারী (নাক্স-বম্, ট্রামন্); বস্তগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা অত্যন্ত বড় দেখায়; আক্কেপ বা খেঁচনী এবং তদ্রূপ শরীরের সমুদয় পেশী, চক্ষু, চক্ষুর পাতা এবং মুখমণ্ডলের স্পন্দন; মূগীর আক্রমণের পর ঘোর নিদ্রা; আক্কেপিক শুষ্ক কাশি, শয়ন করিলে বাহার উল্লেখ বা বৃদ্ধি হয় এবং বসিয়া থাকিলে বাহার উপশম হয় (পাল্‌ম্); সর্বদা উলঙ্গ হইয়া থাকা বা উলঙ্গ হইয়া থাকার ইচ্ছা; পেশীর অগ্রভাগের স্পন্দন (Sub sultus tendinum); ঈর্ষা এবং প্রেমে অস্থখী হওয়ার দরুন অস্থখ; আক্কেপের পর পক্ষাঘাত; সন্ধ্যার সময়, আহার বা পানের পর, উচ্চ ঘরে, রক্তস্রাবের সময় অস্থখের বৃদ্ধি এবং মাপা ছোট করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে, তামাকু খাইলে, বা কাকি খাইলে অস্থখের উপশম ইত্যাদি হায়োনারেমান্দের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । হায়োনারেমান্দের কার্য্যের সঙ্গে বেলাডোনা এবং ট্রামোনিয়ামের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক সম্বন্ধে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আইওনিয়া,

কুপ্রাস, ইগ্নেসিয়া, জেল্‌সিমিয়াম্, লাইকোপডিয়াম্ এবং ওপিয়ামের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । বিনিগার (Vinegar), বেলাডোনা, ক্যান্‌ফার, নাইট্রিক অসিড্, চায়না এবং ট্রাঘোনিয়াম্ হায়োসায়েরাসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ উক্তি, নিদ্রানুভূতা এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত চেতনা, শ্বাস-শূল বা শ্বাসশূলের দ্বারা বেদনা, বাতরোগ, আক্কেপিক হাঁপানিকাশি, শরীরের নানা অংশের আক্কেপিক সঙ্কোচন, মস্তিষ্কাবরকবিলী প্রদাহ, ধমুঠকাহ্ন এবং আক্কেপিক স্নায়বিক কাশিতে ১ম হইতে ৬ষ্ঠ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য । বোর অচেতনতা (Coma), সংজ্ঞাশ যোগ, আক্কেপ, পক্ষাঘাত এবং উদরাময়ের পক্ষে ১২ হইতে ৩০ ডাইলুশন উপকারী । মহাত্মা হানিমান এই ঔষধের ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করিতেন । তৎপর তাঁহার শিষ্যবর্গ ১ম হইতে চতুর্থ দশমিক ডাইলুশন পর্য্যন্ত সচরাচর ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন । ৩য়, ৬ষ্ঠ এবং ৩০ ডাইলুশনই আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকি ।

## আইরিস্ বাসিকালার,—আইরিস্

(IRIS VERSICOLOR, -- IRIS VERS).

আমেরিকার ইউনাইটেড্ স্টেট্‌সের কান্সাস ডোবাতির ধারে এই গাছ জন্মে । ইউরোপের অনেক স্থানে বাগানাদিতে ইহা আপনা আপনিও জন্মিয়া থাকে । ইহার মূল বা শিকড় ডাইলুট্ স্পিরিটে ভিজাইয়া যথা নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহার গুঁড়োও প্রস্তুত হইয়া থাকে । গুঁড়াকে আইরিসিন্ (Irisin) বলে ।

সাধারণ ক্রিয়া । গ্রহি, পাকস্থলী এবং অন্ত্রের স্নায়বিক কবিলীর উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল । ইহা উহার অতিরিক্ত সাকল্য উৎপাদন

করিয়া উহার নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং উহাকে উগ্র করিয়া থাকে। প্যানক্রিয়াসের (Pancreas) উপর ইহার বিশেষ প্রভাব নির্দিষ্ট কার্য আছে বলিয়া অনুমিত। ইহা ত্রণ বা কোষ্ঠ্যের জ্বাশ কুশ্র কুশ্র কুশ্র উৎপাদন করে। পাকস্থলী এবং বৃক্কের অম্লত্ব হেতু বমন সম্বলিত শিরঃস্রোতা উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । নিরাশার ভাব, মানসিক অবসন্নতা এবং সামান্য কারণেই বিরক্ত হওয়ার স্বভাব (পাল্‌স)।

মস্তক । কপালের ডাইন পার্শ্ব দণ্ডপানি বা পোঁচা বিধার জ্বাশ অম্লভূত হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ; মাথার সমুখ ভাগে ভারিবেধ এবং ঘৃণা, ঘৃণে বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ (বিরেট-বিরাইড); কপালের দুই পার্শ্ব, বিশেষতঃ ডাইন পার্শ্ব, পোঁচা বিধার জ্বাশ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপরে বাটিয়া ধরার জ্বাশ অম্লভূত হওয়া; মাথার উপর কোষ্ঠ্যের জ্বাশ কুশ্র কুশ্র কুশ্রী (গ্রাক্, মালক্)।

নাসিকা । অনবরত হাঁচি দেওয়া (একন্, জেল্‌স্, সান্সুনেরিয়া)।

মুখমণ্ডল । চক্ষুর কোটরের উপরি এবং নিম্নভাগ স্থিত এবং হরাস্তির উপরিভাগের স্নায়ুশূল (চায়না, স্পাইজেল্); দাঁতের নিম্নভাগস্থিত স্নায়ুশূল বাহা প্রতি দিন প্রাতঃকালে প্রথম আহারের পর আরম্ভ হয় এবং বাহা অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া থাকে ও যাহার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন বা বধিরকারক শিরঃস্রোতা বর্জনান থাকে; মুখমণ্ডল, নাকের চতুর্দিক, ওষ্ঠ এবং গালে কোষ্ঠ্যের জ্বাশ কুশ্র কুশ্র ত্রণ এবং উহা হইতে রক্ত মিশ্রিত তরল আলা উৎপাদক কল্‌তানি নির্গত হওয়া (গ্রাক্)।

মুখগহ্বর । পুষ্টিয়া গেলে বা ছাল উঠিয়া গেলে বেদন হয়, মুখগহ্বর এবং জিহবার লেখন বাতনা অম্লভূত হয় (ইপ্সুগাস্, এপিস্, প্যাটিনা, পাল্‌স্, সিলিয়া, কাইসট্); গালের দৈর্ঘ্যিক বিস্তীর্ণতা কত (নাইট্রিক্-অ্যাস্); মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণে লাল পড়া (চায়না, অ্যারোড্, ক্যালী-অ্যারোড্, মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্)।



পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা বা কচি থাকে না (আর্স্, চরমনা, নেট্রাম্-মিউর) ; উদরগারে গলা দিয়া স্বাদশুভ দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; বমনো-বেগ এবং অত্যন্ত টক স্বাদ বিশিষ্ট তরল পদার্থ বমন ; উদরস্থ আহার প্রবাদি বমন ; পিত্ত বমন (গ্রাটিওলা, নাক্স-বন্, পডোফ্) ; শিশুগণের উদরস্থ টক দুগ্ধ বমন (এথুরা) ; উদরোচ্চ প্রদেশে অত্যন্ত জ্বালা এবং তন্দ্রহীন অত্যন্ত ঘাতনা (ইস্কলাস্, আর্স্, ক্যাস্, কস্, বিরেট-আব্) । অঙ্গের মধ্যে কামড়ানীর জ্বায় বেদনা বা ঘাতনা (ব্রাই, মার্ক্, চেলিডন্, হাইড্রাষ্ট) ; উদরে বেদনা, দূষিত বায়ু নিঃসরণে যাহার উপশম হয়(কলোস্) ; উদরে শূল বেদনার জ্বায় বেদনা, যাহার দ্রুণ উপশম পাওয়ার আশায় রোগী সমুখ পানে বাকিয়া পড়িতে বাধ্য হয় (আলোজ্, কষ্ট্, কলোস্) ।

মল এবং মলদ্বার । মল জলবৎ তরল, নরম ; হরিজাবর্ণের মল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হয়, কিন্তু উদরে বেদনা থাকে না ; বেদনা বা ঘাতনাত্মক হৃৎকম্পিত মল ভেদ ; আমশয় ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোঁথপাড়া ; আগুনে পুড়িলে বেরূপ হয়, মল ত্যাগের পর শুষ্কভাবে সেরূপ আলাহুভব (আর্স্, ক্যাস্) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । ডাইন বন্ধে কসিয়া ধরার জ্বায় প্রবল বেদনা, নড়াচড়াতে, বিশেষতঃ বাহ্য উর্দ্ধদিকে উঠাইলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; হাতের পাতার অস্থির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে খোঁচা বিঁধার জ্বায় প্রবল বেদনা । কুঁচকি বাত ; কুঁচকি হইতে নিম্ন দিকে উরুদেশের সমুদয় স্থানে বেদনা যাহা হাঁটুর পশ্চাৎদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

চর্ম্ম । গায় কোষ্ঠ্যর জ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লণ, মাথার উপর এবং মুখমণ্ডলে যাহা অধিক হয় (ক্রেটন্, ক্রিয়াজ্ গ্রাফ্) ।

জ্বর । শরীর উষ্ণ হইয়া শীত অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত পায়ের পাতা শীতল হয় ; সমুদয় শরীরে ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ কুঁচকি প্রদেশে ।

ব্যবহার । পাকস্থলী এবং যকৃতের কার্যের বৈলক্ষণ্য হেতু অস্থক্, কোষ্ঠবদ্ধ ; ওলাউঠা, উদরাময় ; রক্তামাশয় ; বমন সম্বলিত শিরঃপীড়া ; শ্বাস্-শূল ; সর্দি ; পিত্তজ্বর ; বিকট (Eczema) ; হৃৎ পোষ্য শিশুর দুগ্ধানিতে দুগ্ধুড়ী (Milk-Crust) ইত্যাদি অস্থখে আইরিস্ বার্নিকালার ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে ; বিশ্রামে এবং নড়াচাটে অস্থবাদের বৃদ্ধি ; ক্রমাগত নড়াচড়াতে রোগের উপশম ইত্যাদি আইরিসের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আইরিসের কার্যের সঙ্গে আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্, কল্‌চিকাম্, আয়োডিয়াম্, ইপিকাকিউএনা, মার্কিউ-রিয়াম্ এবং পডোফিলামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্, আর্সিনিক, পাল্‌মেটোলা এবং বিরেটাম্ আল্‌বামের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । নাক্‌ বমিকা ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । প্যারিস নগরস্থ ডাক্তার ক্লড্‌ (Dr. Claude) ১২ হইতে ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া কোষ্ঠ বদ্ধে বিশেষ উপকার পাইয়া থাকেন । তিনি বলেন যে উহা অপেক্ষা নিম্ন ক্রম ব্যবহারে কোষ্ঠ বদ্ধে কোনও ফল পাওয়া যায় না ।

### মেজিরিয়াম্,—মেজির

(MEZEREUM,—MEZ.)

ইউরোপের প্রায় সমুদয় পার্শ্বাঙ্গীৰ জঙ্গলা জমীতে এই গাছ জন্মিয়া থাকে । ইহার বাকল যথা নিম্নে প্রক্‌ স্পিরিটে ডিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । চৰ্ম এবং আচার বহা নালী (Alimentary (anal), জননেত্রির ও মূত্রযন্ত্রের শৈল্পিক কিলীর উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, বাহার দরুণ চৰ্ম এবং উক্ত শৈল্পিক কিলীগুলি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া প্রদাহযুক্ত হয় এবং গায় কুসুড়ী বাহির হয় । পারার (Mercury) অপব্যবহার, গরমীর ব্যারানের দরুণ যেকোন হা, অস্থি এবং উহার আবরক কঠিন পর্দার (Periostem) উপর এই ঔষধ সেরূপ কার্য করিয়া পারার অপব্যবহার এবং গরমীর ব্যারানের দ্বারা অস্থির লক্ষণাদি উৎপাদন করে ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সর্বদা আপন রোগ বিষয়ে ছদ্ম্ভিত্তা এবং নিরাশার ভাব (নেট্রাম্-কার্ক, নাক্স-বন্) ; সর্বদা কাঁদিবার ইচ্ছা (নেট্রাম্-মিউর, পাল্‌স্, ইগ্নেস) ; সামান্য কারণেই বিরক্ত এবং রাগাধিত হওয়া (ব্রাই, ক্যাম) ; মানসিক চিমাবোধ এবং উন্নততা ; চিন্তা করিতে অত্যন্ত কষ্টান্বিত ; কোন বিষয় স্মরণ করিতে অশক্তি (নেট্রাম্-মিউর) ।

মস্তক । নেসা করিলে বেকপ হয়, মাথার সেরূপ চিমাবোধ (ককি-উল, নাক্স-মন্, পাল্‌স্) ; মাথার হাড়ে বেদনা, স্পর্শনে যাহার যুক্তি হয় ; পার্শ্বীয়ক পরিশ্রম বা অনেক কথা বলিলে মাথা এবং কপালের চুই পার্শ্বে কন্কনানি ; প্রবল শিবঃপীড়া ; সামান্য স্পর্শনে বা বিরক্ত হইলে মাথা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় ; নাকের গোড়া হইতে কপাল পর্যন্ত চাপিয়া ধরার ভায় প্রবল বেদনা (ক্যালী-বাই) ; কপালের বাম পার্শ্বে চাপিয়া ধরার ভায় বেদনা যাহা মধ্যদেশ হইতে বহির্দেশে বিস্তৃত হয় ; মাথার পশ্চাত্তাগের হাড়ে ছিদ্র করার ভায় বেদনা ; মাথা চামড়ার ভায় চুম্বিত (থোসা) দ্বারা আবৃত, যাহার নীচে পূঁথ সঞ্চিত হইয়া চুল জড়াইয়া যায় (গ্রাক্, সোরিনাথ) ; আধার উঁচু, চাখড়ির ভায় দাঙ্গা, ছানার জলের ভায় ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া পর্দার ভায় পদার্থ ও পূঁথযুক্ত পাতড়া, যাহার মধ্যে কীটের ডিম দেখিতে পাওয়া যায় ; মাথার মরা চর্ম এবং খুস্কি (ব্যডারাগা, ক্যাহ্) ।

চক্ষু । চক্ষু গরম এবং প্রদাহযুক্ত ; চক্ষুর বোজক ঝিল্লী মলিন লাল বর্ণ ; চক্ষে চাপিয়া ধরার ভায় বেদনা এবং শুকাহুত্ব ; বাম চক্ষুর উপরের পাতার পেঞ্জীর অনিবার্য স্পন্দন ; চক্ষু দ্বারা জল পড়া এবং চক্ষে জ্বালা এবং চিড়িকমারা (অর্স্, ইউক্লেন) ; সর্বদা চক্ষু উপনের ইচ্ছা (ফ্রোকাশ্, ইউ-ফ্রেন্স) এবং চক্ষু বুজিয়া থাকার ইচ্ছা (কট্, জেন্স) ; চক্ষুর পাতার প্রান্ত এবং নাকের নিকটবর্তী চক্ষুর পাতার চর্ম চুলকাই ।

কর্ণ । ডাইন কানের বহির্দেশ যেন ফাঁত এবং বিস্তৃত হইতেছে এক্রূপ অহুত্ব হয় এবং তৎপর বাম কানে এক্রূপ অহুত্ব হয় ।

নাসিকা । নাক দিয়া হরিদ্রা বর্ণের পাতলা এবং কখন কখন রক্ত-মিশ্রিত স্রোদা নির্গত হয়, যাহার স্রবণ নাসারকে ক্ষত হয় এবং উহা টাটায় ;

নাকের পাতায় আলাস্তব এবং কত হওয়ার জায় টাটানি; নাকের মধ্যে শুকাহুতব এবং ভ্রাণ শক্তির হ্রাস; বারবার ইঁচি দেওয়া এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল স্লেয়া নির্গমন।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলে ছিঁড়িয়া ফেলার জায় প্রবল বেদনা; বিশেষতঃ বাম পাশে; কর্ণের সম্মুখভাগে অবসন্ন বা তুচ্ছভূতকারী ধিল ধরার জায় বেদনা; ডাইন গালের পেশীতে বারবার ধাক্কা লাগার জায় অশ্রুভূত হওয়া এবং উহার স্পন্দন; ওষ্ঠ শুষ্ক এবং ক্ষীণ; ওষ্ঠের বহির্দেহ অঁইসের জায় অশ্রুভূত হয়; ওষ্ঠ বেদনায়ুক্ত এবং উহাতে কত হওয়ার জায় আলা এবং টাটানি (আর্স); মুখমণ্ডল প্রদাহযুক্ত এবং লালবর্ণ ও উহাতে কলতানি-বিশিষ্ট কুহুড়ী; রোগী (শিশু) চুলকাইতে চুলকাইতে মুখমণ্ডল রক্তারক্তি করে; রক্তিতে চুলকানির বৃদ্ধি (মার্ক); চুমটী (খোশা) ছিঁড়িয়া কেলিলে উহার নীচে চর্কির জায় পদার্থ বিশিষ্ট কুহুড়ী দেখিতে পাওয়া যায়; কুহুড়ীর কলতানি মুহু স্থানে লাগিলে কত হয়।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । পোকা খেকো (Carious) দাঁতে বেদনা (মার্ক); দাঁতের গোড়ায় ছিদ্র করার জায় বেদনা বাহা মাড়ির হাড়, গালের মেলার অস্থি (Malar-bone) এবং কপালের হুই পাশে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; দাঁত ভোঁতা এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা বলিয়া অশ্রুভূত হয়; জিহ্বা এবং মুখগহ্বরে প্রবল আলাস্তব বাহা পাকস্থলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (আর্স, ক্যাছ, ক্যাপ্স)। গলার মধ্য, আহারবহা গলনালী এবং উহার উপরিভাগের হুই পাশে আলাস্তব (আর্স, ক্যাছ, ক্যাপ্স, মার্ক-কর); মনে হয় যেন গলার মধ্য স্লেয়া দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে; মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে শুকাহুতব, উষ্ণ এবং টাটিয়া কেলা বা ছাল উঠিয়া যাওয়ার জায় অশ্রুভূত হয় (আর্জেন্ট-নাইট্রিক, আর্জেন্ট-মেট্, এরাম্, নাস্-বস্)।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত ক্ষুধা, অথবা ক্ষুধা একবারেই না থাকা; বারবার শ্বাসশূন্য কাঠ উদগার উঠা; গলার মধ্য হইতে যেন বমনোষেগ হয়; তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট পদার্থ বমন; পাকস্থলীতে আলাস্তব (আর্স, ক্যাক্সার, ক্যাছ, লোবিলিয়া)। স্রীধা প্রদেশে ঘৃণা-বুদ্ধি বেদনা; তলপেটের বাম পাশে সচী বিধানের জায় অশ্রুভূত হয়; উদরে অতিরিক্ত

পরিমাণে দূষিত বায়ু সঞ্চিত হইয়া গড়গড়, কলকল শব্দ হওয়া; শুষ্কবার দিয়া প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্, ব্রাই, গ্রাক্); উদরে জ্বালা এবং উকাহুতব (একন্, আস্, ক্যাহ্)।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্কের মধ্যে হুটী বিধানের জ্বায় অম্লভূত হয়; চলিবার সময় শুষ্কবারে কামড়ানীর জ্বায় জ্বালা এবং শুষ্কের মধ্যে জ্বালাহুতব; শুষ্কবারে চুলকানি (আগাম্, ক্যাক্-কার্, ব্রাই, নাক্স-বন্, ওপিয়াম্, মাল্ফ্); মল নরম, কটাবর্ণ, পচা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা দানার জ্বায় পদার্থ মিশ্রিত থাকে ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রভ্যাগের সময় মূত্র নির্গত না হইয়া রক্ত নির্গত হয় (আস্, ক্যাহ্, হামামেলিস্); \*মূত্র উষ্ণ এবং উহাতে লালচে তলানি পড়ে (বেল্, ফ্রিয়াজ্)।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের পুরুষাঙ্গের মাধার চুলকানি (মাল্ফ্); পুরুষাঙ্গে উকাহুতব এবং উহার ক্ষীতি; পুরুষাঙ্গ এবং পুরুষাঙ্গের মাধার আগাতে তীক্ষ্ণ কাঁটা বিধানের জ্বায় অম্লভূত হওয়া; অণ্ডকোব এবং অণ্ডকোষাধারের ক্ষীতি । জ্বীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে, প্রচুর পরিমাণে এবং অনেক দিন ব্যাপিয়া রক্তঃস্রাব; ডিমের লালের জ্বায় শ্বেত স্রাব নিঃসরণ (আমন্-মিউর, ক্যাক্-ফন্, বোরাক্স্, বোবিষ্টা)।

শ্বাস যন্ত্র । স্বরভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশি ও বৃকের মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বায় অম্লভূত হয় (কষ্ট্, নাক্স-মফ্, ফন্); আহ্বারের পর কাশিতে কাশিতে বমন এবং যে পর্য্যন্ত বমন না হয় সে পর্য্যন্ত কাশি থামে না; বমন করিয়া থাকিলে প্রবল কাশি (কোনায়াম্, পাল্ফ্); বায়ুনলের নিয়ন্ত্রণে হৃৎস্পন্দী বা খুশ্-খুশির দরুণ কাশির প্রবল ইচ্ছা; কাশিলে গলা দিয়া কোন পদার্থই নির্গত হয় না । বৃকের মধ্য দিয়া আড়াআড়ি আঁটাবোধ এবং সঙ্কোচন; বৃকের মধ্যে হুটী বিধানের জ্বায় অম্লভূত হয় (ব্রাই, ক্যানী-কার্)।

নাড়ী । নাড়ীভঙ্গ (Intermittent) (কোনায়াম্, ডিজিট্, নেট্রাম্-মিউর), পূর্ণ, বিস্তৃত বা ষ ১ এবং কঠিন।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবার বহির্দেশের পেশী শক্ত হওয়ার

দক্ষণ ঘাড় সকালনে অভ্যন্ত বেদনানুভব; স্বন্ধের পেশীতে বাতের স্তায় বেদনা; উরু পেশীগুলি ক্ষীত এবং বিস্তৃত বা ফসিয়া ধরায় স্তায় অচ্ছত হওয়ার দরুণ উহা সকালনে অশক্তি ।

**অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি ।** অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন (ককিউল, কোনারাম্, জেলুম্) ; নখা অস্থি, বিশেষতঃ পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক অস্থির আবরক পর্কার (Periosteum) বেদনা, রাত্রিতে এবং শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; উহাতে সামান্য চাপ বা স্পর্শও সহ হয় না; আর্জ বা শেথশেথিয়া বায়ুতে বেদনাদির বৃদ্ধি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গরমীর ব্যারাম জনিত বেদনা (মার্ক্); ডাইন স্বন্ধের সন্ধিতে বেদনা; আঙ্গুলের অগ্রভাগে যেন কোন শক্তি থাকে না, যাহার দরুণ কোন বস্তু ধরিতে পারা যায় না। কুঁচকি বা উরু এবং হাঁটুর সন্ধিতে ঝাকনির স্তায় যাতনা; উরু এবং পায়ের হাঁড়ে বেদনা; পায়ের পাতার হাঁড়ে প্রবল বেদনা ।

**চর্ম্ম ।** বহুতের অস্থখ জনিত বৃক এবং বাহ্যতে দাগ গুলি কাল হয় এবং উহা হইতে ছাল উঠে; গায় লাল কুস্কড়ী যাহা অভ্যন্ত চুলকাই, বিছানার এবং স্পর্শনে যাহার বৃদ্ধি হয়; কুস্কড়ীতে জ্বালা এবং চুলকাইলে কুস্কড়ী অস্ত্রহানে সরিয়া পড়ে (আলাম্, মার্ক্, সাল্ফ্); শরীরের যে যে স্থান চাড়ের দরুণ উঁচু হইয়া থাকে, সে সকল স্থানে ক্ষত হয়; ক্ষত হইতে সহজেই রক্ত পড়ে (আসাকিউডা, হিপ্-সাল্ফ্), রাত্রিতে অভ্যন্ত বেদনানুভব হয় এবং টাটার (মার্ক্); পুরু সাদার অভ্যন্তুর হরিদ্রাবর্ণের পাঁচড়া, গাছার নীচে গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণের পুঁক জন্মায়; ক্ষতের চতুর্দিকে জাগাত্মক চুলকানি বিশিষ্ট কোষার স্তায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুস্কড়ী (হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্); গায়ের স্থানে স্থানে উঁচু সাদা পাঁচড়া ।

**নিদ্রা ।** নিদ্রার অনিবার্ণ ইচ্ছা (অণ্টি-টার্ট্ এণিস্, নাক্স-মফ্) ।

**স্বপ্ন ।** সমুদ্র শরীরেই অনবরত নীতবোধ; নীতবোধ, অথচ কোন প্রকারের উত্তাপ গায় লাগানের ইচ্ছা থাকে না, অথবা বহির্বাযু গায় লাগারও ভয় থাকে না; অভ্যন্ত পিপাসা; অঙ্গ এবং শরীর অভ্যন্ত উষ্ণ ।

**ব্যবহার ।** পানবার (Mercury) ব্যবহার জনিত অস্থখ; অস্থি এবং উহা আবরক পর্কার (Periosteum) অস্থখ; গাঙমাগা জনিত অস্থখ;

গরমীর ব্যারাম জনিত অস্থি; শ্বেত প্রদর; প্রমেহ রোগ, ফোঁকার জ্বর এবং হামের জ্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুস্কুড়ী; ক্ষত; মায়ুল; বিসর্প (Erysipelas); বাতরোগ; দন্তশূল; পারার অপব্যবহার বা গরমীর ব্যারাম জনিত অস্থি-পোকায় ধরা (Caries) ইত্যাদি অস্থিতে মেজিরিয়াম্ ব্যবহার্য্য।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।** শরীরে অত্যন্ত পাতলা বোধ হয় (আসেরাম্); শরীরের স্থানে স্থানে উষ্ণ বোধ এবং ঝাঁকনী ও স্থলী বিধানের জ্বালা মাতলা; সমুদয় সন্ধিতে ধৈর্য লিয়া যাওয়ার জ্বালা বেদনা এবং শ্রান্তি বা অবশ বোধ; সমুদয় শরীরে অনবরত শীতবোধ; ঠাণ্ডা বাতাস একবারেই সহ্য হয় না; শরীরের এক পার্শ্বই সচরাচর অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে; সন্ধ্যার সময়, রাত্রিতে, স্পর্শনে বা আঘাত লাগিলে, নড়া চড়াতে, শেতশেষতিয়া বাতাসে অস্থির বৃদ্ধি এবং বহির্বাযুতে চলিয়া বেড়াইলে, মাথা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে এবং অন্ধকাব ঘরে অস্থির উপশম ইত্যাদি মেজিরিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্য পরিগণিত।

**সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ ।** আনাকাডিম্বাম্, গোয়েকাম্, ফাইটোলাকা এবং রাস্টুল্লের কার্যের সঙ্গে মেজিরিয়ামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাকেরিয়া-কার্ল, ইগ্নেনিয়া, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউ-রিয়াম্, নাইট্রিক্ আসিড্, নাক্স-বমিকা, কফরাস্, পালসেটিল্লা, সিপিগা এবং সালফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

**প্রতিষেধক ঔষধ ।** আসিটিক্ আসিড্, ব্রাইওনিয়া, ক্যাকেরিয়া কার্ল, ক্যান্ফার, নাক্স-বমিকা, মার্কিউরিয়াম্, রাস্টুল্জ্ ইত্যাদি মেজিরিয়ামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

**ডাইলুশন বিচার ।** ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও কখন কখন ব্যবহৃত হয়। কোন কোন চিকিৎসক ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

## (নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্,—নেট্রাম্-মিউর) ।

(NATRUM MURIATICUM,—NATR. MUR.)

কোন এক বিশ্বস্থ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে পরিকৃত আদত নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্ (পরিকৃত লবণ) ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে উহাতে অঙ্গার অব্ মিঙ্ মিলাইয়া ১ম হইতে ৩য় শতভাগিক ক্রম পর্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হয়। ৩য় শতভাগিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ শতভাগিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। চূয়ান জলে যথা নিয়মে ইহার প্রথম দশমিক ক্রমের আরোক ও প্রস্তুত হইতে পারে। ২০° ডিগ্রী ওয়ার এক্ স্পিরিটে যথা নিয়মে ইহার ১ম শতভাগিক বা ২য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় এবং ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। রক্ত, লিম্ফেটিক গ্রন্থি (Lymphatic glands) পরিণাক কার্য সম্বন্ধীয় বস্তুর যোজক শৈল্পিক বিলী এবং বহুত ও স্রীহার উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। ইহা রক্তকে বিকৃত করে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যদি উত্তেজনা অধিক হয়, তবে উক্ত উত্তেজনা প্রবাহে পরিণত হইয়া ফার্কির জ্বর (Scorbutic) আকার ধারণ করে এবং তদ্বর্ণ চর্মে অনেক প্রকারের ক্ষত এবং ফুস্ফুড়ী প্রকাশ পায়, শৈল্পিক বিলী এবং গ্রন্থিতে ধ্বংস-কারক প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া ফার্কির জ্বর রোগের স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেক কাল ব্যাপিয়া সবিরাম বা পালাজর থাকিলে যেতন হয়, শরীরের সেক্ষণ অবস্থা উৎপাদন করা লবণের এক বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি বোধে পরিগণিত। এই জন্তই পুরাতন আকারের সবিরাম বা পালাজরে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্লদা বিষর্ এবং নিস্তদ্ধতাব; দুঃখিত থাকা এবং কীনা (নাক্ দক্ষ, পাল্‌স্, ইগ্‌নেস্, রাস্‌টক্), সাধনা বা প্রবোধ বাক্যে বাহ্যিক হুঁকি হয়; অত্যন্ত খিট্‌ খিট্‌ বা চিট্‌ চিট্‌ করা এবং সামান্য কারণেই রাগাধিত হওয়া (রাট্‌, কাম্‌, নাক্‌-বম্‌); কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে



কষ্টানুভব ; অন্তমনকতা ; সরণ শক্তির দুৰ্জলতা বা হ্রাস (আগ্‌নাশ্, আদ্রা-  
আনাকার্ড্, ক্রিফাজ্, ল্যাক্, মার্ক্, নাক্স-মক্, কস্-আস্) ; সহজেই বারম্বার  
চমকিয়া উঠার স্বভাব (কোনোরাম্, ইগ্‌নেস্) ।

মস্তক । বিছানা হইতে উঠিবার সময় মাথাঘোরা (ক্যালী-ব্রাই) ;  
মাথার খালি বোধ (ককিউল্, কোরেলিয়াম্, সিপিরা) ; মাথাঘোরা এবং  
উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার চিমাবোধ এবং চক্ষুর সম্মুখে পানীর ডানা কাড়ার  
জায় ধড়্‌ধড়্‌ করা (বেল্) ; মাথার ভারি এবং চিমাবোধ (ক্যাপ্, চারনা) ;  
মাথা ধরা, যাহার দরুণ মস্তক হক্ যেন মাথা কাটিয়া যাইবে (ব্রাই, মার্ক্,  
পাল্‌স্) ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিলেই মাথা ধরে (ক্যালী-ব্রাই, নাইট্রিক্-  
আস্, নাক্স-বম্) যাহা বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে ; ইচ্ছিলে বা  
কাশিলে মাথা ধরা, চাপিলে যাহা থাকে না ; মাথার চাপিয়া ধরার জায়  
অবসরকারক ধূশ্‌বশে বেদনা ; মাথার দপ্‌দপানি বা স্ফূটী বিধানের জায়  
অনুভূত হয় যাহা গ্রীবা বা বুক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; মাথার উষ্ণানুভব এবং  
উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল লালবর্ণ, বমনোদ্বগ এবং বমন ; কপালে উজ্জ্বর  
চক্ষের উপরিভাগে চাপিয়া ধরার জায় প্রবল বেদনা ; মাথার চুল পড়িয়া  
যায় (গ্রাফ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, পিট্রোল্, কস্, সিপিরা, সাল্‌ফ্) ;  
মাথা অত্যন্ত টাটায় (চায়না, নাইট্রিক্-আস্, মার্ক্, মেজিরিয়াম্) ; ঘাড়ের  
বে অংশ পর্য্যন্ত চুল থাকে, সে অংশ পর্য্যন্ত চুলকানি বিশিষ্ট ক্ষুদ্রী ; কপালে  
দপ্‌দপিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বগ বা বমন, যাহা প্রাতঃ-  
কালে বৃদ্ধি হয় এবং শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার উপশম হয় ; মাথার ঠিক  
উপরিভাগে জ্বালানুভব (সাল্‌ফ্) ; জ্বীলোকের রজঃস্রাবের সময় কোন এক  
নির্দিষ্ট সময়ে (Periodical) মাথা ধরা ।

চক্ষু । কুয়াশা বা পাতলা কাপড়ের মধ্য দিয়া তাকাইলে ক্ষেপ  
হয়, চক্ষে সেরূপ কাপা দেখা (কষ্ট, ক্রোকাশ্, পিট্রোল্, কস্, সাল্‌ফ্,  
সাইলিসি) ; বস্তগুলি কাপা দেখায় ; পুস্তকের অক্ষর গুলি অত্যন্ত কাপা  
দেখায় (সাইলিসি) ; সৰ্ব্বদা যেন চক্ষুর সম্মুখে আঙণের কণা ভাসে (সাই-  
ক্রেমেন্, মার্ক্, সাল্‌ফ্) ; দেখিতে দেখিতে চক্ষু যেন অন্ধকার হইয়া আইসে  
(কস্, রুটা, সিপিরা) ; চক্ষু প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া

(একন্, বেল); কোন বস্তুর পানে এক দৃষ্টে তাকাইলে চক্ষে চাপাবোধ; বার্ণি প্রবেশ করিলে ঘেঁষণ হয়, চক্ষে সেরূপ অস্বভূত হয় (আর্স, কষ্ট, ইণ্ডেনস্, সালফ); চক্ষে অগ্নাহতব এবং চিড়িক মারা (নাক্স-বম); চক্ষে আলোক সহ্য হয় না; চক্ষুর পাতার প্রান্ত লালবর্ণ, প্রণাহযুক্ত এবং অগ্নায়ুক্ত; প্রাতঃ-কালে চক্ষুর পাতার পাতার লাগিয়া থাকে (আগাম, গ্রাফ, লাইকোপ্, পালম্, সালফ); চক্ষুর মধ্যে বেদনা এবং জ্বালা; চক্ষুর সঞ্চালনের সময় চক্ষুর পাতার পেশীর কঠিনতা বাহ্য অনেক সময় সার্ভাদিক পেশীর দুর্বলতা বা কসেঙ্ককার উত্তেজনার দরুণ ঘটয়া থাকে; দৃষ্টিহীনতা এবং অন্ধতা (Amblyopia and Amaurosis); বৃত্তিকাপা ফুরাগাক্রান্ত জীলোকের রজঃপ্রাবের বৈলক্ষ্য্য হেতু চক্ষুর তারা সঙ্কচিত হওয়া; চক্ষুর পাতার প্রদাহ (Blepharitis); কর্ণিয়ার ক্ষত (Ulceration of the Cornea); চক্ষে জ্বালা এবং চিড়িক মারা; চক্ষু দিয়া উগ্র ক্ষতকারক জল পড়া; চক্ষে আলোক সহ্য না হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর পাতা আক্ষেপিককপে বদ্ধ হইয়া আইনা; চক্ষুর পাতার স্নায়ুশূল, স্বর্ষ্য উদয়ে যাহার উদ্বেগ হয় এবং স্বর্ষ্যাস্তে যাহা স্তব্ধীভূত হয়; চক্ষুর জ্বলোৎপাদক বা জল নিঃসারক নালীর সঙ্কোচন; নেত্র-নালী এবং চক্ষু দিয়া প্রচুর স্লেমা বা পুঁয়ের ন্যায় রস (কেতুর) নিঃসরণ; লুনার কষ্টিক (Lunar Caustic) দ্বারা কুচিকিৎসা জনিত চক্ষু দিয়া জ্বালা উৎপাদক, ক্ষতকারক জল নিঃসরণ।

**কর্ণ ।** কর্ণ শূল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানের মধ্যে স্থচী দিধানের ন্যায় অস্বভূত হয় (ক্যাস্, চায়না); কানের মধ্যে গানের ন্যায় শব্দ হওয়া এবং টন্টনানি; কানের মধ্যে টন্টন, গুন্গুন, অথবা বজ্জ্বজ্ শব্দ হওয়া (চায়না); কানে কম শুনা; কান দিয়া পুঁয় পড়া (গ্রাফ, হিপ্-সাল্ফ, মাক্)।

**নাসিকা ।** নাকের বায়ু অংশের প্রদাহ এবং ফীতি, স্পর্শনে বাহ্য অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয়; সামাজ্য কারণেই সর্দি লাগে; নাকের হাড়ে ছিদ্র করার দ্বারা বেদনা; তরল সর্দি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল স্লেমা নির্গমন অথবা নাক শুষ্ক এবং বদ্ধ হইয়া থাকে; বারম্বার হাঁচি হওয়া; তরল সর্দি এবং তদ্রূপ ঘ্রাণ শক্তি বা স্বাদ থাকে না।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ (চেনিডন্, হিপ্পোলাক্, সিনিয়া); ঠেঁজ মাথাইলে যেরূপ হয়, মুখমণ্ডল সেরূপ টলটলে বা চক্‌চকে হয়; বাম গাল লালবর্ণ; ওষ্ঠ-উচ্চ ও শুক, বা কাটাযুক্ত; উপরের ওষ্ঠ ক্ষীত (ক্যাক্স-কার্ক); গোঁপ (মোছ) পড়িয়া যায়; ওষ্ঠের চতুর্দিকে টেটোরের (Tetter) ভায় কুস্কড়ী বাহির হয় (আন্টি-কুড, লাইকোপ্); কোন নির্দিষ্ট সময়ে মুখমণ্ডলে বেদনা বা ত্রায়শূল, বিশেষতঃ সবিরাম বা পালাজ্বর বন্ধ হওয়ার পর; মুখমণ্ডল রক্তশূল; অত্যন্ত পিপাসা ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মাড়ি ক্ষীত হয় এবং উহা হঠাৎ সহজে রক্ত পড়ে (কার্কো বেজ, মার্ক, ফস্, নাইটিক্-আস); মুখগহ্বরের মধ্য ও ওষ্ঠে লাগু দানায় ভায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোকা, সবিরাম বা পালাজ্বরেই বাহা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; জিহ্বা অধিক শুক হয় না, অথচ রোগী জিহ্বার অত্যন্ত শুকাইয়া পড়ে; এক গ্রাহি চুল লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, জিহ্বার সেরূপ অহতুত হওয়া (সাইলিসি); দন্তনালী; জিহ্বা শুষ্ক এবং লক্ক হয় বা উহা নোয়ান যায় না; মুখের মধ্যে এবং জিহ্বার ফোকা এবং ক্ষত হয় (লাইকোপ্, মিউর-আস); মুখে আহার্য দ্রব্যাদি লাগিলেই অত্যন্ত জ্বালা করে এবং চিড়িক মায়ে; মুখে তিক্ত স্বাদ, (ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্, গাল্‌ক্); মুখে লোনুতা স্বাদ (মার্ক); মুখে একবারেই স্বাদ থাকে না (পাল্‌স্); জিহ্বার ভারিবেধ, বাহার দরুণ কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয় (মিউর-আস, নাক্স-বম্); জিহ্বার ফোকার ভায় কুস্কড়ী (মিউর-আস); জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত (আন্টি-কুড) । গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি; ডেলার ভায় কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ অহতুত হয় (হিপ্পোলাক্, বেল্‌, নাক্স-বম্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে ছাপ উঠিয়া যাবার ভায় জ্বালা অনুভব; গলা থেকুর দিলেই লোনুতা স্বাদের স্লেয়া নির্গমন; কোন দ্রব্য গিলিবার সময় যেন গলনালী বন্ধ হয়; গ্রীবার গ্রন্থির ক্ষীতি ।

শ্বাসকস্থলী এবং উদর । অতিরিক্ত শ্বাস; আহারের পর অত্যন্ত প্রাণিবোধ এবং ঘুমাইবার ইচ্ছা; আহারের পর উদগার উঠা; শ্বাস শূন্যতা (আন্‌, ক্যাক্স-কার্ক, চায়না, গাল্‌ক্‌, অত্যন্ত প্রবল হিকা; কঠিতে অকঠি,

বমিচ রোগীর পূর্বে কটি খাইতে অত্যন্ত ভাল লাগিত (লাইকোপ্, সাই-  
ক্রেমেন, নাস্-বম্); কাফিতে অরুচি (লাইকোপ্, কস্-আন্); ভাতাকু  
খাওয়ার অত্যন্ত ঝাকা সত্যও তামাকে অরুচি; অনিবার্য অত্যন্ত প্রবল  
পিপাসা (একন্, আস্, ব্রাই, রাস্-টঙ্ক্); বমনোবেগ এবং বুক জালা (লাই-  
কোপ্, নাস্-বম্); পাকস্থলীতে খিল ধরার জ্বাশ সঙ্কোচক বেদনা; পাক-  
স্থলীতে পূর্ণ এবং জালাহুতব; পাকস্থলীর মধ্যে অত্যন্ত চাপা বোধ বাহ্য  
স্পর্শনেও অত্যন্ত বেদনামুক্ত হয়; আহারের পর পাকস্থলীতে বদনপানি;  
পাকস্থলীর হৃৎপ্রদেশের নিকটবর্তী মুখে এবং বক্ষস্থির পশ্চাৎভাগে ডেলার  
জ্বাশ কোন পর্য্যায় লাগিয়া রহিয়াছে এক্রপ অম্লভূত হয়; মুখে টক স্বাদ; তিক্ত  
ত্রব্য খাওয়ার স্পৃহা (হিপ্-সাল্‌ক্); উদরস্থ আহার ত্রব্যাদি টক হইয়া গলা  
দিয়া উঠিয়া পড়ে (ল্যাক্, কস্); লবণ খাওয়ার ইচ্ছা (ক্যাক্-কার্ক্); আহা-  
রের পর (ক্লীলোকের) বুক জালা (ক্যাক্-কার্ক্, ক্রোকোশ্); প্রথমতঃ উদরস্থ  
আহার ত্রব্য এবং তৎপর পিত্তবমন। বক্রত প্রদেশে সূচী বিধানের জ্বাশ  
বেদনা বা কদিয়া ধরা (আস্, ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক্, ক্যালী-কার্ক্, মাক্,  
নাস্-বম্, সিপিয়া); গ্রীহা প্রদেশে উক্ত প্রকারের বেদনা (নেট্রাস্-কার্ক্,  
সাল্‌ক্); উদরের ডাইন পার্শ্বে চিনুচিনে বেদনা; উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত;  
উদরে গড়গড়, কলকল শব্দ হওয়া এবং উহার মধ্যে দূষিত বায়ুর সঞ্চার  
(লাইকোপ্, চায়না)।

মল এবং মলছার। কোঠ বহু এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্কহারে  
সঙ্কোচনের জ্বাশ অম্লভূত হয়; মল কঠিন, শুষ্ক এবং টুকরা টুকরা নেড় বাহ্য  
অতি কষ্টে নির্গত হয় (আমিন্-নিউর) এবং বাহ্য নির্গত হওয়ার সময় শুষ্ক-  
হার কাটিয়া যায় (নাইটিক্-আস্) এবং তৎকরণ রক্ত পড়ে ও শুষ্কহারে ক্ষত  
হওয়ার জ্বাশ জালিকরে এবং বেদনামুক্ত হয়; শুষ্কের মধ্যে চুলকানি এবং  
সূচী বিধানের জ্বাশ অম্লভূত হয়; কঠিন মলত্যাগের পর শুষ্ক হারে জালাহু-  
তব; পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোঠবহু (আপ্টি-ক্রুড্, সিনিসিক্, নাস্-  
বম্, পডোক্); বেদনাহীন জলবন্তরল ভেদ (আস্, চায়না, পডোক্);  
কেবল দিনের বেলা জলবৎ ক্ষতকারক উদরাময় (পিট্টোল্); মলত্যাগের  
সময় এবং উহার পর শুষ্ক হারে জালাহুতব (আস্, ক্যাক্, আইরিস্)।

**মূত্রযন্ত্র ।** মূত্রত্যাগের সময় এবং উহার পর মূত্রনাশী দিয়া স্নেহায়  
মায় পদার্থ নির্গমন (মাক্-কর) ; মূত্রত্যাগের পর মূত্রনাশীতে আলা এবং  
কর্জনবৎ বেদনা (ক্যাঙ্ক) ; চাপিলে মূত্রনাশীতে অত্যন্ত কষ্টদায়ক টাটানি ;  
বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং প্রচুর পরিমাণে কিকা রক্তবিশিষ্ট জলবৎ মূত্র-  
ত্যাগ ; মূত্র মলিন এবং ঘোলাটরা ; চলিবার সময়, কাশিবার সময়, অথবা  
হাসিবার সময় অগাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্র নির্গমন (কই, পাল্‌স্, জিক্) ;  
মূত্রে ইটের গুঁড়ার ন্যায় তলানি পড়ে (আণিকা, চায়না, লাইকোপ্, কল) ;  
মূত্রে লাল বাণির কণার মায় তলানি পড়ে (লাইকোপ্) ।

**জননেদ্রিয় ।** পুরুষের পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চর্মের প্রস্ফা  
এবং শ্ৰীতি (Phimosis) ; স্ত্রীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু স্ত্রীসহবাসের  
সময় পুরুষাঙ্গে শক্তি থাকেনা ; অগুরুষাধার এবং উহার নীচে অত্যন্ত  
চুলকানি । প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্ত্রীলোকের বোনিয়ার দিয়া যেন জরায়ু  
ঠেলিয়া বাহির হওয়ার উপক্রম হয়, বাহার দরুণ রোগী যোনি দ্বার চাপিয়া  
বসিতে বাধ্য হয় (বেল্, প্রাটিনা, লিলিয়াম্, সিসিয়া) ; নিরবিত সময়ে  
অনেক পূর্বে অতিরিক্ত পরিমাণে এবং অনেকদিন ব্যাপিয়া রজঃস্রাব ;  
রজঃরোধ (একন্, সিমিসিক্, পাল্‌স্) ; যোনি ইত্যাদিতে চুলকানি (ক্যাঙ্ক্,  
কোনায়াম্, মাক্) ; গোণে রজঃস্রাব এবং রজঃস্রাব যত গোণে হয় ততই  
পরিমাণে অল্প হয় (পাল্‌স্) ; রজঃস্রাবের সময় রোগী অত্যন্ত বিষম এবং  
জ্বাখিত থাকে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জ্বৎস্পন্দন এবং প্রাতঃকালে মাথা ধরা ;  
কতকারক, সবুজ বর্ণের দ্বৈত প্রদর নিঃসরণ, চলিয়া বেড়াইবার সময় বাহা  
অগিক নির্গত হয় (বোবিট্টা) ।

**শ্বাস যন্ত্র ।** প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ ; বায়ুনের উপরিভাগে স্নেহা  
সঞ্চিত হওয়া ; প্রাতঃকালে কাশি ; সন্ধ্যার সময় বিছানায় শয়ন করিলে  
কাশি ; চোক গিলিলে কাশি ; গলার মধ্যে স্ফুঁস্ফুঁর দরুণ কাশি ; কাশির  
সঙ্গে সঙ্গে কপালে ফাটিয়া বাওয়ার ন্যায় বেদনা (ব্রাই, নাল্‌বন্) এবং  
হাঁপানির ন্যায় শ্বাসকষ্ট ; কাশিতে কাশিতে উদরস্থ আহার জ্বায়াবি বমন ;  
কাশির সঙ্গে সঙ্গে গুরু নিঃসারক মূত্রে বেদনা ; বুকে হঠাৎ বিধানের ন্যায়  
(ব্রাই, ক্যালী-কার্ক্) বা টন্টনিয়া বেদনা (আণিকা, ব্যারাইটা-কার্ক্, কল,

নাক্স-বম্ব, ট্যানিস); বৃক্কের ডাইন পার্শ্বের পেশীতে বাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; নিশ্বাস টানিবার সময় বা কাশিবার সময় বৃক্ক হুচী বিধানের ন্যায় বেদনা (ব্রাই, লাইকোপ্, পাল্‌স)।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপিণ্ড যেন ঝড়ফড় করে (লিলিয়াম টাইজি); নীচের ঘর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠার কালীন হৃৎস্পন্দন; বাম পার্শ্ব শরন করিলে হৃৎস্পন্দন (নেট্রাম-কার্ক, কদ); হৃৎ-প্রদেশে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হুচী বিধানের ন্যায় বেদনা (ব্রাই, কাক্ট্, ক্যালী-কার্ক); হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ীর কার্যঃঅসম (Intermittent) (কোনোরাম্, ডিজিট্, ক্যালী-কার্ক), সামান্য নড়াচড়াতেই হৃৎস্পন্দন (ডিজিট্, আরোড্)।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। ভাঙ্গিলে যেকণ হয়, কোমরের পশ্চাৎ-দেশে সেরূপ বেদনা (আলোক্, বেণ্, মিথিসিক্, নাক্স-বম্ব); পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কোন কঠিন তৌষকাদির উপর শরন করিয়া থাকিলে ঘাতের উপশম হয় (রাস্-টজ্); গ্রীবা শক্ত হয় বা উঠা নোয়ান যায় না; গ্রীবা এবং শাখার পশ্চাৎভাগে হুচী বিধানের জ্বাঘ অশুভূত হয়; প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিলেই কোমর সকালন কবিবাবে অশক্তি; কোমরের পশ্চাৎদেশে লপ্পলপনি।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। বাহ্যতে চর্মলবোধ এবং উহাতে পক্ষাবতের জ্বাঘ তারিবোধ; লিখিবার সময় হাত কাঁপে (জিক্); হাতের চর্ম, বিশেষতঃ নখের চক্ঃপার্শ্ববর্তী স্থান, শুষ্ক এবং কাটাশূন্য; নখ বীকা হয় বা চমড়িয়া পড়ে (সাল্‌ফ্, যুজা); মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁচ-লিয়া গেলে বেক্রপ হয়, বাড়র উর্দ্ধাংশে সেক্রপ বেদনা; হাত পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গের চর্মলতা এবং কাঁপনি; কুঁচ্কির সন্ধিতে হুচী বিধানের জ্বাঘ বেদনা; উরুদেশ, হাঁটু এবং পায়ে কসিয়া ধরার জ্বাঘ বেদনা; পা এবং পায়ের পাতার অত্যন্ত ভারিবোধ; চলিবার সময় পায়ের ভিত্তের পেশীতে বাটিয়া ধরা; হাঁটুর পশ্চাৎদেশে বাটিয়া ধরার জ্বাঘ অশুভূত হয় (আমন্-মিউর); চলিয়া থাকিলে বা চলিয়া বেড়ানোর সময় পায়ের পাতার সন্ধি সকালনের শক্তি থাকে না; পা এবং পায়ের পাতার অস্থিরতা, বাহ্যর দৃকণ

রোগী অনবরত পা নাড়িতে বাধা হয় (জিক্) ; বায় পায়ের পাতার খিল-  
ধরা বা স্ফুটী বিধানের ভ্রায় বেদনা বা যাতনা ; পা এবং পায়ের পাতার  
অত্যন্ত ভারিবোধ ; পায়ের পাতা ক্ষীত (আস্, চায়না) ।

চর্ম্ম । চর্ম্মে চুলকানি এবং কুট্ কুটানি ; শরীরের স্থানে স্থানে আয়-  
বাতের ভ্রায় লাল কুস্কড়ী যাঁহা অত্যন্ত চুলকার ; শারীরিক পরিশ্রমের পর  
গায় আমবাত বাহির হয় ; গায় দাঁদের ভ্রায় গোলাকার কুস্কড়ী (সিপিরা) ;  
গায় টেটায়ের (Totter) ভ্রায় কুস্কড়ী এবং উহা হইতে ক্ষতকারক কল্কতানি  
পড়ে ও উহাতে পুষ্ক চুমটী পড়িয়া কাটিয়া যায় ।

নিদ্রা । মিনের বেলা নিদ্রাবেশ বা ঝিমান এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে  
বারবার হাঁট তোলা (নেট্রাক্কার্ক) ; রাত্রিতে নিদ্রা শূন্যতা ; ঘুম ভাল হয়  
না এবং শয়ন করিলেই নানা প্রকারের চিন্তাব উদ্বেক হয় ; ঘুমের ঘোরে  
কীলা (নাইটিক্-আস্) ; ঘুমের ঘোরে চিন্তা উৎপাদক স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা ;  
ঘুমের ঘোরে কথা বলা এবং অত্যন্ত অস্থিরতা (সিপিরা, সান্ফ্) ।

জ্বর । শীতলাবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল (ব্রাই) ; আত্যন্তিক অধিক  
শীতবোধ ; হাত এবং পায়ের পাতা বরফের ভ্রায় শীতল (জেল্‌স্) ; সমুদয়  
শরীরে এবং কপালে উষ্ণাভাব, নাকের গোড়ায় চাপাবোধ এবং প্রবল  
পিপাসা ; পূর্বাঙ্ক ১১টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত শীতবোধ ; পায়ের পাতা বা  
কোমরের পশ্চাৎভাগে শীত আরম্ভ হয় ; নখ নীল বর্ণ ; পিপাসা ; মাথা ধরা,  
বাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে ; বমনোদ্বেগ এবং বমন ।  
উষ্ণাবস্থায় প্রবল শিরঃপীড়া এবং পিপাসা, পৃষ্ঠদেশে শীতবোধ এবং বোগল  
ও পায়ের পাতার তলায় ঘর্ম্ম ; প্রচুর ঘর্ম্ম, সামান্য নড়াচড়াতেই বাহ্যিক  
উদ্বেক হয় (ক্যাক্-কার্ক্, হিপ্-সাল্‌ফ্, ফস্) ; রাত্রিতে ঘর্ম্ম । জ্বরের বিরাম  
কালীন বহুত প্রদেশে স্ফুটী বিধানের ভ্রায় বেদনা, অলসবোধ বা পা মাটি  
মাটি করা, শীর্ণ বা ক্লম হওয়া, স্খাঙ্কতি ফিকা বা শিটা ; কৃদা শূন্যতা ; ওষ্ঠে  
জ্বর-কোকা পড়ে । নাড়ী অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে, বিশেষতঃ বাহ্য  
পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিলে ; সর্ব্বদা শীতবোধ এবং শরীরের স্বাভাবিক  
সস্তাপের অভাব (গেডাম্) । পালাজ্বর, শীতবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে  
পিপাসা, তৎপর জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পিপাসা এবং প্রবল

করিতে হয় (আম্বা, কন্-আন্, সিনিয়া); পড়িতে পড়িতে, বাহা পড়া যায়, ভাহার ভাব ভুলিয়া যাওয়া এবং ঘুম পাওয়া; মনের মধ্যে ভাবের গোল-মাল হয়; কথা বলিবার সময় বা লিখিবার সময় অসংলগ্ন কথা বা শব্দ ব্যবহার করা (কাম্, লাইকোপ্); মরণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ (আম্বা, আনাকার্ড, ল্যাক, মার্ক্); নেসা হইলে বেক্রপ হয়, সর্কদা সেক্রপ ঘূমের ভাব (ওপিয়াম)।

**মস্তক ।** নেসা করিলে বেক্রপ হয়, সেক্রপ মাথা ঘোরা (ককিউলাস্, লেডাম্, মেল্লিরিয়াম্); বসিয়া থাকি কালীন মাথা সমুখ দিকে হেলিয়া পড়ে; মাথায় পূর্ববোধ এবং বিস্তৃত হওয়ার ভ্রাস অহুভূত হয়, কিন্তু উহার দক্ষণ কোন প্রকারের যাতনা অহুভূত হয় না; মাথা বেন অত্যন্ত বড় বলিয়া অহুভূত হয় এবং অনিচ্ছা পূর্বক বেন চতুর্দিকে ঘোরে, যাহার দক্ষণ রোগী হাত দিয়া ভাহার মাথা ধরিয়া রাখিতে বাধ্য হয়; মাথায় বেদনা বা যাতনা হীন মণ্-দপানি (মোনথেন্, পাল্-স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘূমাইতে ভয়ের উল্লেখ হওয়া; কপালের দুই পার্শ্বে বেদনা, যাহার দক্ষণ মনে হয় বেন মস্তক ঢলঢলে হইয়া চলিবার সময় মাথার ছাড়ের মধ্যে হঠাৎ ধাক্কা লাগে (চায়না, হারোস্, রাস্-টক্স্); কপালের বাম দিকের উচ্চ স্থানের কোন এক নির্দিষ্ট অংশে চাপিয়া ধরার ভ্রাস বেদনা, অধিক থাকিলে বেক্রপ হয়, যাওয়ার পর সেক্রপ মাথা ধরা (নিক্স-বম)।

**চক্ষু ।** চক্ষে শুকাহুভব, যাহার দক্ষণ অতি কষ্টে রোগী চক্ষুর পাতা সঞ্চালন করিতে পারে; অন্ধতা এবং তৎপব মূর্ছা; বস্তগুলি স্বভাবিক অপেক্ষা অনেক বড় দেখায় (হাইডোস্) বা অনেক দূর দেখায়, অথবা স্বভাবিক অপেক্ষা অনেক ছোট দেখায় (প্রাটিনা)।

**মুখমণ্ডল ।** মুখমণ্ডল শিটা বা কিকা; চক্ষু নীল রেশা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য ।** মুখে চা খড়ির ভ্রাস বাদ; আহা-য়ের সময় গীতে বেদনা (কার্কো-আনিবেল্, মার্ক্); দস্ত শূল; গর্ভাবস্থার দস্তশূল; চিম ঠাণ্ডা লাগিয়া বা সঙ্ক্যা কালের ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া দস্ত শূল; মুখ গহ্বর, জিহ্বা এবং গুঠ শুক (আস্, ব্রাই), কিন্তু পিপাসা থাকে



না (এপিস, পাল্‌স্) ; মুখে লাল এবং গাঢ় রক্তাক্ত স্ফটিক ; জিহবার পক্ষাঘাত ; কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব (কষ্ট, ডাক্, জেল্‌স্, হায়োস্) । গলার মধ্যে অত্যন্ত শুষ্কানুভব, কিন্তু পিপাসা থাকে না (এপিস, ল্যাক্, পাল্‌স্) ; গিলিবার সহায়কারী পেশীর পক্ষাঘাত হেতু গিলিতে কষ্টানুভব (ওপিরাম্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত ক্ষুধা, কিন্তু পিপাসা একবারেই থাকে না (এপিস, পাল্‌স্) ; বমনোদ্বেষ্ট এবং বমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা (অ্যাক্টি-টার্ট্) ; গর্ভাবস্থায় বমনোদ্বেষ্ট বা বমন (ক্যালী-কার্ক্, পাল্‌স্, সিপিরা) ; গাড়ীতে চাপিয়া বেড়াইবার সময় বমন বা বমনোদ্বেষ্ট (ককিউল্) ; জরায়ুতে পেশারি (Pessaries) দিয়া জরায়ু স্বস্থানে রাখার দক্ষণ বমন বা বমনোদ্বেষ্ট ; পাকস্থলীতে পূর্ববোধ, যাহার দক্ষণ খাদ্য প্রস্থানের ব্যাঘাত জন্মে ; অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের দক্ষণ পাকস্থলীর উত্তেজনা । কোন প্রকারের খাদ্য বা বস্তু থাকিলে, অথবা খাদ্য পাথর সজোরে বাহির হইলে যেদ্রব হয়, দ্রুততঃ সেদ্রব চাপা বোধ ; দ্রুততঃ প্রদেশে ভারি বোধ ; উদর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং বিস্তৃত হয় ; আহারের পর উদরের ক্ষীণতা এবং বিস্তৃতি (চায়না, নেট্রাম্-কার্ক্, নাক্ষ-বম্) ; উদরে গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হওয়া, যাহার দক্ষণ মনে হয় যেন শূল বেদনা ধরিবে ।

মল । মল নরম বটে, কিন্তু উহা নির্গত হইতে অত্যন্ত কষ্টানুভূত হয় (কার্কী-বেজ্, চায়না) ; শুষ্কের জড়তা (আলাম্, ক্যাম্ফার) ; উদরস্থ অক্লীর্ণ আহার দ্রব্যের কথা বিশিষ্ট, অথবা ডিমের ঘোঁটা কুসুমের স্তার স্তরল ভেদ বা উদরাময় এবং উহার উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা শূন্যতা এবং অত্যন্ত ঘুমের ইচ্ছা বা স্খিয়ান ; গ্রীষ্মকালে শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের উক্ত প্রকারের উদরাময় ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের জীৱনবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু পুরুষাল ভালরূপ খাড়া হয় না, অথবা খাড়া হইলেও অনেকরূপ খাড়া থাকে না এবং পুরুষকে জীৱনবাসের শক্তি থাকে না । জীৱনোকের রক্তঃস্রাব নিয়মিত সময়ে হয় না, অথবা সকল বারে রক্তঃস্রাবের পরিমাণ এক প্রকার থাকে না ; রক্ত প্রায়ই কাল্‌চে এবং গাঢ় ; দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার দক্ষণ জরায়ু

ক্ষীত এবং বিস্তৃত হয়; রক্তঃস্রাবের সময় রক্তস্রাব না হইয়া উহার পরিবর্তে  
বেতঃপ্রদর নিঃসরণ; রক্তঃস্রাবের সময় পৃষ্ঠদেশে বেদনা বাহা মধ্য হইতে  
আরম্ভ হইয়া বহির্দেশে বিস্তৃত হয়; উদরের মধ্য দিয়া নিম্নদিকে কোন পথার্থ  
যেন ঠেলিয়া বাহির হইতেছে এরূপ অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে  
অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরার জ্বর বেদনা; অরাস্থিতে প্রসব বেদনার জ্বর  
আকস্মিক বেদনা ।

শ্বাসযন্ত্র । বরভঙ্গ; যেদিক হইতে শীতল বাতাস বহে, সে দিকে  
বাওয়ার দরুণ গায় ঠাণ্ডা বাতাস লাগিবা হঠাৎ বরভঙ্গ; শুক কাশি এবং  
উহার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হওয়া; শয়ন করিলে বিছানার উচ্চতাতে  
শরীর উত্তপ্ত হইয়া কাশির উদ্রেক, বুকে অঁটা বোধ বা বাতনা; আহারের  
পর শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয় ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে রক্তাধিক্য হওয়ার জ্বর  
অনুভূত হয় এবং তৎপর মাথা এবং সমুদয় শরীরে রক্তাধিক্যের জ্বর অনুভূত  
হয়; হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মার পর নিস্তা; নাড়ী ক্ষুদ্র, মুহু  
গতিবিশিষ্ট এবং তর্জল (ডিম্বিট) ।

পৃষ্ঠদেশ । তালিলে যেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎ ঘেঁষে সেক্রপ  
বেদনা (আলোজ, বেল, সিমিসিফ, নেটাম্-মিটর, ক্যালী কার্ক, নাল্-  
বন্); ঘোড়ার চাপিয়া বেড়াইবার সময় কোমরের পশ্চাৎদেশে উচ্চ  
প্রকারের বেদনা ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ । সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবলবোধ; ঠাণ্ডা বা আর্দ্র  
বাতাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং সন্ধিতে বেদনা (রডোডেড্রু); নিহারাক্রান্ত হইলে  
বা বরফে পাকিলে যেরূপ হয়, অনুলীতে সেক্রপ টনটনানি (আপারিকান) ।

নিদ্রা । সমুদয় অনুবেই নিদ্রাপ্রবেশ বা নিদ্রার ইচ্ছা বাহা বেদনা-  
দির আক্রমণের সময় অধিক হয়; অজ্ঞানবৎ নিদ্রা; নিদ্রার অনিবার্য  
ইচ্ছা (আন্টি-টার্ট, এপিদ্) ।

ব্যবহার । হিষ্টেরিয়া রোগের সূক্ষ্মার আক্রমণ; সূক্ষ্মার আক্রমণ;  
আবেশ; সূক্ষ্মরোগ; দিহিয়া, আহারবহা গলনাশী এবং চক্ষুর পাতার  
লক্ষ্যমাত; বৃত্তবৎ সূক্ষ্মা, অথচ শ্বাস প্রশ্বাস বা হৃৎপিণ্ডের কার্যের কোন

ব্যাঘাত জন্মে না (Cataplexy); গ্রীষ্মকালীর উদরাময়; কৃমি; বকুতের বিবৃদ্ধি; অজীর্ণ রোগ; গর্ভাবস্থায় বমনোদ্বেগ বা বমন; দন্তশূল; অতিরিক্ত রক্তস্রাব ইত্যাদি অস্থখে নাক্স মফাটা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সকল প্রকার অস্থখেই নিজার ইচ্ছা বা নিদ্রাবেশ; অত্যন্ত দুঃখতা এবং ক্রান্তিবোধ; সামান্য পরিশ্রমেই শ্রান্তিবোধ এবং উৎসাহ সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ; সর্পিদা মুচ্ছা বা ওয়ার ধাতু; সামান্য বেদনা যন্ত্রণাতেও মুচ্ছা বা ওয়া (হিপ্পোসাল্ফ); আক্ষেপ; হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত হওয়ার ধাতু; মূত্ররোগের আক্ষেপ এবং আক্ষেপের সময় চেতনাব্যাহার থাকে; সমুদয় শরীর ঠাণ্ডা এবং গায় ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য না হওয়া (ককিউল, হিপ্পোসাল্ফ); রক্তাক্ততা; শিশুগণের পেশী ক্লয় বা শীর্ণ হওয়া (Marasmus of children); শীত এবং আর্দ্র বাতাসে স্নান করিলে, গাড়ীতে চাপিল, আহার বা পানের পর, মদ্যাদি পানে অস্থখের বৃদ্ধি; ঘরের মধ্যে, অথবা উষ্ণ বাতাসে অস্থখের উপশন ইত্যাদি নাক্স মফাটার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। নাক্স মফাটার কার্যের সঙ্গে মফাশ, আসাকিউডা এবং আস্মার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে বেলাডোনি, ককিউলাস, কোনায়াম, ইয়েসিয়া, লাইকোপডিয়াম, নাক্স বমিকা, ওপিগাম, ফক্ষরাস, পাল-সেটিল, রাস্টক্স, সিপিগা, সাইলিসিয়া, সাল্ফার, ট্র্যামোনিয়ায়ের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার, জেলসিমিয়াম, নাক্স বমিকা।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ২য় এবং ৩য় ডাইলুশনই সচরাচর অবিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিষ্টিরিয়া, মূত্ররোগ, মুচ্ছা ইত্যাদি স্থায়িক রোগে ১ম দশমিক ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। হিষ্টিরিয়া রোগের মুচ্ছা বা আক্রমণের (Fits) সময় ইহার মূল আরোক ১০।১৫ ফোঁটা একখানি পরিষ্কার নেকড়ায় ঢালিয়া রোগীকে সোঁকাইলে মুচ্ছার আক্রমণের স্থায়ীত্ব অনেক কমিতে দেখা যায়।

## ফাইটোলাকা ডিকাণ্ড ১,—ফাইটোল

(PHYTOLACCA DECANDRA,—PHYTOL)

উত্তর আমেরিকা এবং পটুগাল হইতে গ্রিনদেশ পর্যন্ত ইউরোপের দক্ষিণাংশস্থিত প্রায় সমুদ্র দেশেই এই গাছ জন্মে। আফ্রিকা এবং বার্কেরি ট্রেটসেও ইহা জন্মিয়া থাকে। মূল বা শিকড় এবং ফল দিরা ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিকড় বা মূলের মূল আরোক ডাইলুট স্পিরিটে এবং ফলের মূল আরোক যথা নিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্রহি, প্রধানতঃ গলার মধ্য এবং স্তনের গ্রহি, নাস্তক ঝিল্লী (Serous membranes), শরীরের আঁশাল অংশ এবং স্নায়িক ঝিল্লীর উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। অস্থির আবরণক কঠিন পর্দা (Periosteum) এবং চর্মের উপর ইহার কার্য অনেকটা পারা (Mercury), আরোডাইড্ অব্ পটাস্, অথবা গরমীর ব্যারামের বিবেক জায়। ইহা সাধারণতঃ প্রদাহ উৎপাদন করে। শরীরের আঁশাল অংশে (Fibrous Tissues) এই প্রদাহ ব্যতীতবোধের প্রদাহের জ্বার আকার ধারণ করে; স্নায়িক ঝিল্লী এবং গ্রহি গুলি প্রদাহযুক্ত হইয়া উঠাতে পূর্ব এবং ক্ষত হয়। গাঢ়হলী এবং অস্থির উপরও ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, বাহার লক্ষণ বমন এবং ভেদ হইয়া থাকে।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। আপন জীবনে বৈরাগ্য বা একবারে অমনোযোগ (চারণা, সার্ক, কন্স-আস); জড় বায়ু বা সর্জন্য নিস্তক ভাবে থাকা (Melancholia) এবং রোগী বনে করে যেন সে নিস্তর ঘরিতে (একন্); সম্পূর্ণ লজ্জাহীনতা (হারোস)।

মস্তক। মাথা ঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু কম বা স্থাপনা দেবা ও তন্দ্রাকণ টলিরা পড়িয়া যাওয়ার আঁশকা; মাথার পশ্চাৎ ভাগ এবং ঘাড় বেদনা; মাথার উপরিভাগে বেদনা এবং টাটানি, ডাইন পার্কেই বাহা অধিক অগ্রসূত হয়; মস্তকের পতীরতম অংশে টাটানি; মাথা ঘরা এবং

উহার সঙ্গে সঙ্গে গা বমী বমী করা (আইরিস্, নাক্স-বম্, পডোক্, সাক্স-নেরিয়া); কপালে, চক্ষুর ভ্রু উপরিভাগেই বেদনা অধিক অনুভূত হইয়া থাকে; বেদনা প্রতি সপ্তাহেই রোগীকে আক্রমণ করিয়া থাকে (সালফ্.); মাথা ধরা মাথার সমুখ ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া পশ্চাৎ দিকে বিস্তৃত হয়; কপালে বা মাথার উপরিভাগে চাপিয়া ধরার ভ্রার বেদনা বা ব্যতনা; কপালে ভারি বোধ এবং ঘুশ্-ঘুশ্ বেদনা; একপেশে মাথা ধরা (আধকপালীয়া মাথা ব্যাধা) (পাল্‌স্.); বামচক্ষু হইতে মাথার উপরিভাগে খোঁচা বিধার ভ্রার ব্যতনা; মাথার বটনিয়া ক্যাপিটিদের ভ্রার কুতুড়ী (Tinea Capitis) (গ্রোফ্, হিপ্-সালফ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, নিপিরা)।

চক্ষু । চক্ষে চিড়িকমুরা এবং আলানুভব ও উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া প্রচুর জল পড়া (ইউফ্‌স্.); চক্ষে একটা বস্তু হইটির ভ্রার দেখার (অরাস্, বেল্, দিকুটা, ট্রামন্); বাগি প্রবেশ করিলে ঘেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ জালা এবং চিড়িক মারা (অ্যাস্, কট্, ইগ্নেস্, নেট্রাম্ দিউর, সালফ্.)।

নাসিকা । এক নাসারন্ধ্র দিয়া স্লেয়া নির্গমন এবং অপর নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া থাকা; নাকের গোড়ার কদিয়া ধরার ভ্রার অনুভূত হয় (একন্); নাক দিয়া জলবৎ তরল স্লেয়া নির্গমন এবং মধো মধো নাক বন্ধ হইয়া থাকা। সর্দি লাগার উপক্রম হইলে ঘেরূপ হয়, নাক এবং চক্ষে সেরূপ ব্যতনা অনুভূত হয় (সিপা; ইউফ্‌স্.); নাক দিয়া উগ্র বা ক্ষতকারক স্লেয়া নির্গমন।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল মৃতবৎ মলিন (অ্যাস্, কার্বো-বেজ্, বিরেট্-আক্); মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা; রাত্রিতে মুখমণ্ডল এবং মাথার হাফে বেদনা; ঐষা এবং মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক সঞ্চালন হেতু চুই (Chin) বক্ষাহার নিকট আকৃষ্ট হয়; ওষ্ঠ উপরের দিকে উল্টান এবং দৃঢ়; বহুইচ্ছার; ঐষাদেশহ গ্রাহির ক্ষীতি।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখে ধাতুর স্বাদের ভ্রার স্বাদ (আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, মার্ক্, প্রাধান্); পুড়িলে ঘেরূপ হয়, জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগে সেরূপ অনুভূত হয় (বিরেট্-আক্); জিহ্বার পশ্চাৎ অনুভূত হয়;

জিহ্বায় উত্তর পার্শ্বে সাদা লেপযুক্ত ফোঁসা পড়ে এবং উহার অগ্রভাগ অত্যন্ত লালবর্ণ হয় (আস্, বাস্ টঙ্ক্) ; গিলিবাব সময় জিহ্বার গোড়ায় অত্যন্ত বেদনামুত্ব, মুখে প্রচুর পরিমাণে স্লেষ্মার সঞ্চায় ; স্লেষ্মা অত্যন্ত চট্‌চট্টিয়া আঠা, হরিত্রার আভাযুক্ত এবং হৃদার জ্বাশ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে ধাতুর স্বাদ (কাম্) । গলার মধ্যে ডাটন অংশে বেদনা বা টাটানি ; মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগে রক্তাধিক্য বা রক্তাববোধ এবং কাল্‌চে লালবর্ণ, গিলিবাব সময় বাহার বৃদ্ধি হয় (বেল্, এইলাঙ্ক্, আজেট্-নাইট্রিক্, ব্যাপ্ট্, নেফা) ; গলার মধ্যে শুকাহুত্ব ; টন্সিল্ (Tonsils) ক্ষাত (বেল্) ; প্রান্ত-কালে গলার মধ্যে বেদনা এবং কোমল তালুকার (Soft Palate) ক্ষীতি ও মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে গাঢ়, সাদা এবং হরিত্রাবর্ণের স্লেষ্মার সঞ্চায় ; ডেলার জ্বার কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে গিলিবাব সময় গলার মধ্যে একরূপ অম্লভূত হয় (বেল্, ল্যাক্) ; ছাল উঠিয়া গেলে বা চাটিয়া ফেলিলে বেক্রপ হয়, গলার মধ্য এবং টন্সিলে বেক্রপ অম্লভূত হয় (কার্কো, বেজ্, কষ্ট্, ফস্, পাল্‌স্, ক্রমেজ্) ; গলার মধ্যে শুষ্ক বোধ, জ্বালা এবং টাটানি, চিড়িকমারী ও খশ্‌খশে বোধ ; গলার মধ্যে শুকাহুত্ব, বাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয় এবং ব্যাধিকার গলা খেকুর দিয়া গলার মধ্য পথিকাব কলিাব ইচ্ছা বা স্বভাব ; গিলিবাব সময় অত্যন্ত কষ্টাভূত্ব ; প্রত্যেকবার গিলিতে চেষ্টা করার সময় ছুই কানের মধ্য দিয়া পৌঁচা বিধাব স্ত্রীয়া যাতনা অম্লভূত হয়, গলার মধ্য এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে অপরিষ্কার, কাল্‌চে কৃষ্ণ বর্ণ পদা বারা আবৃত (মার্ক্-আগোড্, নাইট্রিক্, আস্) ; উরু পদাটী বেন পোরা চামড়ার জ্বার দেখায় ; গলার মধ্যের পশ্চাৎ ভাগ হইতে অতি কষ্টে পক্ পক্ কবিয়া স্লেষ্মা তোলা ; স্লেষ্মা বেন হৃদার জ্বাশ ক্লিগা পড়ে ; মাপা, ষাড় এবং পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত শব্দ বেদনা ; অত্যন্ত বলকর ; বসী অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে সুস্থী বাওয়া ; ডিপ্পিরিয়া, উষ্ণ তপন দ্রব্য গিলিতে অশক্তি ; গলার মধ্যে আঁটবোধ, বাহার দরুণ বেগী ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয় ; টন্সিলে ক্ষত ; গরমীর ব্যায়াম অনিত গলার মধ্যের অন্তঃ ।

পাকস্থলী । উদ্যারে গলা দিয়া দৃশিত বায়ু এবং টক জল নির্গমন ; উদরস্থ আহার দ্রব্য, পিত্ত, রক্ত এবং চট্‌চট্টিয়া আঠা লাল বমন এবং উহার

সঙ্গে সঙ্গে কাঠবনী বা উকি উঠা ও উহার দরুণ অত্যন্ত যাতনা, বাহার উপশমের আশায় রোগী মরিতে ইচ্ছা করে ; খেতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেৰূপ হয়, পাকস্থলীর মধ্যে সেরূপ বেদনা বা টাটানি ; উদরের ডাইন পার্শ্বে বেদনা এবং টাটানি ।

মল এবং মলদ্বার । অত্যন্ত প্রবল ভেদ এবং বমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে পেট কামড়ানী এবং উদরে খিল ধরা ; শ্লেষ্মা এবং রক্ত, অথবা অল্প চাঁচিয়া ফেলিলে যেৰূপ হয়, সেরূপ কাঁচা মাছ মাংস ধোয়া জলের জায় ছেঁকড়া ছেঁকড়া পর্দার স্থায়ী পদার্থযুক্ত তরল ভেদ ; রক্তস্রাবক অর্শ রোগ (Bleeding-piles) (হামোয়েলিস্, নাইটিক্-অ্যাস্) ; শুষ্ক ক্ষত এবং ফাটাবুক্ত (নেটাম্-নিউর, নাইটিক্-অ্যাস্) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রকোষ প্রদেশে ঘূর্ণঘূর্ণে বেদনা এবং টাটানি ; মূত্র নিঃসারক নালীতে অত্যন্ত অশুষ্ক বোধ ; মূত্র আলবুমেনযুক্ত (Albuminous) (এপিস্, বাবেরিস্, হেলোনিয়াস্, টিরিবিঙ্ক্) ; মূত্র ইউরিক্ অ্যাসিড্ (Uric acid) এবং আলবুমেন্ (Albumen) মিশ্রিত (অস্মিয়ারাম্, ফস্, প্লাস্মা) ; মূত্রে চা খড়ি গোলাব্র জায় তলানি পড়ে ।

জননেদ্রিয় । পুরুষের মুখ্য এবং গৌণ উপদংশ বা গরমীর ব্যারাম (Primary and Secondary Syphilis) (মার্ক্) ; পুরুষাঙ্গে গরমীর ঘা (Chancres) (মার্ক্, নাইটিক্-অ্যাস্) ; তরুণ এবং পুরাতন আঁকারের প্রমেহ রোগ (Gonorrhoea & Gleet) । স্ত্রীলোকের বাবদাব এবং অতিরিক্ত বজ্রস্রাব (পাল্‌স্, আনোনিয়াস্-কার্ক্, অ্যাস্, নোবাক্, ক্যাক্-কার্ক্, বেল্, নাক্স-বম) ; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia) (একন্, বেল্, হামোয়েলিস্, ফেরান্, ইপিকাক্, সাবাইন) ; শুনের প্রদাহ, ক্ষীতি এবং উহাতে পুঁয় হওয়া (হিপ্-স্যাণ্‌ক্, মার্ক্, সাইলিসি, স্যাণ্‌ক্) ; শুনে ফোড়ার জায় ক্ষীতি বা ফোড়া এবং উহাতে নালী ঘা (সাইলিসি) ; শুনের বোঁটার ছাল উঠিয়া যাওয়ার জায় ক্ষত, ফাটাবুক্ত এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা বা টাটানি (গ্রাফ্) ; শুনের স্থানে স্থানে গ্রন্থির জায় ক্ষীতি, বাহার দরুণ শুনে অত্যন্ত বেদনার উত্থেক হয় ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বরভঙ্গ এবং শ্বরশূন্যতা (ফস্) ; বায়ুনল এবং বায়ু

নলের উপরিভাগে শুষ্ক এবং জ্বালাবৃত্তর ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গলায় মধ্যে অত্যন্ত আঁটবোধ ; শুষ্ক খুশ্‌খুশে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলায় মধ্যে খুশ্‌খুশি ; বায়ুনলের উপরিভাগে হুড়্‌ হুড়ী বা আঁটার বহা গলনালীর উপরিভাগের হুই পাখের শুকতার দরুণ কাশি, রাত্রিতে শয়ন করিলেই বাহার বৃদ্ধি হয় (পাল্‌স) ; আত্ম বাতাস বা ঠাণ্ডা লাগিয়া পাঞ্জরার হাড়ের সমাবর্তী পেশীর বাত রোগ ; বুক এবং উহার পাখের কন্‌কনানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশি ; বক্ষস্থির মধ্য দিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশি ; হৃৎপ্রদেশে থাকিয়া থাকিয়া বেদনার হঠাৎ আক্রমণ ; হৃৎস্নায়ুশূল (Angina pectoris), বাহার বেদনা ডাইন বাহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবার ডাইন পাখের গ্রহির কঠিনতা ; গ্রীবা শক্ত হয় বা উহা নোহান যায় না, যাগ ডাইন পাখের এবং বিভ্রানায় শয়ন করিলে, অথবা রাত্রি হুই প্রহরের পর বৃদ্ধি হয় ; টন্‌সিল্‌ ক্ষীত ; প্রতি-দিন প্রাতঃকালে পৃষ্ঠদেশ শক্ত হয় বা উহা নোহান যায় না ; কোমর এবং উহার নিম্ন প্রদেশে অনবরত খুশ্‌খুশে বেদনা ; কোমরের পেশী বাত, যাটার দরুণ উক্ত প্রদেশে অনবরত কন্‌কনিয়া বেদনা বর্তমান থাকে ; কোমরের নিম্ন প্রদেশ হইতে উরু বা কুঁচ্কির সন্ধি পর্য্যন্ত বেদনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । উভয় বকই অনবরত কন্‌কন্‌ করে ; ডাইন বন্ধের সন্ধিতে খোঁচা বিদ্যার জ্বর বেদনা, বাহার দরুণ রোগী বাহ উপর দিকে উঠাইতে পারে না ; হাতের আঙ্গুলের সন্ধি ক্ষীত, কঠিন এবং চক্‌চকে ; বাহুতে অসাড়বোধ বা উহার সকালনে অশক্তি ; বাহু এবং হাতে বাতের বেদনার জ্বর বেদনা । কুঁচ্কির সন্ধিতে কনিয়া ধরার জ্বর বা কঠনবৎ বেদনা, বাহার দরুণ পা সোজা বা প্রসারণ করিয়া শয়ন করিতে না পারিয়া রোগী পা শুটাইয়া পাকে ; বাম হাঁটুর সন্ধিতে বাত রোগ এবং উহার দরুণ হাঁটুর পশ্চাত্তাগে কনিয়া ধরা বা খাট হওয়ার জ্বর অস্বস্তি হয় ; বাম কুঁচ্কির সন্ধির পুরাতন আকারের বাত রোগ ; পায় কত এবং গ্রহির জ্বর ক্ষীতি (Nodes) ; রাত্রিতে পাখের টিবিয়া (Tibia) নামক নখির আবরক কঠিন পর্কার (Periosteum) বেদনা (বাক্‌) ।

চর্ম্ম । পায় পরবীর ব্যারাম জনিত হুঁকড়ী এবং ঘা ; সৌণ উপদংশ



এবং উপদংশের তৃতীয়াবস্থা (Secondary and Tertiary Syphilis) (মার্ক, নাইট্রিক-আস); গার আইসের জ্বর মরা চর্ম বিশিষ্ট ফুসুড়ী; টিনিয়া ক্যাপিটিস (Tinea capitis); লুপাস (Lupus); ক্ষত; দাক্তি ধোঁপাদি কামানের দক্ষণ ফুসুড়ী (Barber's itch), অথবা কোন প্রকারের ঔষধের বাহ্যিক প্রয়োগ হেতু ক্ষত; দাঁদের জ্বর গোলাকার ফুসুড়ী; গার পূর্ব লবণিত ফুসুড়ী।

ব্যবহার। গরমীর ব্যারাম জনিত অস্থি; অস্থির আবরণক কঠিন পর্দায় প্রদাহ (Periostitis); বাতরোগ; বায়ুশূল; চক্ষুর বোলক বিলী প্রদাহ (Conjunctivitis); গ্রন্থির প্রদাহ, ক্ষীতি এবং উহাতে পূর্ব হওয়ার, বিশেষতঃ স্তনের; ডিপথিথিয়া; গলার মধ্যে ক্ষত হওয়ার দক্ষণ বেদনা; মূত্রকোষের ব্রাইটস্ ডিজিজ (Bright's disease); অর্শরোগ; জরায়ু হৃৎতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia); গরমীর বা; টিনিয়া ক্যাপিটিস (Tinea capitis) এবং মরা চর্মের জ্বর খোশা বিশিষ্ট ফুসুড়ী; টন্সিল প্রদাহ এবং উহাতে ক্ষত ইত্যাদি রোগে কাইটোলাকা ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। বাত রোগের ধাতু (ব্রাই, সিনিগিক, রাস-টঙ্ক); গরমীর ব্যারাম জনিত বাত রোগ; অত্যন্ত বলক্ষয় এবং অব-সন্নতা; সমুদয় পেশীতে টাটানি (একন্, ব্রাই); গ্রন্থি এবং অস্থির প্রদাহ ও ক্ষীতি (আসফিটিডা, হিপ-সাল্ফ, মার্ক, নাইট্রিক-আস); আক্রান্ত স্থানে চাপিরা ধরা বা খোঁচা বিধার জ্বর বেদনা এবং টাটানি; বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া পড়ে (পাল্‌স); ফোড়া হইলে এই ঔষধ সেবনে ফোড়ার পূর্ব শীঘ্র শীঘ্র উৎপন্ন হয় (গ্যাক, মার্ক, সাইলিসি); আত্মবাহুতে এবং রাত্রেতে অস্থির বৃদ্ধি এবং শমন করিয়া থাকিলে প্রায় সমুদয় উপজ্বরের হ্রাস বা উপশম ইত্যাদি কাইটোলাকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। কাইটোলাকার কার্যের সঙ্গে মেডি-রিনাস, গোরেকাম, ক্যালী আরোডাইড্, ক্যালী বাইক্সিকাম, মার্কিউরি-রাস, নাইট্রিক আসিড্ এবং রাস টঙ্কের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

প্রতিবেদক ঔষধ। হৃৎ এবং লবণ; ইগ্নেসিয়া এবং সাল্ফার

কাইটোলাকার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । অধিক মাত্রায় খাইয়া অসুস্থ হইলে ওপিয়াম্ এবং ফাফি ব্যবস্থা ।

**ডাইলুশন বিচার ।** ১ম এবং ৩য় দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে ইহার মূল আরোক ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায় । স্তনের প্রদাহ এবং ক্ষীতিতে মূল আরোক ২।১ ফোঁটা মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । স্তনের গ্রন্থিবৎ প্রদাহ এবং ক্ষীতিতে ইহার মূল আরোকের ৫ ফোঁটা, ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উহাতে একখানি নেকড়া ভিজাইয়া নেকড়া খানি আক্রান্ত স্থানে লাগাইয়া রাখিলে প্রদাহ এবং যন্ত্রণাদির অনেক উপশম হইতে দেখা যায় । অনেক সময় কেবল এই প্রকারে বাহ্য প্রয়োগেই প্রদাহ এবং ক্ষীতি ২৩ দিনের মধ্যে মিশাইয়া বাইতে দেখা যায় । গর্ভমীত ব্যারাম জনিত অসুখেও মূল আরোক ব্যবহারে মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায় ।

## প্লাটিনাম্ মেটেলিকাম্,—প্লাটিনা,—প্লাটিন।

(PLATINUM METALLICUM,—PLATINA,—PLAT.)

কোন এক বিশ্বস্থ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত প্লাটিনাম্ (Platinum) ক্রয় করিয়া উহাতে যথা নিয়মে স্থগার অব মিক্ মিশ্রিত করিয়া ইহার ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত শুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় শততমিক ক্রমের শুঁড়া হইতে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

**সাধারণ ক্রিয়া ।** স্নায়বিক যন্ত্রণার উপর কার্য করার শক্তি থাকার বরূপ ইহা স্নায়ুর স্পর্শ জ্ঞান শক্তিকে অবসন্ন করিয়া উহার স্পর্শ জ্ঞান রহিততা (Anæsthesia), জড়তা, পক্ষাঘাত ইত্যাদি উৎপাদন করে । জীলোকের জননোদ্রেকের কার্যের বৈলক্ষণ্য বা অসুখ, চিষ্টিরিতা জনিত রোগ এবং শুকবাত্ত (Melancholia) উক্ত প্রকার কাণ্ডে ফল মাত্র ।

### সাধাৰণ প্ৰাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । ব্ৰহ্ম; ৰোগীৰ (জীলোক) নিকট তাহাৰ চতুৰ্দ্দিশ বস্তুগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট বলিয়া অনুভূত হয় এবং সে মনে করে যেন সকলৰ মন এবং শৰীৰ তাহাৰ মন ও শৰীৰ অপেক্ষা নিকট; চপলতা, অহঙ্কাৰ এবং উগ্র স্বভাব (ল্যাক্, ট্ৰামন্); ৰোগী সকলকেই ঘৃণা করে; সৰ্বদা মানসিক অবসন্নতা, দুঃখের ভাব, ভয় এবং কাঁদিবার ইচ্ছা (ইগ্লেস্, নেটাম্-মিউর, পাল্‌স্, নাক্স-মক্), সন্ধ্যার সময় এবং ঘরের মধ্যে থাকিলে যাহাৰ বৃদ্ধি হয় এবং বহিৰ্জগতে যাহাৰ উপশম হয়; একবার বিমৰ্ষভাব, আবার উহাৰ পৰক্ষেপেই উল্লাস (ক্ৰোকাশ্, ইগ্লেস্, নাক্স-মক্, ট্ৰামন্); ৰোগী মনে করে যেন একগতে তাহাৰ আৰ কেহ নাই এবং তদৰূপ তাহাৰ নিকট তাহাৰ জীবন যেন শান্ত বলিয়া অনুভূত হয়; ৰোগী মনে করে যেন তাহাৰ মৃত্যু অতি নিকটবৰ্তী, অথচ তাহাৰ মৰিবার ইচ্ছা থাকে না বা মৃত্যু ভয়; সৰ্বদা বিড়্ বিড়্ করা, খিট্ খিট্ করা এবং বক্ বক্ করার স্বভাব; সকল কথা বা কাৰ্য্যেই ৰোগী চটিয়া উঠে (ক্যাপ্‌স্, নাক্স-বন্, ষ্টাফিন্); পৰ্যায় ক্ৰমে শাৰীৰিক এবং মানসিক লক্ষণাদি প্ৰকাশ পায়।

মস্তক । মাথার আঁটিয়া বা ঘাটিয়া ধৰাৰ জ্বাৰ অবশবোধ, যাহা কপালেই অধিক অনুভূত হয়; কু আঁটিয়া রাখিলে বা কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যেৰূপ হয়, কপালৰ ছই পাৰ্শ্বে, গালৰ হাড়ের উপৰ, সেৰূপ কসিয়া ধৰাৰ জ্বাৰ যাতনা বা অবশবোধ হয় (একন্, আন্টি-টাৰ্ট, চেলিডন্, জেল্‌স্, মাৰ্ক্); মাথার হাড় সম্বন্ধিত হইলে অথবা একটী ভাৰি পদাৰ্থ লাগিয়া থাকিলে যেৰূপ হয়, মাথার উপৰিভাগে সেৰূপ বেদনা এবং অবশবোধ; কপালৰ এক পাৰ্শ্বে অসাড় বা অবশবোধ যাহা নিম্ন মাড়ি পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং উক্ত স্থানে ঠাণ্ডা বোধ।

চক্ষু । চক্ষুৰ পাতাৰ তাক্ষিপিক স্পন্দন (জেল্‌স্); বস্তুগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট দেখায়; বস্তুগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় দেখায় (হায়োস্)।

কৰ্ণ । কানের মধ্যে সোঁ সোঁ, টন্ টন্ শব্দ হয়।

নাসিকা । নাক এবং নাকের গোড়ায় অবশবোধ এবং খিলখিল

বসিয়া থাকিলে কোমরের পশ্চাৎদেশের নিম্ন ভাগ, এবং ওহু ধারের উপরি-  
ভাগে অবশবোধ ।

**অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ।** কসিয়া বাধিয়া রাখিলে বেক্রপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে  
সেব্রুপ কসিয়া ধরার স্তায় বেদনা, উরুদেশেই যাহা অধিক অমুভূত হয় ; অঙ্গ  
প্রত্যঙ্গে খিল ধরার স্তায় যাতনা ; অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ এবং সন্ধিতে অবশবোধ ;  
হাঁটু এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে অত্যন্ত দুর্বলবোধ ; বসিয়া থাকিলে  
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্থিরতা এবং কাঁপনি ও পা এবং পায়ের পাতায় প্রান্তিবোধ ।

**নিদ্রা ।** প্রবল হাঁই তোলার অত্যন্ত ইচ্ছা ; রাত্রিতে জাগিয়া  
কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অশক্তি ।

**ব্যবহার ।** হিষ্টিরিয়া এবং টিষ্টিরিয়া জ্বিত অস্থখ ; শুকবায়ু (Melan-  
cholia) ; উন্মত্ততা ; হাড়শূল ; আক্ষেপ বা কন্বাল্‌সন্স (Convulsions) ;  
পক্ষাঘাত ; সীসা জনিত বা চিত্রকরের শূল বেদনা (Lead or painter's  
colic) ; কোষ্ঠবদ্ধ ; পুরুষের স্ত্রীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা এবং স্ত্রীলোকের  
পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা ; স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ প্রদাহ (Ovaritis) ;  
অরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ; যোনি ইত্যাদির চুলকানি ; গর্ভস্রাব  
জনিত তন্নানক রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হিষ্টিরিয়ার স্তায় মুর্ছা  
ইত্যাদি অস্থখে প্রাটিনা ব্যবহার্য্য ।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।** অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলহীন ;  
কখন কখন সমুদয় শরীরের কাঁপনিব স্তায় অমুভূত হয় ; শরীরের নানা  
স্থানে বেদনা এবং অবশবোধ ; চোঁচ বিধিলে বেক্রপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে  
দগ্ধপ্‌ করার স্তায় সেব্রুপ যাতনা (আনাকার্ড) ; হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত স্ত্রীলোক  
এবং শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের আক্ষেপিক অস্থখ (আনাকিটিডা,  
ইগ্‌নেস) ; স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা হওয়ার দরুণ আক্ষেপ  
(Spasms) ; স্ত্রীলোকের অস্থখে বিশেষ উপকারী ; সন্ধার সময়, ঘরের মধ্যে  
থাকিলে অথবা বিশ্রাম কালীন অস্থখের বৃদ্ধি এবং নড়াচড়া ও বহির্গায়ুতে  
অস্থখের উপশম ইত্যাদি প্রাটিনামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ  
এদো পরিগণিত ।

সমন্বত বিশিষ্ট ঔষধ । প্রাটিনার কার্য্যের সঙ্গে অরায়ু, শাল :

সেটিলা, ইগ্নেনিয়া, প্লাস্লাম, আনাফিটিডা এবং ক্রোকাশের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে বেলাডোনা, লাইকোপডিয়াম্, রাস্টক্স, সাবাডিলা, দিলিয়া এবং সাল্-কারের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ । পাল্‌সেটিলা।

ডাইলুশন বিচার । ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার মেরার (Dr. Meyer) এই ঔষধের ২য় এবং ৩য় ক্রমের গুঁড়া ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। ডাক্তার হিউজ (Dr. Hughes), ডাক্তার মেয়ারের উক্ত মতের পোষকতা করেন। ৩ষ্ঠ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই লেখক যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন।

## পডোফিলাম্ পেল্‌টেটাম্,—পডোফ্

(*PODOPHYLLUM PELTATUM*,—*PODO.*)

ক্যানাডা, লুসিয়ানা এবং ইউনাইটেড্ স্টেট্‌সের অত্যন্ত স্থানের জঙ্গলা ভূমি এবং বাগানে এই গাছ জন্মে। শুষ্ক মূল বা শিকড় যথা নিয়মে ২০° ওয়ার প্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাঁচা মূল বা শিকড় দিয়াও ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইতে পারে।

সাধারণ ক্রিয়া । যকৃত এবং পরিপাক কার্যের সহায়কারী যন্ত্রাদির উপর ইহার বিশেষ কার্য আছে। স্নৈয়িক ঝিল্লী এবং গ্রন্থিগুলি বিশেষরূপে আক্রান্ত হওয়ার দরুণ উহার নিঃসরণের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং অনেক সময় উচ্চাতে ক্ষত এবং পূর্ব ও উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে টকগন্ধযুক্ত, সবুজবর্ণের পিত্তযুক্ত উদরাময় উৎপাদন করা এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা গুণ মনো পরিগণিত।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মানসিক অবসন্নতা (বোবিষ্টা, চেলিডন, আইরিস, নাক্স-বম্, পাল্‌স) ; রোগী কল্পনা করে যে সে মরিবে অথবা তাহার কোন রোগ হইবে (একন, আর্স, নাক্স-বম্, ফাইটোল, সিকেল)।

**মস্তক ।** মাথাধোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুখদিকে টলিয়া পড়ার ভাব ; প্রাতঃকালে মাথা বরা এবং উহার সঙ্গে মাথার উপস্থিতিতে উকাহুতব ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং টল্‌টলে (নাক্স-বম্, সাল্‌ফ্‌) ; মাথা ধোরা এবং মাথা কিম্ কিম্ করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ৰ ঠিক উপরি-ভাগে পূর্ণ বোধ ; পর্যায়ক্রমে মাথাধরা এবং উদরাময় ; মাথাধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার এদিক ওদিক মাথা ঘূর্ণণ এবং কোথানি বা কোকানি (হেলিবোরাস) ; শিত্তর দাঁত উঠার সময় উক্ত প্রকারের মাথা ধরা অথবা উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটের সমুদ্র ।

**নাসিকা ।** নাকে টাটানি এবং নাকের উপর ত্রণের স্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হুই ।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য ।** দাঁতে দাঁতে কড়্‌ মড়্‌ শব্দ করা (আস্‌, সিকুটা, হেলিবোরাস্‌, হায়োস্‌, সিনা, ট্র্যামন্‌, সিকেল্‌), রক্তিতে, বিশেষতঃ শিঙগণের দাঁত উঠার সময় উক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া, মুখে অত্যন্ত হর্ষক (অর্নিকা, অরায়, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, আয়োড্‌, মার্ক্‌, নাক্স-বম্) ; জিহ্বা মাঝা লেপযুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে অত্যন্ত বিষাদ (নাক্স-বম্‌, পাল্‌স্‌) ; মুখে প্রচুর পরিমাণে চট্‌চটিয়া আটাল স্লেয়ার স্ফার (ক্যালী-বাই, মার্ক্‌-কর) ; প্রাতঃকালে জিহ্বা এবং মুখগহ্বরের শুষ্কতা (ম্যাগ্‌-কার্ক্‌, পাল্‌স্‌, স্পাইকেল্‌) । গলার মধ্যে শুষ্ক বোধ (এপিস্‌, আস্‌, ব্রাই, নাক্স-বম্‌, পাল্‌স্‌) ; গলার মধ্যে বেদনা বা কত বাহা ডাটন পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (বেল্‌, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, ক্যালী-বাই) ; গলগণ্ড (Goitre) (ক্যাল্‌ক্‌-কার্ক্‌, আয়োড্‌, স্পঞ্জ) ।

**পাকস্থলী এবং উদর ।** কৃধা বা কচি শুল্কতা (আলাস্‌, আস্‌, চায়না, কস্‌) ; টক দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (অ্যান্টি-টাই, হিপ্‌-সাল্‌ফ্‌, কস্‌) ; একবারে অধিক পরিমাণ শীতল জল পানের ইচ্ছা (ব্রাই) ; উদরস্থ আটার দ্রব্যাদি গলা দিয়া উঠিয়া পড়ে (কস্‌) ; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে হর্ষক এবং বিষাদ ; মুখ দিয়া জল উঠা (Water-brash) (আস্‌, নাক্স-বম্‌, কস্‌) ; উপপারে উক্ত টক স্বাদ বিশিষ্ট দ্রবিত বায়ু উঠা ; কাঠবিষ বা উকিউঠা ; বুক জ্বালা এবং মুখ দিয়া জল উঠা এবং উহার সঙ্গে

সঙ্গে পাকস্থলীতে উচ্চাহতব (আস্); বমনোদ্বেষ্ট এবং বমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে আধার পূর্ণবোধ; উদরস্থ আহার অব্যাদি বমন (ইপিগাস্ট্রিক্, নাক্স-বম্, কস্); গাঢ় পিত্ত বমন (একন্, আস্, গ্রাটিওলা, আইরিস্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত থাকা (হামামেলিস্, এপিগাস্ট্রিক্, নাক্স-বম্, ট্রাইমিন্); উষ্ণ, ক্ষেপাঙ্ক প্রেম্য বমন; উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশের গভীরতম অংশে খালি বোধ। উদরে পূর্ণ বোধ এবং উদরের ডাইন পার্শ্বে টাটানি; ক্ষীত স্থানে বেদনা এবং পূর্ণবোধ (একন্, বার্কেরিস্, ইউপেট্-পাক্); শেষ রাত্রি ৩টার সময় সরলা-স্ত্রের মধ্যে গড়্-গড়্, কলকল শব্দ হওয়া এবং তৎপর উদরাময়; অস্ত্রের মধ্যে খিলধরার দ্বার বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদর প্রদেশস্থ পেশী কোঁচকাইয়া যায় (আলোজ্, চেলিডন্, প্লাঘাম্); রাত্রি ১০টার সময় এবং প্রাতঃকালে ৫ টার সময় অস্ত্রের মধ্যে খিলধরা (চেলিডন্); অস্ত্রের মধ্যে উচ্চাহতব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মলত্যাগের ইচ্ছা; যকৃতের পুরাতন প্রদাহ; অনিবার্য কোষ্ঠ বন্ধ; কামলরোগ; পিত্তশিলার (Gall-stones) সঙ্গে সঙ্গে কামল রোগ; পাকস্থলী হইতে যকৃতের পিত্তাধার প্রদেশ পর্যন্ত বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বমনোদ্বেষ্ট; কামল রোগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যকৃতে রক্তাধিক্য বা বক্তাবরোধ; যকৃত প্রদেশে পূর্ণবোধ, টাটানি এবং বেদনা; পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবন্ধ এবং উদরাময়।

মল এবং মলদ্বার। অর্শরোগ (আস্, নাক্স-বম্, সালফ্); শুষ্কতার বাহির হইয়া পড়া (Prolapsus ani) (আস্); মলত্যাগের সময়, অথবা সামান্য নড়া চড়াতে শুষ্কতার বাহির হইয়া পড়া (ইগ্-নেস্); মল-ত্যাগের পর মুচ্ছার ভাব এবং উদরে খালিবোধ; অতি প্রকৃষে উদরাময় (আলোজ্, হুফস্, কামক্স্, সালফ্); মল সবুজবর্ণ, টকগন্ধযুক্ত (হিপ্-সালফ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে অতিরিক্ত পরিমাণ দূষিত বাহুর স্ফার (আলোজ্, লাইকোপ্, কলোস্); অতিরিক্ত আহার বা পানের পর উদরাময় (কলোস্); পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবন্ধ এবং উদরাময় (সিমিসিঙ্ক্, আটি-ক্রুড্, নাক্স-বম্, নেট্রাম্-আস্); মল স্বাভাবিক, কিন্তু দিনের বেলা বার-বার মলত্যাগ এবং তদ্বক্ষণ অত্যন্ত দুর্বলতা; বারবার বেদনা বা কষ্টহীন (হুফস্), জলবৎ তরল (চারনা), দুর্গন্ধযুক্ত তরল মল বাহা অতি বেগে নির্গত

হয় (আল্) ; হরিত্রাবর্ণের জলবৎ তরল ভেদ ; রাঁধা সাগর জায় তলানি  
বিশিষ্ট তরল ভেদ ; সবুজ, টকগন্ধযুক্ত, জলবৎ তরল ভেদ ; হরিত্রাবর্ণের  
উন্নত অক্লীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট তরল ভেদ (আর্গিকা, চায়না) ;  
মল স্বেদা মিশ্রিত এবং ঘর্গন্ধযুক্ত ; মল রক্তের ছিট যুক্ত এবং উহার সঙ্গে  
সঙ্গে কৌঁর পাড়া ; কেবল প্রাতঃকালে কাল্চে মল ভেদ ; মলত্যাগের পূর্বে  
পেট কামড়াগী বা শূন বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক ঘারে জালা ও  
বেদনা ; মল কাঁহার রক্ত বিশিষ্ট অথবা চাখড়ি গোলার জায় (বেল্,  
ক্যাঙ্ক-কার্ক্, হিগ্-সালফ্, নিরিকা) ; পুরাতন আকারের উন্নতময়,  
প্রাতঃকালে বাহার বৃদ্ধি হয় (ক্যালী-বাই, নেট্রাম্-সালফ্, কন্, সালফ্) ;  
প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল ভেদ এবং স্রোতের জায় প্রবল বেগে শুষ্ক ঘার  
দ্বারা মল নির্গত হওয়া (বাট্টোকা, প্জা) ; শিশুগণের বারম্বার চাখড়ি  
গোলার জায় ঘর্গন্ধযুক্ত তরল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাটবনি, উকিউঠা  
এবং প্রবল পিপাসা (ক্যাল্-কার্ক্) ; গৌণ গোলার জায় মলভেদ  
(আলোজ্, কল্চ, হেলিবোরাস্) ; মলত্যাগের সময় এবং উহার পর  
শুষ্কঘার বাহির হইয়া পড়া ; আহার বা পানের পর উন্নতময়ের বৃদ্ধি ।

মূত্রযুক্ত । রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে অসাড় বা অনিচ্ছা পূর্বক মূত্র-  
ত্যাগ ; রাত্রিতে বারম্বার মূত্রত্যাগ (কট্, পাল্) ; মূত্রাবরোধ (একন্,  
বেল, পাল্) ।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় । যুবতী বালিকাগণের রক্তরোধ (পাল্) ;  
ডিম্বকোষ প্রদেশে বেদনা, ডাইন ডিম্বকোষ প্রদেশেই বাহ্য অধিক অশ্রুত  
হয় (বেল) ; অরাত্তিতে বেদনা ; মল ত্যাগের সময় মনে হয় যেন অরাত্তি  
ইত্যাদি বোনিঘার দ্বারা সম্বোধে ঠেলিয়া বাহির হইবে ; অরাত্তি হইয়া  
(Prolapsus Uteri) এবং শুষ্ক অরাত্তি বেন নিরদিক নাসিত্তেছে একপ  
টন্ টন্ করা বা বেদনা (কোনারাম্, দিপিয়া) ; বৈতপ্রদর এবং শুষ্ক  
বোনি ঘার দ্বারা গাঢ়, বজ্জ স্বেদা নির্গমন (আলাম্) এবং কোষ্ঠ বন্ধ ; বাস  
ডিম্বকোষ প্রদেশে কন্ কন্ করা এবং উহাতে অবশবোধ ।

নিদ্রা । সর্পদা নিদ্রার জাব বা নিদ্রার ইচ্ছা, পূর্বাঙ্কেই বাহ্য  
অধিক অশ্রুত হয় (আবিস্) ; ক্রিনান বা অর্দ্ধ নিদ্রা এবং চক্ষু অর্দ্ধ খোলা



রাখিয়া নিজা যাওয়া ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কৌধানি বা কৌকানি এবং  
কৌলভানি, বিশেষতঃ শিশুগণের ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিলে রোগী আপনাকে  
আপনি স্নহ মনে করে না ; অহির নিজা, প্রধানতঃ প্রথম রাত্রে ( কন্ ) ।

ব্যবহার । পিত্তাধিকা জনিত রোগ ; বক্রতের সকল প্রকারের  
অসুখ ; বক্রতে রক্তাধিকা বা রক্তাবরোধ ; বক্রতের তরুণ এবং পুরাতন  
আকারের প্রদাহ ; পিত্তশিলা (Gall-stones) ; কামলরোগ ; উদরাময় ;  
শিশুগণের ওলাউঠা, বিশেষতঃ শিশুগণের প্রথম দাঁত উঠার সময় ; গুহ্বার  
বাহির হটরা পড়া (Prolapsus ani) ; দীপা জনিত বা চিত্রকরের শূল বেদনা  
( Lead or painter's colic ) ; কোষ্ঠবদ্ধ ; অর্শরোগ ; পিত্তজ্বর ; অজীর্ণ  
রোগ ; পাকস্থলী প্রদাহ ; মুখদিয়া লাল পড়া ; পারার (Mercury)  
অপব্যবহার জনিত অসুখ ; মস্তিষ্কের শোণ জনিত অসুখ ; যুবতী বালিকা-  
গণের রক্তরোধ ; শ্বेतপদর ; জীলোকের ডিম্বকোষ প্রদাহ ইত্যাদি অসুখে  
পডোফিলাম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । পেটে বেদনাহীন ওলাউঠা এবং  
উহার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে ডিম, পায়ের পাতা এবং উরুদেশে প্রবল খিল ধরা ;  
প্রাতঃকালে অসুখের ( প্রধানতঃ পেটের অসুখের ) বৃদ্ধি ; শেষ রাত্রি ২টা  
হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অসুখের বৃদ্ধি ; শরীরের কোন কোন স্থানে হঠাৎ ধাক্কা  
বা ঝাকি লাগার ভ্রাস বেদনা বা যাতনা ; ডাইন স্বন্ধাহির নিম্ন প্রদেশে  
বেদনা (এসিস) ; প্রাতঃকালে দুই স্বন্ধাহির মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা ; পিত্তা-  
ধিকা বাতু ; প্রধানতঃ পারার অপব্যবহারের পর ইত্যাদি পডোফিলামের  
কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । পডোফিলামের সাধারণ কার্যের সঙ্গে  
কলচিকাম্, আইরিস্, পেপ্টেট্রা এবং মার্কিউরিয়াসের কার্যের বিশেষ  
সাদৃশ্য আছে । প্রাতঃকালীয় উদরাময়ে ইহার কার্যের সঙ্গে এপিস্, মুকর,  
কমেসের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বির অত্যন্ত বিবরে ইহার  
কার্যের সঙ্গে আলোজ্, আইওনিয়া, চেগিডোনিয়াম্, হেলিবোরাস্, নাই-  
ট্রিক্ আনিড্, নাক্স-বমিকা, পাল্গেটিনা, সালফার এবং থিরেট্রাম্  
আল্‌বামের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ল্যাকটিক অ্যাসিড, নাক্স, বরিকা ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের মূল আরোকও, ১ ফোঁটা মাত্রায়, ব্যবহার করিয়া থাকেন । অনিবার্ধ্য কোষ্ঠ বদ্ধে, যাহাতে মল ভ্যাগের সময় গুরুত্বার বাহির হইয়া পড়ে, এই ঔষধের মূল আবেক ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় একপ অনেক যোগীর চিকিৎসার লেখক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ।

### সিকেল্ কর্নুটাম্,-(আর্গট্),-সিকেল্

(SECALE CORNUTUM,—ERGOT,—SEC. CORN)

কাঁচা আর্গট্ সংগ্রহ করিয়া উহা যথা নিম্নে প্রক্ট স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কনেক্কা মজ্জার উপর ইহার কার্য অতি প্রবল । ইহা দ্বারা নিবাক্ত হইলে আক্ষেপ এবং গ্যাংগ্রিণ্ (Gangrene) হয় । দ্রাব্য নিবাক্ত হইয়া আক্ষেপ হয় এবং রক্ত দূষিত হইয়া গ্যাংগ্রিণ্ হয় । ইহা মস্তিষ্ক এবং কনেক্কা মজ্জার রক্তাৱতা উৎপাদন করিয়া আক্ষেপ উৎপাদন করে । জ্বালোকের জরায়ু উপরও ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল । জ্বাণ শূত্র পেশীর উপরও ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ জরায়ুতে আক্ষেপ বা স্কেচনের উদ্বেক হইয়া গর্ভবতী জ্বালোকের গর্ভ নষ্ট বা গর্ভশ্রাব হইয়া থাকে । গর্ভশ্রাব নিবারণার্থ হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার সিকেল্ কর্নুটাম্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অতএব গর্ভাবস্থায় কোন রোগ চিকিৎসার সিকেল্ কর্নুটাম্ ব্যবহৃত করিতে হইলে চিকিৎসকের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত । নতুনা গর্ভশ্রাব হওয়া আশঙ্ক্য নহে । এই ঔষধের বিশেষ কার্যের বিবরণ নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক লক্ষণগুলিতেই বিদ্যুত রূপে লিখিত হইল ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। অর্ধ নিদ্রিতাবস্থা এবং নিস্তব্ধতাব বা অবসন্নতা (বেল্, ওপিয়াম্); সমুদ্র ইন্ধিরের চেতনীর হ্রাস; মূহ বা উগ্র প্রলাপ (বেল্, হায়োস্, ট্রামন্); মনের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং মূহাত্ম্য (একন্, আর্স)।

মস্তক। অবসন্নতা; মাথা ঘোরা; মাথার ভারিবোধ এবং তৎপর মাথায় টুটনানি।

চক্ষু। চক্ষু বসিয়া যায়; চক্ষু নীলবর্ণের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত (ফস্, চায়না, ক্যালী-আয়োড্, সাল্ফ্); চক্ষু পাংলের ভায় কট্ মটে দৃষ্টি এবং স্থির ভাব বিশিষ্ট (ক্যাস্, বেল্, হায়োস্); চক্ষু অন্ধকার দেখা; চক্ষু; তারা সাধারণতঃ বিস্তৃত (বেল্, হায়োস্, ট্রামন্)।

কর্ণ। কানে সৌ সৌ শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে কম শুনা (ক্যাল্-ফার্স্, মার্ক্, ফস্-আর্স, সাল্ফ্); ওলাউঠার পর কানে কম শুনা।

মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল শিটা, বসিয়া যায়, উদ্বিগ্ন এবং মূহত্ব (আর্স্, ক্যাস্কার, বিরেট্, আল্ফ্)।

মুখগহ্বর। জিহ্বা হয় পরিকাব, নতুবা সাদা লেগবুজ (আন্টি-ক্রুড, ব্রাই, নাক্স-বন্, পাল্ফ্); মুখ অত্যন্ত দুর্গন্ধ (আর্বিকা, হিপ্-সাল্ফ্, মাক্, ক্যালী-আয়োড্); জিহ্বার পক্ষাঘাত হইলে যেক্রপ হয়, সেক্রপ কাঁপাইয়া মূহত্বের এবং অস্পষ্টভাবে কথা বলা (কষ্ট্, জেল্-স্, হায়োস্, ট্রামন্)।

গলার মধ্য। গলার মধ্য শুক (ওপিস্, আর্স্, নাক্স-মক্)।

পাকস্থলী এবং উদর। হঠাৎ ক্ষুধা (ব্রাই, ফেরাস্, সিনা, লাইকোপ্), অনিবার্য প্রবল পিপাসা (একন্, আর্স্, ব্রাই, রাস্-টক্স, সাল্ফ্); বমনো-দ্বিগ্ন এবং বমনের ইচ্ছা (আন্টি-টোট্, হিপিকাক্); পিত্তযুক্ত পদার্থ বমন (ব্রাই, নাক্স-বন্, আইরিস্, পডোফ্); শ্লেষ্মা বমন; কাল্চে কটাবর্ণের ভাজা কাঁকি শুঁড়ার ভায় তরল পদার্থ বমন (কোনারাম্); পাকস্থলী হইতে রক্ত উঠা বা রক্ত বমন (হামামেলিস্, ফস্); পাকস্থলীতে অত্যন্ত আঁটা বোধ ও উদ্বিগ্ন বা বাঁতনা এবং পাকস্থলী স্পর্শ করিলে অত্যন্ত

বেদনাবৃত্ত হয়; কোন একটী ভারি বস্তু লাগিয়া থাকিলে যেক্রপ হয়, পাকস্থলীতে সেক্রপ চাপা বোধ (একন্. আর্স্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্) ; পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ (আর্স্, ক্যাঙ্ক্, আইরিস্, সান্স্-নেরিয়া) । উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত (আর্গিকা, চার্না, কন্) ; যকৃতের বিবৃদ্ধি, শ্রবাহ এবং উহা পচিয়া যাওয়া ; অত্যন্ত কষ্টদায়ক মূল বেদনা এবং তন্দ্রারূপ আক্কেপ বা কন্‌বাল্‌সন্‌স্ (Convulsions) ; টন্‌ টন্‌ করিয়া নিরন্তরিক সজোরে ঠেলিয়া নামিলে যেক্রপ হয়, তলপেটে অনবরত সেক্রপ ঘটনা ; উদর এবং পৃষ্ঠদেশে ঠাণ্ডা বোধ ; তলপেটে বেদনা ।

মল এবং মলছার । শুষ্ক এবং শুষ্ক ছারের পক্ষাঘাত ; উদর-ময় ; বারবার কটাবর্ণের চট্‌চটিয়া তরল মল ভেদ ; কাল্‌চে মল ভেদ (আর্স্) ; অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল ভেদ (আর্স্, অ্যাসাকিটিডা) ; হরিদ্রার আভাবিত্ত সবুজ বর্ণের তরল ভেদ : অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক তরল ভেদ (আর্গিকা, আর্স্, হায়োস্) ; অত্যন্ত দুর্গন্ধ কারক তরল ভেদ (চার্না, কন্) ; স্যাংখাতিক আকারের ওলাউঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পতনাবস্থার লক্ষণ, মুখমণ্ডল বসিয়া যাওয়া, বিকৃত হওয়া, বাহ্যতে ওষ্ঠই অধিক বিকৃত হয় ; বক্তভেদ (হামামেলিস্, ওপিয়াম্) ; কোষ্ঠবদ্ধ (আলান্, ব্রাই, ক্যাঙ্ক্-কার্ক্, নাক্স-বম্, ওপিয়াম্, কন্, কমেস্, সান্স্) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রাধারের পক্ষাঘাত (বেল্, কষ্ট্, কোনাগাম্, হায়োস্) ; মূত্রাবরোধ (বেল্, ওপিয়াম্, ট্রামন্) ; মূত্র ফিকা এবং জনন (নেট্রাম্-মিউর, ফন্-আস্, ট্রাকিস্) ।

জী জননেন্দ্রিয় । অনেক দিন ব্যাপিয়া প্রচুর বক্তঃপ্রাব (আমন্-কার্ক্, আর্স্, ক্যাঙ্ক্-কার্ক্, ক্যালী-কার্ক্, নাক্স-বম্) ; জগায় হইতে বক্তঃপ্রাব, সামান্ত নড়াচড়াতেই বাহার বৃদ্ধি হয় (ইরিজারগ্, সানাইনা) ; বক্তঃ কাল্‌চে, তরল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ; কোন বস্তু সংজোরে ঠেলিয়া বাহির হইলে যেক্রপ হয়, জরায়ুতে সেক্রপ বেদনা বা ব্যতনা (কলোফিগাম্) ; জরায়ু এবং ডাইন ভিষকোষে বক্তঃপ্রাব এবং স্পর্শনেও উহাতে বেদনা ; পর্ভপ্রাব হওয়ার উপক্রম হওয়া, বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে (সানাইনা) ; পর্ভপ্রাবের পর জরায়ু সঙ্কুচিত হয় ন' (কলোফিগাম্) ; জরায়ু হইতে কাল্‌চে, দুর্গন্ধযুক্ত